



## Impact of Native Woody Species (*Acer monspessulanum* L., *Prunus scoparia* (Spach) C.K.Schneid., and *Daphne mezereum* L.) on Soil Quality Characteristics in Korkhangan Rangelands

Moslem Yazdani<sup>1</sup>, Reza Erfanzadeh<sup>\*2</sup>, Asghar Mosleh Arani<sup>3</sup>

<sup>1</sup>. PhD. Student in Rangeland Science, Department of Range and Watershed Management, Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.

<sup>2</sup>. Corresponding Author; Associate Prof., Department of Rangeland Management, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Nur, Iran, E-mail: Rezaerfanzadeh@modares.ac.ir.

<sup>3</sup>. Associate Prof., Department of Environmental Engineering, Faculty of Natural Resources, Yazd University, Yazd, Iran.

### Article Info

**Article type:**  
Research Full Paper

**2023; Vol 17, Issue 3**

### Article history:

Received: 03.08.2022

Revised: 26.09.2023

Accepted: 02.10.2023

### Keywords:

Nitrogen,  
organic matter,  
phosphorus,  
canopy cover,  
arid areas.

### Abstract

**Background and objectives:** Perennial shrubs play a crucial role in shaping the soil quality within their habitats, influencing soil characteristics through leaf fall and root interactions. This study focuses on the impact of three native woody species—*Acer monspessulanum*, *Prunus scoparia*, and *Daphne mezereum*—on soil quality parameters in the ecologically sensitive and fragile Korkhangan rangelands of southern Yazd province. Considering the susceptibility of these rangelands to desertification, understanding the effects of woody plant species on soil quality is vital for successful rangeland rehabilitation and improvement projects.

**Methodology:** The research investigates the qualitative characteristics of soil under the canopy of the three woody species compared to areas outside the canopy (control) in Korkhangan rangelands. Fifteen sites were selected, and soil samples were collected both under the canopy and outside the canopy at a depth of 0-5 cm. Soil physico-chemical parameters were measured in the laboratory, and statistical analyses (one-way ANOVA and Duncan tests) were employed to compare soil characteristics under the canopy and the control.

**Results:** The study revealed variations in soil nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, organic matter, acidity, and electrical conductivity under different woody species. *Acer monspessulanum* demonstrated a significant influence on soil characteristics, with higher levels of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, and organic matter compared to the control. The acidity of soils under *D. mezereum*, *P. scoparia*, and *A. monspessulanum* was lower than that outside the canopy. Additionally, electrical conductivity showed variations between *A. monspessulanum*, *P. scoparia*, *D. mezereum*, and the control.

**Conclusion:** The research underscores the distinct impact of native woody species on soil properties in the studied rangelands. *Acer monspessulanum* exhibited a particularly pronounced effect on soil characteristics. Understanding these

---

relationships can inform effective planning for ecosystem improvement and development activities in rangeland areas.

---

**Cite this article:** Yazdani, M., R. Erfanzadeh, A. Mosleh Arani, 2023. Impact of Native Woody Species (*Acer monspessulanum* L., *Prunus scoparia* (Spach) C.K. Schneid., and *Daphne mezereum* L.) on Soil Quality Characteristics in Korkhangan Rangelands. *Journal of Rangeland*, 17(3): 367-381.



© The Author(s).

DOR: 20.1001.1.20080891.1402.17.3.3.6

Publisher: Iranian Society for Range Management

---



## مرتع

شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۰۸۹۱

شاپا الکترونیکی: ۲۶۷۶-۵۰۳۹

### تأثیر سه گونه چوبی *Daphne mezereum* و *Prunus scoparia* (Spach) C.K.Schneid. *Acer monspessulanum* L. بر ویژگی‌های کیفی خاک زیراشکوب (منطقه مورد مطالعه: مراتع کرخنگان)

مسلم یزدانی<sup>۱</sup>، رضا عرفانزاده<sup>۲\*</sup> و اصغر مصلح آرانی<sup>۳</sup>

۱. دانشجوی دکتری مرتعداری، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

۲. نویسنده مسئول، دانشیار گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران. رایانامه:

Rezaerfanzadeh@modares.ac.ir

۳. دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

#### چکیده

#### اطلاعات مقاله

**سابقه و هدف:** گیاهان بوته‌ای چندساله از طریق ریزش لاشیرگ و تأثیر ریشه‌هایشان موجب تغییر کیفیت خاک رویشگاه خود می‌شوند. با توجه به اهمیت کشت گونه‌های چوبی به منظور اصلاح و احیای پوشش گیاهی، این تحقیق در مراتع نیمه‌خشک جنوب استان یزد انجام گردید. مطالعه این مراتع که دارای محیط‌های اکولوژی حساس، شکننده و مستعد بیابان‌زایی هستند از هر حیث، با اهمیت است. از طرفی به منظور مقابله با گسترش بیابان و خطرات ناشی از آن‌ها، طرح‌های احیا و اصلاح مراتع با کاشت گونه‌های مختلف اجرا می‌گردد که می‌توانند ویژگی‌های خاک را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی اثر کاشت گونه‌های درختچه‌ای مختلف بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک زیر اشکوب و اندازه‌گیری شاخص‌های کیفیت خاک در مراتع کرخنگان بوده است.

نوع مقاله:

مقاله کامل - پژوهشی

۱۴۰۲؛ جلد ۱۷، شماره ۳

تاریخ دریافت ۱۴۰۱/۰۵/۱۲

تاریخ ویرایش: ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

**مواد و روش‌ها:** این پژوهش تأثیر سه گونه چوبی *Acer monspessulanum*، *Prunus scoparia* و *Daphne mezereum* بر ویژگی‌های کیفی خاک سطحی زیراشکوب در مراتع کرخنگان مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور، در پایان فصل رویش، پس از بررسی مقدماتی اقدام به شناسایی رویشگاه نموده و پس از انتخاب ۱۵ سایت نمونه‌برداری که در هر سایت از خاک زیر تاج‌پوشش سه گونی چوبی *P. scoparia*، *A. monspessulanum* و *D. mezereum* و از خاک بیرون تاج‌پوشش به عنوان شاهد با آگر از عمق ۵-۰ سانتی متری نمونه‌برداری انجام گردید و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی ۶۰ نمونه خاک سطحی اندازه‌گیری شد. جهت مقایسه ویژگی‌های خاک زیر اشکوب با یکدیگر و همچنین با تاج‌پوشش علفی بیرون از اشکوب، از آزمون ANOVA و دانکن استفاده شد.

واژه‌های کلیدی:

نیتروژن،

ماده‌ی آلی،

فسفر،

تاج‌پوشش،

مناطق خشک.

**نتایج:** نتایج به‌دست آمده حاکی از وجود اختلاف معنی‌داری عناصر غذایی در زیر اشکوب گونه‌های چوبی با بیرون تاج‌پوشش (شاهد) است. بررسی عملکرد گونه‌ها نشان داد که گونه‌های *A. monspessulanum* و *P. scoparia* نقش پررنگ‌تری در بهبود خصوصیات شیمیایی خاک و عملکرد مرتع نسبت به گونه *D. mezereum*

دارد. در صورتی که میزان نیتروژن در خاک زیر اشکوب گونه *A. monspessulanum*، *P. scoparia* و *D. mezerum* بیشتر از خاک بیرون تاج پوشش بوده است. همچنین نتایج فسفر نشان داد که میزان فسفر *A. monspessulanum*، *P. scoparia* بیشتر از *D. mezerum* و بیرون تاج پوشش است. در خصوص میزان پتاسیم در خاک زیر اشکوب گونه‌های چوبی *A. monspessulanum*، *P. scoparia* و *D. mezerum* و بیرون تاج پوشش دارای سطح اختلاف معنی‌داری مشاهده شد. همچنین میزان کلسیم در خاک زیر اشکوب گونه‌ها *A. monspessulanum*، *P. scoparia* و *D. mezerum* بیشتر از بیرون تاج پوشش است. میزان منیزیم در خاک زیر تاج پوشش *A. monspessulanum* بیشتر از *P. scoparia* و *D. mezerum* بیشتر از بیرون تاج پوشش آنها بود. همچنین خاک‌های بیرون از تاج پوشش میزان قلیائیت بیشتری نسبت به خاک‌های زیر تاج پوشش گونه‌های *D. mezerum*، *P. scoparia* و *A. monspessulanum* داشت. هدایت الکتریکی خاک زیر اشکوب گونه‌های چوبی *A. monspessulanum* و *P. Scoparia* بیشتر از خاک زیر اشکوب گونه *D. mezerum* و خاک بیرون از تاج پوشش است.

**نتیجه‌گیری:** در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که گونه چوبی مختلف در عرصه‌های مرتعی تاثیرات متفاوتی بر خصوصیات خاک زیر اشکوب خود می‌گذارند. به طوری که در این مطالعه مشاهده گردید گونه *A. monspessulanum* نسبت به سایر گونه‌های مورد بررسی اثرگذاری بیشتری بر روی خصوصیات خاک منطقه مورد مطالعه دارند. لذا با شناخت روابط موجود میان گونه‌های چوبی و خاک می‌توان کمک شایانی به برنامه‌ریزی صحیح این بوم‌سازگان‌ها در راستای فعالیت‌های اصلاح و توسعه نمود.

**استناد:** یزدانی، م.، ر. عرفانزاده و ا. مصلح آرانی، ۱۴۰۲. تأثیر سه گونه چوبی *Acer monspessulanum* L.، *C.K.Schneid. Prunus scoparia* (Spach) و *Daphne mezerum* L. بر ویژگی‌های کیفی خاک زیر اشکوب (منطقه مورد مطالعه: مراتع کرخ‌نگان). مرتع، ۱۷(۳): ۳۶۷-۳۸۱.



DOR: 20.1001.1.20080891.1402.17.3.3.6

© نویسندگان

ناشر: انجمن علمی مرتعداری ایران

## مقدمه

خاک‌هایی که در آن‌ها رشد می‌کنند تأثیر می‌گذارند که از جمله می‌توان به اثر آن‌ها بر اقلیم خاک‌ها اشاره کرد. همچنین گونه‌های چوبی و بوته‌ای‌ها به‌عنوان سازنده هوموس عامل اصلی خاکزایی به شمار می‌آیند. حد فاصل میان ریشه گیاهان و گونه‌های بوته‌ای و خاک محیط پیچیده‌ای بوده و اغلب دارای مرز تعریف نشده‌ای است. مواد آزاد شده از ریشه‌ها به داخل خاک خصوصیات آن را تغییر داده و موجب تحرک رشد برخی ریز موجودات می‌گردد (۳۸). به همین منظور (۱). بیان کرد که چهار عامل (۱) - جذب عناصر غذایی توسط ریشه‌های سطحی و عمقی، ۲ - تثبیت عناصر غذایی توسط گیاهان و موجودات همزیست، ۳ - استفاده از عناصر غذایی توسط جانداران بزرگ خاکی که از گیاهان برای لانه‌سازی و استراحت و غیره استفاده می‌کنند و ۴ - توقف و انباشت شدن خار و خاشاک و ذرات خاک در اثر وزش باد در پای بوته‌ها و تنه درختان) باعث تغییر در مقدار عناصر غذایی در زیر تاج پوشش می‌شود. همچنین پژوهشگران در تحقیق خود در خصوص تأثیر تاج پوشش درختان بر روی تغییرات مکانی مواد مغذی دریافتند که میزان انباشت مواد مغذی (عناصر حاصل‌خیزی خاک (N, P, K) در زیر تاج پوشش در مقایسه با فضای آزاد بیشتر است (۲۱، ۴۳، ۳۳، ۱۳، ۴۰ و ۱۴).

در خصوص میزان عناصر خاک زیر اشکوب محققان، بیان کردند که ویژگی‌های خاک تحت تأثیر نوع گونه درختی و درختچه‌ای، مرحله رویشی، میزان زی‌توده تولیدی و وجود آشفستگی‌های طبیعی و مصنوعی تغییر می‌کند (۱۹ و ۱۷). بویژه اینکه مشخصه‌های فیزیکی خاک در بوم‌سازگان‌های مرتعی شامل بافت، ساختار، تخلخل، چگالی ظاهری، تهویه، دما و محتوی رطوبتی خاک است و این خصوصیات بر حاصل‌خیزی خاک اثر می‌گذارد (۳۳)، خود می‌تواند از پوشش گیاهی تأثیر بگیرد (۳۴). از طرفی یکی از ویژگی‌های مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان و ایران، وجود گونه‌های چوبی به صورت تک پایه و یا چند پایه در یک زمینی از خاک لخت یا علفزار است (۱۴ و ۱۲). این لکه‌ها می‌تواند بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و لاشبرگ تأثیر گذار باشد. به طوری که گونه‌های درختی باعث افزایش

از بین بوم‌سازگان‌ها طبیعی، مراتع از جمله با اهمیت‌ترین منابع ایران به‌شمار می‌روند. تولید علوفه، تأمین آب و خاک، حفظ تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی، تولید گیاهان دارویی و صنعتی، تلطیف آب و هوا، تولید غذا از جمله کارکردها و دلایل با اهمیت این موهبت الهی است (۵۱ و ۷). از مهم‌ترین کارکردهای محیط زیستی مراتع می‌توان به حفظ و نگهداری خاک اشاره کرد. زیرا خاک به عنوان بستر فعالیت‌های زیستی منبع اصلی تولید منابع غذایی بشر است. لذا به منظور مدیریت بهینه این بوم‌سازگان‌ها، شناخت اجزاء آن و دستیابی به روابط بین این اجزاء از جمله خاک و پوشش گیاهی ضروری به نظر می‌رسد (۲۸، ۱۵ و ۷). در واقع، ویژگی‌های خاک به وسیله فعالیت‌های ریشه و تجمع لاشبرگ‌ها و بقایای گیاهی موجود در زیر تاج پوشش گیاهان تحت تأثیر قرار می‌گیرند (۳۱). در این ارتباط می‌توان گفت درختچه‌ها به وسیله تاج پوشش متمرکز و فعالیت شدید ریشه‌ی خود باعث تشکیل جزایر حاصل‌خیز (Fertile islands) و در نهایت ارتقای کیفیت لاشبرگ و خاک زیر اشکوب خود می‌شوند (۵۱، ۵۲ و ۴۸). تشکیل جزایر حاصل‌خیز از نتایج فرآیندهای زنده و غیرزنده از جمله جذب مواد غذایی گیاهی، انباشت و تجزیه لاشبرگ، فعالیت موجودات خاکی و نهشته‌های بادی است (۲۳ و ۳۹). مطالعات نشان می‌دهد که گونه‌های گیاهی پس از استقرار و گسترش، به شدت ویژگی‌های خاک را تحت تأثیر قرار می‌دهند (۲۵ و ۲۳). هر چند حضور پوشش گیاهی به طور معمول اثر مثبت بر چرخه‌ی مواد مغذی خاک و لاشبرگ دارد اما میزان تأثیر در بین گونه‌ها و در سراسر مناطق اکولوژیکی متفاوت می‌باشد (۴۳) گونه‌های گیاهی با ویژگی‌های خاص خود دارای تأثیرات متفاوتی بر محیط رشد خود هستند و با مطالعه‌ی ارتباطات بین این گونه‌ها و خاک می‌توان به وسعت این اثرات و نوع آن پی برد و در مدیریت پوشش گیاهی و خاک لحاظ نمود (۱۶). در واقع گونه‌های چوبی و بوته‌ای به عنوان واحد مجموعه‌ای از ویژگی‌های زیستی و غیر جاندار و از طریق نفوذ ریشه، کنش‌های متقابل با محیط زیست دارند و عمیقاً بر

## مواد و روش‌ها

## منطقه مورد مطالعه

مراعات کرخنگان واقع در بخش ایثار از نظر تقسیمات کشوری در شهرستان مروست در جنوب استان یزد قرار دارد. محدوده جغرافیایی منطقه ایثار بین طول‌های جغرافیایی "۰۰' ۴۸' ۵۳° شرقی و عرض جغرافیایی "۸۹' ۴' ۳۰° شمالی واقع شده است (شکل ۱). از نظر زمین شناسی جزء زون تکتونیکی سندرچ سیرجان طبقه‌بندی می‌شود. متوسط درجه‌ی حرارت ۱۷/۴ درجه سانتی‌گراد و میانگین بارندگی سالانه ۱۵۰ میلی‌متر است. بر اساس شاخص دومارتن جزء مناطق خشک به حساب می‌آید. بنابراین در این مراعات فواصلی از خاک لخت در کنار لکه‌هایی متشکل از گونه‌های گیاهی از قبیل *A. monspessulanum*، *P. scoparia* و *D. mezerum* دیده می‌شود و به مراعات چشم انداز نیمه استپی داده است (۲۲). پوشش گیاهی منطقه با غالبیت گونه درختچه‌ای *A. monspessulanum* (کیکم)، *P. scoparia* (ارژن) و *D. mezerum* (دافنه) بودند.

*A. monspessulanum* یکی از گونه‌های مهم جنس *Acer* از خانواده *Aceraceae* می‌باشد. درختی که ارتفاع آن بندرت به بیش از ۱۰ متر می‌رسد و دارای چوب با کیفیتی است. همچنین قدرت پراکنش نسبتاً وسیعی دارد (۳۰). *P. scoparia* (ارژن)، درختچه‌ای چند ساله از خانواده *Rosaceae* که از قاعده منشعب و پرشاخه، با شاخه‌های ترکه‌ای، راست، بدون کرک و سبزرنگ که غالباً در فصل تابستان بدون برگ است و برگ‌ها بیشتر در فصل بهار دیده می‌شوند (۳۰). *D. mezerum* (دافنه)، درختچه‌ای به ارتفاع ۲ متر بسیار پرشاخه، به انبوهی برگ‌دار شاخه‌ها کم رنگ به حالت خاکستری، برگ‌ها گوشتی بدون دم‌برگ که این گیاه در ایران دارای پراکنندگی نسبتاً وسیع است (۳۰).


## نمونه‌برداری

در اواخر تابستان ۱۴۰۰ پس از بررسی‌های مقدماتی و انتخاب منطقه‌ی معرف، نمونه‌برداری به روش تصادفی انجام گرفت. لذا سایت ۱۵ (مکان، بطوریکه هر سه گونه مورد مطالعه در هر سایت در کنار یکدیگر وجود داشتند، انتخاب شدند (طرح بلوک کاملاً تصادفی). سپس در هر سایت از گونه‌های *A. monspessulanum*، *P. scoparia* و

مواد مغذی خاک شدند. در واقع سایبان ایجاد شده توسط گونه‌ها علاوه بر حفظ رطوبت خاک زیر اشکوب (تاج پوشش) باعث حفظ ذخایر مواد غذایی می‌شود، حفظ ترکیبات گونه و تنوع پوشش گیاهی و نیز بهبود کیفیت مواد مغذی در لاشبرگ را در پی دارد (۴۲). در تحقیقی در خصوص تأثیر تاج پوشش و اثر سایه‌اندازی گونه‌های درختی و درختچه‌ای بیان کرد که درختان و درختچه‌های بزرگ جثه نسبت به درختان و درختچه‌های کوتاه جثه توانایی بیشتری دارند که مواد مغذی داخل خاک را حفظ کنند (۳). در واقع پراکنندگی گونه‌های درختی و درختچه‌ای در مراعات نیمه‌خشک علاوه بر تشکیل جزایر حاصل‌خیز با فراهم کردن شرایط از قبیل کاهش تابش خورشید و کاهش فرآیند تبخیر و تعرق و درجه‌ی حرارت، شرایط را برای رشد گیاهان زیر تاج پوشش فراهم می‌کند و در نهایت باعث حاصل‌خیزی خاک می‌شوند (۱۴، ۱۲، ۱۳ و ۴۶). در تحقیق حاضر سعی بر آن شد که برای مدیریت هر چه بهتر اراضی مرتعی جنوب غربی استان یزد، تأثیر گونه‌های متفاوت گیاهی از جمله *Prunus*، *Acer monspessulanum*، *Daphne mezerum* و گونه‌های بیرون تاج پوشش که در یک رویشگاه واحد در کنار یکدیگر رشد می‌کنند، بر خصوصیات کیفی خاک بررسی شود، تا بتوان با شناخت روابط حاکم راه‌حل‌های مناسبی در زمینه‌ی اصلاح واحیای اراضی مرتعی تخریب شده توصیه کرد. در واقع می‌توان گفت که با شناخت خصوصیات خاک هر جامعه‌ی گیاهی و پایه‌ی هر گونه گیاهی، می‌توان بهترین گونه گیاهی را جهت مقابله با بحران کیفیت خاک و در نهایت توسعه‌ی پایدار محیط زیست معرفی کرد. فرض بر این است که (۱) گونه‌های مختلف چوبی تأثیر متفاوتی بر خصوصیات کیفی خاک زیر اشکوب می‌گذارد. گونه *D. mezerum* چون دارای ارتفاع کمتری می‌باشد و به سطح زمین نزدیکتر است پیش‌بینی می‌شود (۲) این گونه اثر معنی‌داری نسبت به دو گونه چوبی دیگر بر افزایش خصوصیات کیفی خاک بگذارد.

روش والکی بلک (۳۲)، نیتروژن کل به روش کج‌دال (۶)، فسفر به روش اولسن با دستگاه اسپکتوفتومتر (۹)، پتاسیم، کلسیم و منیزیم به روش جذب اتمی (۵)، اسیدیته (pH) با استفاده از pH متر، قابلیت هدایت الکتریکی (EC) با استفاده از EC متر در آزمایشگاه دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان اندازه‌گیری گردید.

*D. mezerum* به منظور بررسی تأثیر و یا عدم تأثیرگذاری نوع تاج پوشش گونه‌های گیاهی بر خاک در زیر تاج پوشش و بیرون تاج پوشش به عنوان شاهد نمونه‌برداری انجام شد (شکل ۲). پس از انتقال نمونه‌ها به آزمایشگاه، نمونه‌های خاک هوا خشک، و به آرامی کوبیده و از الک ۲ میلی‌متری عبور داده شد و برای اندازه‌گیری پارامترهای مورد نظر آماده گردیدند. سپس فاکتورهای کیفی خاک شامل کربن به




شکل ۱: موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان یزد، ایران

همگن بودن واریانس با استفاده از آزمون لون مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه میانگین مقادیر مشخصه‌های خاک در گونه‌های مختلف از تجزیه واریانس یک‌طرفه و آزمون دانکن انجام شد. کلیه آزمون‌های آماری در محیط نرم‌افزاری SPSS نسخه ۲۲ انجام شد.

### تجزیه و تحلیل آماری

پس از اخذ نتایج، داده‌های جمع‌آوری شده در طرح آزمایشات کاملاً تصادفی در نرم‌افزار اکسل به عنوان بانک اطلاعات ذخیره شدند. سپس به منظور انجام آزمون برای تجزیه و تحلیل و مقایسه داده‌ها با ۱۵ تکرار، ابتدا نرمال بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کولوموگروف-اسمیرنوف و





شکل ۲: موقعیت سه توده *Prunus scoparia*، *Daphne mezerum* و *Acer monspessulanum* در مقایسه با منطقه شاهد (کنترل)

## نتایج

بر کیلوگرم) بود (جدول ۱، شکل ۳). همچنین میزان منیزیم در خاک زیر تاج پوشش *A. monspessulanum* (با میانگین ۵۱۱/۰۷ میلی‌گرم بر کیلوگرم) بیشتر از *P. scoparia* و *D. mezerum* بیرون از تاج پوشش (به ترتیب با میانگین ۲۷۷/۸۱، ۲۴۲/۸۸ و ۱۵۴/۴۳ میلی‌گرم بر کیلوگرم) بود (جدول ۱، شکل ۳).

نتایج در خصوص میزان ماده‌ی آلی خاک زیر اشکوب گونه‌های چوبی *A. monspessulanum*، *P. scoparia* و *D. mezerum* (به ترتیب با میانگین ۲/۸ درصد، ۲/۶ درصد و ۲/۰۱ درصد) بیشتر از خاک بیرون از تاج پوشش با میانگین (۰/۶ درصد) بود (جدول ۱، شکل ۳). همچنین در خصوص اسیدیته خاک‌های بیرون از تاج پوشش میزان قلیائیت بیشتری (۸/۳۱) نسبت به خاک‌های زیر تاج پوشش گونه‌های *D. mezerum*، *P. scoparia* و *A. monspessulanum* (به ترتیب با میانگین ۸/۰۳، ۸/۰۶ و ۷/۴۱) دارد. همچنین در خصوص قابلیت هدایت الکتریکی بین گونه‌های چوبی *A. monspessulanum* و *P. Scoparia* به ترتیب با میانگین (۰/۴۷) و (۰/۴) میلی‌زیمس بر سانتی‌متر) اختلاف معنی‌داری وجود و لذا با خاک زیر اشکوب گونه *D. mezerum* و خاک بیرون از تاج پوشش

نتایج نشان داد که میزان نیتروژن در خاک زیر اشکوب گونه *A. monspessulanum*، *P. scoparia* و *D. mezerum* (با متوسط میانگین ۰/۷۷، ۰/۶۹ و ۰/۷ درصد) بیشتر از خاک بیرون تاج پوشش (با میانگین ۰/۱ درصد) بود (جدول ۱، شکل ۳). همچنین نتایج فسفر نشان داد که میزان فسفر *A. monspessulanum*، *P. scoparia* و *D. mezerum* (با میانگین ۹۵/۴۷ میلی‌گرم بر کیلوگرم)، اختلاف معنی‌داری با هم نداشته بود (جدول ۱، شکل ۳). همچنین در بررسی نتایج میزان پتاسیم در خاک زیر اشکوب گونه‌های چوبی *A. monspessulanum*، *P. scoparia* و *D. mezerum* بیرون تاج پوشش (به ترتیب با میانگین ۸۵۴/۷۸، ۷۱۴/۲۶، ۵۲۸/۸۲ میلی‌گرم بر کیلوگرم) دارای سطح اختلاف معنی‌داری در سطح ۵ درصد با میزان پتاسیم خاک بیرون از تاج پوشش (با میانگین ۲۵۹/۲۲ میلی‌گرم بر کیلوگرم) بود (جدول ۱، شکل ۳).

نتایج این مطالعه در خصوص میزان کلسیم نیز نشان داد که در خاک زیر اشکوب گونه‌ها *A. monspessulanum*، *P. scoparia* و *D. mezerum* (به ترتیب با میانگین ۱۹۸۹۳/۵، ۱۵۱۴۸/۱ و ۱۷۹۰۹/۶ میلی‌گرم بر کیلوگرم) بیشتر از بیرون تاج پوشش با میانگین (۷۸۷۱/۳۳ میلی‌گرم




تأثیر سه گونه چوبی *Acer monspessulanum* L. /... یزدانی و همکاران

دارای اختلاف معنی‌داری در سطح ۵ درصد داشت (جدول ۱، شکل ۳).

جدول ۱: نتایج تجزیه واریانس یک طرفه (ANOVA) حاصل از مقایسه‌ی شاخص‌های کمی خاک

مقدار F	Sig.	درجه آزادی	میانگین	خواص خاک
۷۸/۷	۰/۰۰	۳	۰/۷۷	<i>A. monspessulanum</i>
			۰/۶۹	<i>P. scoparia</i>
			۰/۷	<i>D. mezerum</i>
			۰/۱	Control
۹۴/۵۸	۰/۰۰	۳	۹۹/۲	<i>A. monspessulanum</i>
			۹۵/۴۷	<i>P. scoparia</i>
			۵۰/۴۹	<i>D. mezerum</i>
			۱۸/۴۲	Control
۳۳/۶	۰/۰۰	۳	۸۵۴/۷۸	<i>A. monspessulanum</i>
			۷۱۴/۲۶	<i>P. scoparia</i>
			۵۲۸/۸۳	<i>D. mezerum</i>
			۲۵۹/۲۲	Control
۱۲۲/۴۹	۰/۰۰	۳	۱۹۸۳۹/۵	<i>A. monspessulanum</i>
			۱۵۱۴۸/۱	<i>P. scoparia</i>
			۱۷۹۰۹/۶	<i>D. mezerum</i>
			۷۸۷۱/۳۳	Control
۷۱/۵۸	۰/۰۰	۳	۵۱۱/۰۷	<i>A. monspessulanum</i>
			۲۷۷/۸۱	<i>P. scoparia</i>
			۲۴۲/۸۸	<i>D. mezerum</i>
			۱۵۴/۴۳	Control
۵۳/۷۶	۰/۰۰	۳	۲/۸	<i>A. monspessulanum</i>
			۲/۶	<i>P. scoparia</i>
			۲/۰۱	<i>D. mezerum</i>
			۰/۶۱	Control
۹/۱۹	۰/۰۰	۳	۷/۴۱	<i>A. monspessulanum</i>
			۸/۰۳	<i>P. scoparia</i>
			۷/۶	<i>D. mezerum</i>
			۸/۳۱	Control
۳۸/۲۷	۰/۰۰	۳	۰/۴۷	<i>A. monspessulanum</i>
			۰/۴	<i>P. scoparia</i>
			۰/۲۳	<i>D. mezerum</i>
			۰/۱۲	Control



شکل ۳: مقایسه میانگین (± انحراف معیار) مشخصه‌های خاک زیر اشکوب گونه‌های مرتعی مورد مطالعه

### بحث و نتیجه‌گیری

تغییرات در شرایط سطحی خاک با برگ‌ها و ریشه‌های گیاهان چند ساله و یک ساله مرتبط است (۱۲، ۱۳ و ۳۸). اصلاح ساختار فیزیکی و افزایش برخی عناصر در محدوده زیر تاج پوشش، زمینه را برای استقرار سایر گونه‌های مرتعی با کیفیت و خوش‌خوراکی مطلوب‌تر فراهم می‌کند (۵۲). با توجه به نقش مهم گیاهان در تعادل بوم‌سازگان و

استفاده‌های مختلفی که بشر به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آن می‌کند، شناخت روابط بین گیاهان و عوامل محیطی به‌ویژه خاک برای ثبات و پایداری آن امری اجتناب ناپذیر است (۲۹ و ۱۰). در این تحقیق نیز با مقایسه نتایج حاصل از ویژگی‌های خاک در زیر تاج پوشش گونه‌های *A. monspessulanum*، *P. scoparia*، *D. mezerum* و بیرون از تاج پوشش مورد مطالعه مشخص شد که شاخص‌های

تاج پوشش را نیز می توان به خاطر ساختار تاج پوشش گونه های چوبی نسب داد. زیرا گونه های چوبی با توجه به نقش پرستاری که دارند ضمن حفاظت از گونه های زیر اشکوب با تولید لاشبرگ استحصالی از تاج پوشش و گونه های زیر اشکوب سبب افزایش مواد غذایی خاک می شوند (۳۳). در واقع تاج پوشش گیاهان بوته ای با ایجاد تله به منظور به دام انداختن بذور و فراهم کردن شرایط لازم برای رشد گونه های علفی ضمن افزایش تولید گیاهی زیرا شکوب سبب افزایش کیفیت علوفه و همچنین به تقویت مقدار عناصر غذایی خاک کمک می کنند. در واقع پوشش گیاهی علاوه بر کاهش فرسایش خاک باعث افزایش عناصر غذایی خاک از طریق ورود لاشبرگ های هوایی و اجزای ریشه ی گونه های مختلف مرتعی می شود. در همین راستا محققان در بررسی خود در خصوص اثر عملیات های اصلاح و احیای بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و پوشش گیاهی بیان کردند، تاج پوشش گونه های چوبی مورد استفاده در طرح ضمن افزایش پوشش گیاهی زیر اشکوب باعث بهبود خصوصیات کیفی خاک و افزایش میزان عناصر حاصل خیزی خاک زیر اشکوب خود شده است (۸). از طرفی برخی محققان علت پایین بودن عناصر غذایی در بیرون تاج پوشش را به نحوه بارش ها و شرایط پراکندگی شان نسبت دادند زیرا در مناطق خشک و نیمه خشک بارش های به صورت رگباری و نامنظم می بارند در واقع خاک بیرون تاج پوشش به علت برخورد مستقیم با قطرات باران بیشتر از سطح زیر اشکوب مواد و عناصر غذایی خود را در اثر عملیات شستشو از دست می دهند (۱۶).

کلسیم و منیزیم به یکی از عناصر کم مصرف گیاهان به عنوان ترکیبات ثانویه برای رشد گیاهان ضروری می باشد که نقش اساسی در مقاومت میوه و بذر گیاهان در مباره با عوامل بیماری زا دارد (۲). تحقیقات ما در خصوص میزان عناصر منیزیم و کلسیم خاک زیر اشکوب *A. monspessulanum scoparia P.* و *D. mezerum* در مقایسه با خاک بیرون تاج پوشش نشان داد که تاج پوشش گونه های مورد مطالعه تاثیر معنی داری بر میزان کلسیم و منیزیم خاک زیر اشکوب در مقایسه با بیرون تاج پوشش

کیفی خاک در زیر تاج پوشش دارای تأثیر پذیری بیشتری نسبت به فضای بیرون تاج می باشد و باعث تغییرات معنی داری در پارامترهای کیفی خاک شده است (۱۴) و (۴۱). در همین راستا پژوهشگران به منظور بررسی ارتباط خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با گیاهان مرتعی به این نتیجه رسیدند که با فاصله گرفتن از پای پوته ها میزان مواد آلی و عناصر غذایی خاک و لاشبرگ کاهش می یابد (۱۸).

عناصر حاصل خیزی خاک ( نیتروژن، فسفر و پتاسیم) به عنوان عناصر پرمصرف گیاه ضمن افزایش مواد مغذی خاک به صورت مستقیم و غیرمستقیم نیز در مقاومت گیاه به بیماری نقش داشته که به صورت عمده در موقع خشک شدن گیاه با فرایند انتقال از اندام های خشک شده گیاهی به خاک انتقال می یابد (۲۶). نتایج ما نشان داد که میانگین درصد نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم در خاک زیر تاج پوشش گیاهان بیشتر از بیرون آن ها بود که احتمالاً به دلیل متراکم بودن ساختار تاج پوشش، لاشبرگ انباشته شده و یا داشتن ریشه های چوبی بیشتر گیاهان است (۴۸). زیاد بودن میانگین نیتروژن در خاک زیر اشکوب گونه *A. monspessulanum scoparia P.* نسبت به *D. mezerum* خاک بیرون تاج پوشش احتمالاً به دلیل برگشت بیوماس اندام های هوایی گیاهی، تولید، حجم زیاد ریشه در خاک زیر تاج پوشش و نیز می توان به حضور گونه های علفی *Valerianella oxyrrhyncha* *Marrubium vulgare* و *M. sativa* و *Medicago radiate* *Ziziphora tenuior* نیز گونه های مختلفی از جنس *Astragalus* در زیر اشکوب گونه های مورد مطالعه اشاره کرد که با نتایج مطالعات متعددی مطابقت دارد (۲۰ و ۴۵). در واقع می توان بیان کرد بالا بودن میانگین نیتروژن، در برخی گونه ها به دلیل بیشتر بودن میکروارگانیزم های تثبیت کننده نیتروژن در لاشبرگ و خاک زیر اشکوب گونه های گیاهی نسبت به هم باشد که سبب افزایش نیتروژن در خاک زیر اشکوب گونه های بوته ای می شود (۲۳).

همچنین علت افزایش فسفر و پتاسیم خاک زیر اشکوب گونه های چوبی نسبت به فضای بیرون

دارند که با نتایج (۴). مطابقت دارد. زیرا سطح تاج پوشش گیاهان مرتعی در مناطق خشک و نیمه خشک به عنوان یکی از عوامل مهم در حفظ خاک، رطوبت خاک و پوشش گیاهی مطرح است به طوری که تاج پوشش بیشتر باعث جذب بهتر نزولات جوی در رویشگاه مرتعی و جنگلی و در نهایت فرسایش کمتر و حاصل خیزی بیشتر خاک را سبب می شود (۱۶ و ۱۹).

در بررسی پژوهش انجام شده در خصوص تأثیر تاج پوشش گونه های چوبی بر روی برخی مشخصه های کیفی خاک و لاشبرگ زیراشکوب محققین نظریات متفاوتی را بیان کرده اند به نحوی که برخی میران اثر گذاری تاج پوشش گونه های چوبی بر روی برخی مشخصه های کیفی خاک و لاشبرگ زیراشکوب را به نوع گونه گیاهی و نیز مساحت و شکل تاج پوشش متفاوت گیاهان در بوم سازگان های مرتعی ارتباط می دهند (۲۲). همچنین برخی دیگر از پژوهشگران جنس سنگ بستر را از عوامل تأثیر گذار بر کیفیت خاک می دانند (۵۲). ذرات ریز ماده آلی متشکل از لاشبرگ های تجزیه شده گیاهی است که به عنوان بستر و مرکز فعالیت های میکروبی خاک، ذخیره ی کوتاه مدت عناصر غذایی و عاملی برای افزایش رطوبت خاک عمل می کند (۱۶)، و منجر به بهبود ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک می شود و در حاصل خیزی آن نقش بسزایی دارد. مقایسه ماده ی آلی خاک در این تحقیق نشان داد درصد ماده ی آلی در خاک تحت تاج پوشش گونه های *A. monspessulanum*، *P. scoparia* و *D. mezerum* بیشتر از خاک شاهد (بیرون تاج پوشش) است. چرا که گیاهان چوبی کربن آلی لاشبرگ و خاک زیرین لاشبرگ را افزایش می دهند که احتمالاً سایه ایجاد شده بر روی خاک با کاهش استرس های حرارتی، حفظ رطوبت خاک و افزایش کیفیت خاک منجر به ایجاد خرد زیستگاه های مناسب برای دیگر گیاهان می شوند (۱۳) و (۴۴). افزایش گیاهان علفی منتج به افزایش مواد آلی و سایر فاکتورهای کیفی خاک می گردد و این افزایش تا رسیدن به یک تعادل پایدار ادامه دارد که در گونه های مختلف مقادیر این ورودی ها و خروجی های متفاوت است (۱۳). این امر

همچنین با گزارش (۴۴ و ۴۸). مبنی بر اینکه میزان کربن در قسمت های چوبی گیاهان بیشتر می باشد مطابقت دارد. مقادیر مواد آلی خاک تحت تأثیر چندین فاکتور است که مهم ترین آن ها کربن معدنی تثبیت شده به صورت مواد آلی بر اثر فعل و انفعالات فتوسنتزی است. از سوی دیگر کاهش مواد آلی در مکان هایی که پوشش آنها از بین رفته یا کمتر شده (پوشش توده علفی) است به دلیل عدم تولید مواد گیاهی و تجزیه ی ذخایر قبلی به علت افزایش دمای خاک در طول فصل گرم است (۳۷). علاوه بر این موارد موسیلاژ تولید شده توسط باکتری ها و تنفس قارچ ها، نیز یک منبع قابل دسترس کربن آلی است (۴۱). اسیدیته خاک بر عواملی مانند استفاده عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان، تحرک عناصر سنگین و فعالیت میکروارگانیسم های خاک مؤثر است. عواملی نظیر آبشویی کاتیون های بازی، فرآیندهای نیتراتی شدن، تولید اسیدهای آلی به همراه آزادسازی اسیدکربنیک از ریشه و تنفس میکروبی به عنوان مکانیسم های کنترل کننده اسیدیته خاک محسوب می شوند (۳۴). نتایج ما در خصوص اسیدیته و هدایت الکتریکی خاک در این تحقیق نشان داد که خاک بیرون از تاج پوشش میزان قلیابیت بیشتری نسبت به خاک زیر تاج پوشش گونه های چوبی است. به صورتی که گونه *A. monspessulanum*، به لحاظ اسیدی تر بودن خاک زیر اشکوب دارای بیشترین میزان هدایت الکتریکی نسبت به سایر گونه ها و نیز گونه های بیرون تاج پوشش دارد که با نتایج (۴۷ و ۱۹) مطابقت دارد. لذا می توان دلیل آن را به زیاد بودن مقدار بقایای گیاهی در زیر تاج پوشش گونه *A. monspessulanum* نسبت به سایر گونه ها و بیرون تاج پوشش اشاره کرد. که احتمالاً لاشبرگ های استحالی از *A. monspessulanum* مانع شستشوی میزان مواد آلی و هوموسی خاک خود شده و در نهایت هدایت الکتریکی خاک زیر تاج پوشش خود را افزایش داده است زیرا از نظر (۱۱) مطابقت دارد، اختلاف گونه ها در تجزیه لاشبرگ و نیز افزایش سن گیاهان می تواند یکی از مهمترین اثرات پوشش گیاهی در pH و هدایت الکتریکی لاشبرگ و خاک گونه های گیاهی باشد. در واقع اسیدیته خاک تحت تأثیر بقایای گیاهی قرار می گیرد و بسته به اینکه پوشش گیاهی دارای

مقایسه با بیرون تاج پوشش بر شاخص‌های حاصل‌خیزی خاک (نیترژن کل خاک، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و درصد ماده‌ی آلی و سایر پارامترها) را در مناطق خشک و نیمه‌خشک که اکوسیستم‌های حساس و شکننده‌ای دارند، را بیان کرد. بررسی عملکرد گونه‌ها نشان داد که گونه‌های *A. monspessulanum* و *P. scoparia* نقش پررنگ‌تری در بهبود خصوصیات شیمیایی خاک و عملکرد مرتع نسبت به گونه *D. mezerum* دارد. بنابراین می‌توان از نتایج این پژوهش در جهت اصلاح و احیای پوشش گیاهی مناطق با شرایط مشابه استفاده کرد که از دستاوردهای مهم این پژوهش است.

چه نوع ترکیبات شیمیایی باشد می‌تواند به‌طور جزئی بر pH خاک تأثیر داشته باشد (۸). هدایت الکتریکی خاک بستگی خاصی به مقدار کاتیون‌های خاک دارد و هر چقدر این کاتیون‌ها بیشتر باشند مقدار هدایت الکتریکی افزایش می‌یابد (۴۹). مقدار هدایت الکتریکی در زیر اشکوب گونه *A. monspessulanum* بیشتر بود که علت آن می‌تواند آبشویی عناصر کلسیم، منیزیم و پتاسیم و تجمع آنها در زیراشکوب آن دانست. به همین منظور برخی پژوهشگران اظهار داشتند این امر را می‌توان به برگشت بیومس گیاهی و تجزیه آن و تجمع املاح در سطح خاک ربط داد (۱۵). درمجموع این مطالعه نقش مؤثر اثر تاج پوشش سه گونه چوبی *A.*

## References

1. AghaAlikhani, M., H. Kazemi-Poshtmasari & F. Habibzadeh, 2013. Energy use pattern in rice production: A case study from Mazandaran province, Iran. *Energy Conversion and Management*, 69: 157-162.
2. Aguilera, L.E., C. Armas, A.P. Cea, J. R. Gutiérrez, P. L. Meserve & D. A. Kelt, 2016. Rainfall, microhabitat, & small mammals influence the abundance and distribution of soil microorganisms in a Chilean semi-arid shrubland, *Journal of Arid Environments*, 126: 37-46.
3. Augusto, L., J.L. Dupouey & J. Ranger, 2003. Effects of tree species on understory vegetation and environmental conditions in temperate forests, *Annals of Forest Science*, 60(8): 823-831.
4. Berg, B., M. B. Johansson, C. Liu, M. Fauturi, P. Sanborn, L. Vesterdal & L. Ukonmaanaho, 2018. Calcium in decomposing foliar litter—A synthesis for boreal and temperate coniferous forests. *Forest Ecology and Management*, 403: 137-144.
5. Bower, C.A., R.F. Reitemeier & M. Fireman, 1952. Exchangeable cation analysis of saline and alkali soils. *Soil Science*, 73(4): 251-262.
6. Bremner, J.M. & C.S. Mulvaney, 1982. Nitrogen-Total. In: Page, A.L., Ed., *Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and Microbiological Properties*, American Society of Agronomy, Soil science society of America, 595-624.
7. Busch, V., V. H. Klaus, C. Penone, D. Schäfer, S. Boch, D. Prati & N. Hölzel, 2018. Nutrient stoichiometry and land use rather than species richness determine plant functional diversity. *Ecology and Evolution*, 8(1): 601-616.
8. Chahouki, M. A. & A. Zarei, 2013. Ecological effects of *Atriplex canescens* on planted areas in Iran. *Vegetos-An International Journal of Plant Research*, 24(2): 1-12.
9. Chapman, H.D. & P.F. Pratt, 1962. *Methods of analysis for soils, plants and waters*. *Soil Science*, 93(1): 68-78.
10. Chillo, V., D.P. Vázquez, M.M. Amoroso & E.M. Bennett, 2018. Land-use intensity indirectly affects ecosystem services mainly through plant functional identity in a temperate forest. *Functional Ecology*, 32(5):1390-1399.
11. Cornelissen, J. H., F. Sibma, R. S. Van Logtestijn, R. A. Broekman & K. Thompson, 2011. Leaf pH as a plant trait: species-driven rather than soil-driven variation. *Functional Ecology*, 25(3): 449-455.
12. Erfanzadeh, R., M. Yazdani & A.M. Arani, 2021. Effect of different shrub species on their sub-canopy soil and vegetation properties in semiarid regions. *Land Degradation & Development*, 32(11):3236-3247.
13. Erfanzadeh, R., M.A. Kesbi B. Fattahi, & A.A. Sher 2023. Is the soil seed bank a reliable source for passive restoration of intensive grazed habitats in river riparian areas of western Iran?. *Ecological Engineering*, 192(6):106-129.

14. Erfanzadeh, R., R. Shahbazian & H. Zali, 2014. Role of plant patches in preserving flora from the soil seed bank in an overgrazed high-mountain habitat in northern Iran, *Journal of Agricultural Science and Technology*, 16(1): 229-238.
15. Erfanzadeh, R., S. Hazhir & M. Jafari, 2020. Effect of cushion plants on the soil seed bank in overgrazed semiarid regions. *Land Degradation & Development*, 31(8): 990-1000.
16. Erktan, A., C. Roumet, D. Bouchet, A. Stokes, F. Pailler & Munoz, F, 2018. Two dimensions define the variation of fine root traits across plant communities under the joint influence of ecological succession and annual mowing. *Journal of Ecology*, 106(5): 2031-2042.
17. Etemadi, H., Smoak, J. M. & Sanders, C. J., 2018. Forest migration and carbon sources to Iranian mangrove soils. *Journal of Arid Environments*, 157, 57-65.
18. Fischer, S., H. J. Koch & K. Bürcky, 2015. Effect of liming central European loess soils on soil extractable phosphorus and potassium as determined by electro-ultrafiltration. *Archives of Agronomy and Soil Science*, 61(6): 725-736.
19. Garratt, M. P., R. Bommarco, D. Kleijn, E. Martin, S. R. Mortimer, S. Redlich & S. van Gils, 2018. Enhancing soil organic matter as a route to the ecological intensification of European arable systems. *Ecosystems*, 1-12.
20. Ghasempour, M., R. Erfanzadeh & P. Török, 2022. Fire effects on soil seed banks under different woody plant species in Mazandaran province. *Iran. Ecological Engineering*, 183:106762.
21. Guo, N., C. Sang, M. Huang, R. Zhang, A.A. Degen, L. Ma, Y. Bai, T. Zhang, W. Wang, J. Niu, & S. Li, 2023. Long-term active restoration of degraded grasslands enhances vegetation resilience by altering the soil seed bank. *Agronomy for Sustainable Development*, 43(1):1-6.
22. Hadinajad, M., R. Erfanzadeh & H. Ghelichnia, 2020. Effect of shrub type on species diversity and richness of soil seed bank in semiarid regions (case study: Chenarnaz rangelands, Khatam city, Yazd province), *Journal of Rangeland*, 14(3): 539-550.
23. HagenThorn, A., L. Callesn, K. Armolaitis & B. Nihlgard, 2004. The impact of six European tree species on the chemistry of mineral topsoil in forest plantations on former agricultural land. *Forest Ecology and Management*, 195: 373-384.
24. Hailemariam, M., E. Birhane, G. Gebresamuel, A. Gebrekiros, Y. Desta, A. Alemayehu & L. Norgrove, 2018. Arbuscular mycorrhiza effects on *Faidherbia albida* (Del.) A. Chev. growth under varying soil water and phosphorus levels in Northern Ethiopia. *Agroforestry Systems*, 1-14.
25. Hazhir, S., R. Erfanzadeh & M. Jafari, 2020. Spatial variation of soil chemical properties in relation to the canopy of two cushion plants *Astragalus myriacanthus* and *Acantholimon spinosum* in Yazd province. *Iranian Journal of Rangeland and Desert Research*, 28(3): 410-423. (In Persian).
26. Johnson, B. G., P. S. Verburg & J. A. Arnone, 2016. Plant species effects on soil nutrients and chemistry in arid ecological zones. *Oecologia*, 182(1): 299-317.
27. Kopittke, P. M., M. C. Hernandez-Soriano, R. C. Dalal, D. Finn, N. W. Menzies, C. Hoeschen & C.W. Mueller, 2018. Nitrogen-rich microbial products provide new organo-mineral associations for the stabilization of soil organic matter. *Global Change Biology*, 24(4): 1762-1770.
28. Lashkari Sanami, N., J. Ghorbani, S.H. Zali & G. Vahabzadeh, 2022. Edaphic optimum niche for some pioneer rangeland plants in coal mine wastes in Karmozd mines, Mazandaran province, Iran. *Journal of Rangeland*, 16(1): 1-16.
29. Liu, L., Z. Tan, H. Gong & Q. Huang, 2018. Migration and transformation mechanisms of nutrient elements (N, P, K) within biochar in straw–biochar–soil–plant systems: a review. *Acs Sustainable Chemistry & Engineering*, 7(1): 22-32.
30. Mládková, P., J. Mládek, S. Hejduk, M. Hejcman & R.J. Pakeman, 2018. Calcium plus magnesium indicates digestibility: the significance of the second major axis of plant chemical variation for ecological processes. *Ecology Letters*, 21(6): 885-895.
31. Moghiminejad, F., A. Tavili, M. Jafari, A. Shirvany & M.A. Zare Chahoki, 2022. Investigating the effect of lead and cadmium on absorption of high consumption nutrients on *Glycyrrhiza glabra*. *Journal of Rangeland*, 16(1): 17-32.
32. Molina, A. J., P. Llorens, P. Garcia-Estringana, M. M. de las Heras, C. Cayuela, F. Gallart & J. Latron, 2019. Contributions of throughfall, forest and soil characteristics to near-surface soil water-content variability at the plot scale in a mountainous Mediterranean area. *Science of The Total Environment*, 647:1421-1432.
33. Mozafarian, v., 2013. Recognition of medicinal herbs and perfume of Iran. Tehran University Publications, 1445 p. (In Persian).



34. Naseri, S., M.A. Adibi, S.A. Javadi, M. Jafari & M. Zadbar, 2013. Investigation of the effect of biological stabilization practice on some soil parameters (North East of Iran). *Journal of Rangeland Science*, 2(4): 643-653.
35. Nosoetto, M. D., E.G. Jobbágy & J. M. Paruelo, 2006. Carbon sequestration in semi-arid rangelands: comparison of *Pinus ponderosa* plantations and grazing exclusion in NW Patagonia. *Journal of Arid Environments*, 67(1): 142-156.
36. Olano, J.M., M. Eugenio, A.I. García-Cervigón, M. Folch & V. Rozas, 2012. Quantitative tracheid anatomy reveals a complex environmental control of wood structure in continental Mediterranean climate. *International Journal of Plant Sciences*, 173(2): 137-149.
37. Olvera-Carrillo, Y., I. Méndez, M. E. Sánchez-Coronado, J. Márquez-Guzmán, V. L. Barradas, P. Huante & A. Orozco-Segovia, 2009. Effect of environmental heterogeneity on field germination of *Opuntia tomentosa* (Cactaceae, Opuntioideae) seeds. *Journal of Arid Environments*, 73(4): 414-420.
38. Osman, K. T., 2013. *Physical properties of forest soils*, forest soils spr international publishing Switzerland, 19-44.
39. Paustian, K., J. Lehmann, S. Ogle, D. Reay, G.P. Robertson & P. Smith, 2016. Climate-smart soils. *Nature*, 532(7597):49-57.
40. Pellegrini, A. F., A. Ahlström, S. E. Hobbie, P. B. Reich, L. P. Nieradzik, A. C. Staver & R. B. Jackson, 2018. Fire frequency drives decadal changes in soil carbon and nitrogen and ecosystem productivity. *Nature*, 553(7687): 194.
41. Pfeiffer, M., L. Langan, A. Linstädter, C. Martens, C. Gaillard, J. C. Ruppert & S. Scheiter, 2019. Grazing and aridity reduce perennial grass abundance in semi-arid rangelands—Insights from a trait-based dynamic vegetation model. *Ecological Modelling*, 395: 11-22.
42. Ridolfi, L., F. Laio & P. D’Odorico, 2008. Fertility island formation and evolution in dryland ecosystems. *Ecology and Society*, 13(1): 1-13.
43. Stocking, M.A., 2017. Assessing vegetative cover and management effects. In *Soil Erosion Research Methods* Routledge, 211-234.
44. Tejada, M., C. Garcia, J. L. Gonzalez & M. T. Hernandez, 2006. Use of organic amendment as a strategy for saline soil remediation: influence on the physical, chemical and biological properties of soil. *Soil Biology and Biochemistry*, 38(6): 1413-1421.
45. Tessema, Z.K. & E.F. Belay, 2017. Effect of tree species on understory vegetation, herbaceous biomass and soil nutrients in a semi-arid savanna of Ethiopia. *Journal of Arid Environments*, 139: 76-84.
46. Thompson, D., L. Walker, F. Landau & L. Stark, 2005. The influence of elevation, shrub species, and biological soil crust on fertile islands in the Mojave Desert, USA, *Journal of Arid Environments*, 61(4): 609-629.
47. Tracol, Y., J.R. Gutierrez & F.A. Squeo, 2011. Plant area index and microclimate underneath shrub species from a Chilean semiarid community. *Journal of Arid Environment*, 75: 1-6.
48. Velbert, F., T. Kleinebecker, O. Mudrak, P. Schwartz & N. Hazel, 2017. Time lags in functional response to management regimes – evidence from a 25-year field experiment in wet meadows. *Journal of Vegetation Science*, 28:313–324.
49. Venter, Z. S., S. L. Scott, J. Strauss, K. Jacobs & H. J. Hawkins, 2017. Increasing crop diversity increased soil microbial activity, nitrogen-sourcing and crop nitrogen, but not soil microbial diversity. *South African Journal of Plant and Soil*, 34(5):371-378.
50. Wang, Q.K., S.L. Wang & Y. Huang, 2008. Comparisons of litter fall, litter decomposition and nutrient return in a monoculture *Cunninghamia lanceolata* and a mixed stand in southern China. *Forest Ecology and Management*, 255: 1210-1218.
51. Yang, Z. P., Q. Zhang, Y. L. Wang, J. J. Zhang & M. C. Chen, 2011. Spatial and temporal variability of soil properties under caragana microphylla shrubs in the northwestern Shanxi Loess Plateau, China. *Journal of arid Environments*, 75(6): 538-544.
52. Zandi, L., R. Erfanzadeh & H. Joneidi, 2020. The effect of introduced Species on rangelands soil quality with emphasizing on Microbial Respiration, *Journal of Rangeland*, 14(1): 1-11.
53. Zhou, X., X. An, R. De Philippis, C. Ye, T. Ke, Y. Zhang & L. Chen, 2019. The facilitative effects of shrub on induced biological soil crust development and soil properties. *Applied Soil Ecology*, 137: 129-138.