

تعیین ارزش غذایی و تجزیه پذیری ماده خشک و دیواره سلولی گونه *Astragalus crenatus* طی مراحل مختلف

فنولوژیکی در مراتع هیر- نئور استان اردبیل

فرزاد میرزایی آقچه قشلاق^{۱*}، اردوان قربانی^۲، جمال سیف دواتی^۳، سعید مهدیزاده^۴ و رقیه ولی زاده یونجالی^۴

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ تاریخ تصویب: ۱۳۹۳/۱۱/۰۱

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی ترکیبات شیمیایی و فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری گون علفی (*Astragalus crenatus* Schult.) و تعیین ارزش غذایی آن انجام گرفت. نمونه برداری گیاهی از مراتع ارتفاعات هیر به نئور در دو سایت (سایت یک در محدوده ارتفاعی ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ متری و سایت دو در ارتفاع ۱۹۰۰ تا ۲۱۰۰ متری از سطح دریا) در شهرستان اردبیل و در سه مرحله فنولوژیکی (رشد رویشی، گلدهی و بذردهی) انجام شد. پس از آماده‌سازی نمونه‌ها، مقدار دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز از روش ون سوست و برای اندازه‌گیری ترکیبات شیمیایی از روش‌های مرسوم آزمایشگاهی AOAC استفاده شد. تجزیه‌پذیری و قابلیت هضم شکمبه‌ای نیز به روش آزمایشگاهی و با استفاده از دو رأس گوسفند نر نژاد مغانی دارای فیستوله شکمبه‌ای تعیین شد. نتایج نشان داد از لحاظ قابلیت هضم و تجزیه‌پذیری ماده خشک، ماده آلی، دیواره سلولی و دیواره سلولی منهای همی سلولز سایت ارتفاعی دوم به‌طور معنی‌داری بیشتر از سایت یک بود ($p < 0.01$). همچنین تجزیه تقریبی نمونه‌های جمع‌آوری شده نشان داد مقدار دیواره سلولی و دیواره سلولی منهای همی سلولز به‌صورت درصد در ماده خشک در سایت یک به‌طور معنی‌داری نسبت به سایت دو بیشتر بود و بین مراحل فنولوژیکی نیز تفاوت معنی‌دار وجود داشت ($p < 0.01$). نتایج نشان داد در هر دو سایت، مرحله رشد رویشی دارای قابلیت هضم شکمبه‌ای، بعد از شکمبه‌ای و خاکستر بیشتر و دیواره سلولی، دیواره سلولی منهای همی سلولز و ماده آلی کمتری نسبت به سایر مراحل رشد داشت. بنابراین، پتانسیل تجزیه‌پذیری ماده خشک گونه در مرحله اول رشد بیشتر بوده و با بلوغ گیاه ارزش غذایی آن برای دام‌های چراکننده کاهش می‌یابد، در نتیجه بهترین زمان چرا با توجه به این گونه در منطقه، حداکثر اواخر بهار می‌باشد. همچنین در مطالعات ارزیابی ظرفیت و مدیریت مراتعی که گونه مورد مطالعه گسترش دارد، می‌توان از این نتایج استفاده کرد.

واژه‌های کلیدی: ارزش غذایی، تجزیه‌پذیری، مراحل رویشی، مراتع هیر-نئور، استان اردبیل. *Astragalus crenatus* Schult.

^۱ - استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه محقق اردبیلی

* نویسنده مسئول: f_mirzaei@uma.ac.ir

^۲ - دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه محقق اردبیلی

^۳ - استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه محقق اردبیلی

^۴ - دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشگاه محقق اردبیلی

مقدمه

مراتع یکی از مهم‌ترین منابع طبیعی کشور به‌شمار می‌آیند که نقش ارزنده‌ای در تولید فرآورده‌های دامی، حفاظت خاک و تعادل آب و هوایی هر منطقه دارند. نقش مراتع در تولید فرآورده‌های دامی از لحاظ تولید خوراک دام به‌صورت طبیعی و ارزان دارای اهمیت است. دو سوم از کل هزینه تولید در واحدهای مختلف پرورش دام به هزینه خوراک اختصاص دارد (۱۴). از طرف دیگر با توجه به‌مسئله کمبود پروتئین حیوانی و ضرورت افزایش تولید با منابع موجود، لازم است تا از ارزش تغذیه‌ای منابع خوراکی قابل دسترس اطلاع کافی وجود داشته باشد (۶). بنابراین، با توجه به نقش اساسی تغذیه در بازده اقتصادی و عملکردی دام ضرورت دارد این منابع طبیعی و ارزان قیمت از لحاظ کمیّت و کیفیت ارزش تغذیه‌ای مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. همچنین در صورت استفاده صحیح از این منابع خوراکی هزینه انرژی و پروتئین برای تولید هر واحد فرآورده دامی کاهش خواهد یافت. ارزش غذایی گیاهان بر مبنای مقدار پروتئین قابل هضم، سلولز، چربی و مواد عاری از ازت مشخص می‌شود (۱۹). ارزش غذایی و قابلیت هضم گیاهان تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند گونه و واریته گیاه، مرحله رشد، میزان برگ، خاک و آب و هوا است. در این میان مرحله رشد گیاه در هنگام برداشت بیشتر از هر عامل دیگری بر کیفیت علوفه تأثیر می‌گذارد (۳، ۴، ۶ و ۲۹). محتوای سلولی، پروتئین خام و فسفر با افزایش سن گیاه کاهش و میزان الیاف خام بویژه دیواره سلولی منهای همی‌سلولز افزایش معنی‌داری پیدا می‌کند (۹ و ۱۹). تحقیقات نسبتاً زیادی در ارتباط با تعیین ارزش غذایی گیاهان مرتعی با استفاده از روش‌های مختلف در دنیا، از جمله ایران و استان اردبیل انجام گرفته است. به‌طور مثال، ارزانی و همکاران (۲۰۱۲) با بررسی کیفیت علوفه گونه‌های مهم مرتعی در مراتع نیمه استپی ارسق استان اردبیل، تأثیر نوسانات فصلی و سالیانه را بر درجه مطلوبیت علوفه در دسترس دام‌های این منطقه گزارش نمودند. آن‌ها کیفیت بالای علوفه این مراتع به لحاظ تأمین نیازهای انرژی و پروتئین دام‌های چرا کننده را در مراحل اولیه رشد در فصل بهار و کاهش شاخص‌های کیفیت علوفه در مراحل پایانی رشد در تابستان و اوایل پاییز را گزارش و لزوم استفاده از مکمل‌های غذایی در پایان فصل رویش را توصیه نمودند. پاشایی و همکاران (۲۰۱۲) ارزش غذایی گونه *Artemisia siberi* را طی سه مرحله فنولوژیکی و دو طبقه ارتفاعی در مراتع اردبیل بررسی و گزارش نمودند. در بین مراحل فنولوژیکی مرحله رشد رویشی بالاترین ارزش غذایی را از نظر پروتئین خام، انرژی قابل

متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی دارا می‌باشد. عزیزپور و همکاران (۲۰۱۳) کیفیت و قابلیت هضم گونه *Kochia prostrata* در دو منطقه مرتعی (مشگین‌شهر و نئور) در استان اردبیل را بررسی و کاهش معنی‌دار ماده خشک، پروتئین خام، خاکستر خام و چربی خام و افزایش در میزان دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی‌سلولز و ماده آلی گونه‌ی فوق را با پیشرفت مراحل رویشی عنوان نمودند. در مطالعه دیگری، عشقی و همکاران (۲۰۱۳) ارزش غذایی گونه *Agropyron tauri* را طی مراحل مختلف رشد در ارتفاعات نئور استان اردبیل بررسی و نتیجه گرفتند که بین مقادیر غلظت ماده خشک، دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی‌سلولز، خاکستر و همچنین بین فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری ماده خشک، دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی‌سلولز و ماده آلی در بین مراحل مختلف رشد اختلاف معنی‌داری وجود داشت. قنبری و صحرائی (۲۰۱۲) ارزش غذایی سه گونه مرتعی *Trifolium montanum* و *Festuca ovina* و *Alopecurus textile* را طی فصول بهار و تابستان در مراتع سیلان بررسی و گزارش نمودند مرحله اول نمونه‌برداری گیاهان که در اواخر بهار و اوایل تابستان بود قادر به تأمین مقادیر کافی مواد مغذی برای دام‌های چراکننده در این مراتع می‌باشد. این محققین همچنین به‌منظور دستیابی به عملکرد تولیدی بالا در دام‌های چرا کننده در مراتع سیلان، استفاده از مکمل غذایی را توصیه نمودند. گون‌علفی با نام علمی *Astragalus crenatus* Schult. گیاهی یک یا چند ساله از خانواده Fabaceae با فرم رویشی علفی است (۱۴ و ۲۵)، از گونه‌های خوش‌خوراک و در زمره گیاهان کم‌شونده منطقه محسوب می‌شود. گون‌های علفی به‌دلیل میزان پروتئین بالا و کم بودن فیبر، به‌شدت مورد چرای دام قرار می‌گیرند (۱۴). رویشگاه‌های آن مناطق مرتعی، شیب‌دار و خاک‌های نسبتاً حاصلخیز در لابلای سنگ‌ها می‌باشد و هر چه شرایط رطوبتی، اقلیمی و رژیم رطوبتی خاک مطلوب‌تر می‌شود، گسترش گونه چشم‌گیرتر است. این گونه در کشورهای مراکش، تونس، الجزیره، لیبی، مصر، عربستان، اسرائیل، اردن، سوریه، عراق، ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، اوزبکستان، افغانستان، پاکستان و ایران انتشار دارد (۱۴ و ۲۵). از کل مساحت استان اردبیل نزدیک به ۱۰۱۵۰۰۰ هکتار (۵۶/۸ درصد) آن را مراتع تشکیل داده است. مراتع اطراف دشت اردبیل نیز از مهم‌ترین مراتع استان محسوب شده و همواره مورد چرای دام‌های منطقه قرار می‌گیرند. از جمعیت ۶ میلیون واحد دامی استان اردبیل، بالغ بر ۲/۵ میلیون واحد دامی از نظر تغذیه وابستگی به این مراتع دارند (۲). برای رسیدن به‌عملکرد تولیدی مناسب با کاهش هزینه‌های تغذیه،

Trifolium repens, *Potentilla argentea*, *pratensis*، *Thymus kotschyanus* و *Vicia ervilia* انتشار دارند. بهره‌برداری از این مراتع با توجه به اینکه مراتع روستایی می‌باشند، از برف تا برف و اصول بهره‌برداری در آن‌ها رعایت نمی‌گردد. در کل وضعیت این مراتع متوسط و گرایش آن‌ها پس‌رونده می‌باشد.

نمونه‌برداری در دو ارتفاع فوق و در سه مرحله فنولوژیکی (رویشی، گلدهی و بذردهی) و از ارتفاع دو سانتی‌متری بالای سطح خاک انجام گرفت (جدول ۱). در هر ارتفاع و هر مرحله فنولوژیکی از هر گونه سه تکرار (متوسط ۳۰ پایه) جمع‌آوری شد. پس از جمع‌آوری نمونه‌ها تا زمان انجام آزمایشات جهت جلوگیری از کپک‌زدگی داخل پاکت‌های کاغذی منفذدار نگهداری شد.

تجزیه شیمیایی

پس از آماده سازی نمونه‌ها، میزان NDF و ADF آن‌ها با استفاده از روش ون‌سوست^۱ و همکاران (۱۹۹۱) اندازه‌گیری شد. برای اندازه‌گیری ماده خشک، چربی خام، عصاره عاری از ازت، خاکستر خام و ماده آلی از روش‌های مرسوم آزمایشگاهی AOAC (۲۰۰۰) استفاده شد.



شکل ۱- محل سایت‌های نمونه‌برداری در سطح منطقه، شهرستان اردبیل و استان اردبیل

تعیین ارزش غذایی و فراسنجه‌های مختلف تجزیه‌پذیری ماده خشک و ترکیبات دیواره سلولی در شکمبه اهمیت زیادی دارد. در مجموع با جمع‌آوری چنین اطلاعاتی کمک قابل توجهی به مدیریت مراتع، تولیدات دامی و در نهایت به افزایش راندمان تولید دام صورت می‌گیرد. بنابراین، در راستای تولید اطلاعات قابل استفاده در مدیریت دام و مرتع هدف از این پژوهش تعیین قابلیت هضم شکمبه‌ای و بعد شکمبه‌ای گونه *Astragalus crenatus* Schult. به‌عنوان یکی از گونه‌های مهم مراتع منطقه هیر-نور استان اردبیل بود.

مواد و روش‌ها

منطقه مورد مطالعه و نمونه‌برداری

در این تحقیق نمونه‌برداری از دو سایت در ارتفاعات هیر به نور از توابع شهرستان اردبیل انتخاب شد. سایت اول با مساحت حدود یک هکتار و اراضی دامنه‌ی در محدوده‌ی ارتفاعی ۱۵۰۰-۱۷۰۰ متری از سطح دریا واقع در ابتدای دره‌ی هیر (منطقه دربند) در موقعیت جغرافیایی $37^{\circ}31'48''$ طول شرقی و $38^{\circ}05'47''$ عرض شمالی، با جهت شمال‌غربی و شیب ۳۰ تا ۵۰ درصد با بارندگی متوسط سالیانه حدوداً ۳۷۰ میلی‌متر و دمای متوسط ۹ درجه سانتی‌گراد و سایت دوم نیز با مساحت حدود یک هکتار و اراضی دامنه‌ی در محدوده ارتفاعی ۱۹۰۰-۲۱۰۰ متر از سطح دریا در موقعیت جغرافیایی $33^{\circ}33'48''$ طول شرقی و $38^{\circ}04'62''$ عرض شمالی، با جهت شمال‌غربی و شیب ۳۰ تا ۵۰ درصد و بارندگی متوسط سالیانه حدود ۴۴۰ میلی‌متر و دمای متوسط ۸ درجه سانتی‌گراد تعیین شدند (شکل ۱). خاک هر دو سایت متوسط تا عمیق با بافت لومی-رسی و نسبتاً حاصلخیز می‌باشد. تیپ گیاهی غالب سایت‌های انتخاب شده بوته‌زار-علفزار است. در سایت اول گونه‌های *Bromus*، *Achillea talagonica*، *Dactylis*، *Artemisia fragrans*، *tomentellus*، *Astragalus glomerata*، *Kochia prostrata*، *Poa bulbosa*، *Cousinia pinarocephala*، *pinetorum*، *Dianthus orientalis*، *Vicia canescens*، *Poa trivialis* و *Gundelia tournefortii* انتشار دارد. در سایت دوم نیز گونه‌های *Agropyron tauri*، *Achillea talagonica*، *Artemisia*، *Anchusa italica*، *Alopecurus textails*، *Astragalus aegobromus*، *aucheri*، *Astragalus lisaricus*، *angustifolius*، *Bromus pinetorum*، *persicus*، *Onobrychis*، *Lathyrus pratensis*، *tomentellus*، *Poa fugax*، *Festuca ovina*، *cornuta*

¹. Van Soest

جدول ۱- تاریخ جمع‌آوری نمونه‌های *A. crenatus* در مراتع هیر-نئور استان اردبیل در دو ارتفاع و سه مرحله رشد فنولوژیکی

ارتفاع	مرحله رویشی	مرحله گلدهی	مرحله بذردهی
سایت یک (۱۷۰۰-۱۵۰۰) متر	۹۰/۳/۱۵ - ۹۰/۳/۱۰	۹۰/۴/۱۵ - ۹۰/۴/۱۵	۹۰/۵/۱۵ - ۹۰/۴/۲۱
سایت دو (۲۱۰۰-۱۹۰۰) متر	۹۰/۳/۲۱ - ۹۰/۳/۱۴	۹۰/۴/۲۰ - ۹۰/۳/۲۰	۹۰/۵/۲۰ - ۹۰/۴/۲۵

روش کیسه‌های نایلونی

با توجه به اینکه در روش کیسه‌های نایلونی دام مورد آزمایش باید حداقل تغییرات فیزیولوژیکی را از لحاظ تأثیر بر نتایج آزمایش داشته باشد و دام ماده دارای سیکل تناسلی بوده و ممکن است علائم فعلی از خود بروز داده و باعث ایجاد مشکلاتی در روند تحقیقات شود. همچنین در زمان به‌کارگیری دام نر حداکثر پتانسیل قابلیت هضم نمونه‌های مورد مطالعه قابل اندازه‌گیری می‌باشد. لذا در این مطالعه نیز همانند بسیاری از مطالعات دیگر اندازه‌گیری قابلیت هضم از دام نر فیستول (۲) رأس گوسفند نر مغانی بالغ اخته شده دارای فیستولای شکمبه‌ای با متوسط وزن زنده 58 ± 5 استفاده شد. پس از آسیاب کردن نمونه‌ها با استفاده از الک با قطر منفذ ۵۰ میکرومتر الک شدند و سپس مقدار ۴ گرم نمونه خشک گونه در زمان‌های صفر، ۲، ۴، ۸، ۱۶، ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت در سه تکرار در شکمبه هر گوسفند انکوباسیون شد. کیسه‌های به‌کار رفته در این آزمایش دارای منافذی به قطر ۴۵-۵۰ میکرومتر بود. پس از انکوباسیون کیسه‌های دارای نمونه از شکمبه خارج و پس از شستشو در ماشین لباس‌شویی با آب سرد به مدت ۲۰ دقیقه، در آن ۶۵ درجه به مدت ۴۸ ساعت خشک گردید (۸). پس از توزین کیسه‌ها مواد خوراکی باقیمانده در کیسه بر حسب ماده خشک تعیین شد. درصد تجزیه‌پذیری هر یک از مواد مغذی، پس از تعیین مقدار آن ماده مغذی در نمونه اولیه و باقی مانده آن در کیسه پس از مدت زمان تخمیر با استفاده از رابطه ۱ تعیین گردید (۲۲).

رابطه ۱

باقیمانده در نمونه پس از تخمیر) - ۱ = درصد ناپدید شدن ماده مغذی
 $100 \times (\text{مقدار اولیه ماده مغذی در نمونه} / \text{مقدار ماده مغذی})$

تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها

میزان ناپدید شدن مواد در واحد زمان و همچنین فراسنجه‌های پتانسیل تجزیه‌پذیری (PD) و پتانسیل تجزیه-پذیری a، b و c با استفاده از رابطه غیرخطی (رابطه ۲)

ارسکوف و مک‌دونالد^۱ (۱۹۷۹) و با استفاده از نرم‌افزار Fit curve محاسبه شد.

$$P = a + b(1 - e^{-ct})$$

رابطه ۲

در این رابطه a بخش تجزیه‌پذیر سریع (درصد)، b بخش تجزیه‌پذیر آهسته، c سرعت تجزیه‌پذیری (درصد در ساعت)، p تجزیه‌پذیری در واحد زمان (t) می‌باشد.

داده‌های بدست آمده در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل به وسیله نرم‌افزار SAS 9.1 و با استفاده از رویه مدل عمومی خطی انجام گرفت. برای مقایسه میانگین‌ها از روش آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال ۵ درصد استفاده شد. مدل آماری مورد استفاده بر اساس رابطه ۳ بوده است.

$$Y_{ijk} = \mu + L_i + S_j + LS_{ij} + \varepsilon_{ijk}$$

رابطه ۳

که در آن μ میانگین کل، L_i = سایت ارتفاعی، S_j = مرحله فنولوژیکی، LS_{ij} = اثر متقابل سایت ارتفاعی و مرحله فنولوژیکی و ε_{ijk} = خطای آزمایشی بود.

نتایج

ترکیبات شیمیایی گونه *A. crenatus* در جدول (۲) آورده شده است. مرحله رشد و ارتفاع اثر معنی‌داری بر ترکیبات شیمیایی این گونه داشتند ($P < 0.01$). اثر متقابل ارتفاع و مرحله رشد به جز چربی ($P < 0.05$) بر سایر ترکیبات شیمیایی آن معنی‌دار نبود. با بلوغ گیاه دیواره سلولی، دیواره سلولی منهای همی سلولز، ماده آلی و ماده خشک افزایش و میزان خاکستر کاهش یافت. بیشترین میزان دیواره سلولی و دیواره سلولی منهای همی سلولز در مرحله سوم سایت یک و کمترین میزان آن در مرحله یک سایت دو مشاهده شد. بین مراحل رشد در هر دو سایت تفاوت معنی‌دار مشاهده شد ($P < 0.01$). چربی در مرحله اول سایت دو بیشترین مقدار را داشت و در مرحله دوم سایت یک دارای کمترین مقدار بود.

تجزیه‌پذیری ماده خشک گون علفی در زمان‌های مختلف انکوباسیون در جدول (۴) نشان داده شده است. اثر مرحله رشد، ارتفاع و اثر متقابل ارتفاع و مرحله رشد در تمام زمان‌های انکوباسیون معنی‌دار بود ($P < 0.01$). بر اساس نتایج حاصله، بیشترین میزان تجزیه‌پذیری ماده خشک در مرحله اول سایت

¹ Ørskov & McDonald

خشک همزمان با پیشرفت بلوغ گیاه دیده شد ($p < 0.01$). بخش تجزیه پذیر کند (b) ماده خشک گون علفی در مراحل رشد هر دو سایت تفاوت معنی داری نشان دادند. بیشترین تجزیه پذیری کند در مرحله اول سایت دو و کمترین میزان آن در مرحله سوم سایت یک مشاهده شد. در هر دو سایت همزمان با پیشرفت بلوغ گیاه بخش تجزیه پذیری کند کاهش معنی داری نشان داد ($p < 0.01$). پتانسیل تجزیه پذیری (PD) ماده خشک گون علفی در هر دو سایت با پیشرفت بلوغ گیاه، روند کاهشی معنی داری را نشان داد. بیشترین پتانسیل تجزیه پذیری در مرحله اول سایت دو و کمترین میزان آن در مرحله سوم سایت یک مشاهده گردید.

دوم و کمترین مقدار در مرحله دوم سایت یک مشاهده شد. در تمامی زمان های انکوباسیون بین مراحل رشد در هر سایت و بین دو سایت ارتفاعی تفاوت معنی دار وجود داشت ($p < 0.01$)، ولی در زمان ۲۴ ساعت انکوباسیون در مرحله سوم بین سایت یک و دو تفاوت معنی داری وجود نداشت. در جدول (۶) فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک گونه *A. crenatus* گزارش شده است. ارتفاع، مرحله رشد و اثر متقابل ارتفاع و مرحله رشد بر فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک اثر معنی دار داشتند ($p < 0.01$). بیشترین تجزیه پذیری سریع (a) ماده خشک این گونه در مرحله اول سایت دو و کمترین مقدار آن در مرحله سوم سایت یک بود. در هر دو سایت روند کاهش معنی دار در بخش تجزیه پذیر سریع ماده

جدول ۲- ترکیبات شیمیایی گونه *A. crenatus* مراتع هیر-نئور استان اردبیل در دو ارتفاع و سه مرحله رشد فنولوژیکی (درصد)

DM	OM	Ash	EE	ADF	NDF	ترکیبات شیمیایی
۹۴/۳۴ ^c ±۰/۴۸	۸۹/۹۱ ^d ±۰/۲۸	۱۰/۰۹ ^a ±۰/۲۸	۶/۴۵ ^a ±۰/۵۱	۳۳/۸۳ ^c ±۰/۲۹	۳۶/۰۳ ^c ±۱/۳۶	مرحله اول
۹۵/۱۹ ^b ±۰/۰۳	۹۰/۷۱ ^c ±۰/۳۳	۹/۲۹ ^b ±۰/۳۳	۴/۰۶ ^b ±۱/۶۱	۳۶ ^c ±۱/۴۵	۳۸/۲۴ ^c ±۰/۸۱	سایت یک مرحله دوم
۹۶/۶۱ ^a ±۰/۳۵	۹۲/۴۸ ^b ±۰/۴۰	۷/۵۲ ^c ±۰/۴۰	۴/۷۱ ^b ±۰/۳۸	۴۶/۰۵ ^b ±۱/۲۵	۵۰ ^a ±۱/۶۱	مرحله سوم متر (۱۷۰۰-۱۵۰۰)
۹۳/۰۸ ^d ±۰/۱۰	۹۰/۳۵ ^d ±۰/۲۲	۹/۶۵ ^a ±۰/۲۲	۶/۶۸ ^b ±۰/۴۶	۳۰/۵۴ ^d ±۱/۳۵	۳۲/۴۶ ^d ±۱/۶۰	مرحله اول
۹۴/۳۵ ^c ±۰/۲۲	۹۱/۱۷ ^c ±۰/۱۶	۸/۸۳ ^b ±۰/۱۶	۴/۹۲ ^b ±۰/۴۲	۳۳/۶۶ ^d ±۱/۱۴	۳۴/۶۹ ^d ±۰/۱۸	سایت دو مرحله دوم
۹۵/۶۲ ^b ±۰/۱۶	۹۳/۰۷ ^a ±۰/۱۶	۶/۹۳ ^d ±۰/۱۶	۶/۱۲ ^a ±۰/۳۴	۴۴/۷۹ ^a ±۰/۵۱	۴۹/۰۳ ^b ±۰/۷۲	مرحله سوم متر (۲۱۰۰-۱۹۰۰)
۰/۱۵	۰/۱۶	۰/۱۶	۰/۴۴	۰/۶۳	۰/۶۷	خطای استاندارد
**	**	**	*	**	**	ارتفاع
**	**	**	*	**	**	مرحله رشد
ns	ns	ns	*	ns	ns	ارتفاع×مرحله رشد

NDF: دیواره سلولی، ADF: الیاف نامحلول در شوینده اسیدی، EE: عصاره اتری، Ash: خاکستر، OM: ماده آلی، DM: ماده خشک؛ حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی دار می باشد؛ ns: غیر معنی داری؛ **: احتمال معنی داری در سطح یک درصد؛ *: احتمال معنی داری در سطح ۵ درصد.

جدول ۳- میانگین مربعات ترکیبات شیمیایی گونه *A. crenatus* مراتع هیر-نئور استان اردبیل در دو ارتفاع و سه مرحله رشد فنولوژیکی

سطح معنی داری	مقدار F	میانگین مربعات	درجه آزادی	
**	۲۳/۹۵	۳۲/۷۲	۱	ارتفاع
**	۲۹۸/۹۱	۴۰۸/۳۹	۲	مرحله رشد
ns	۲/۴۵	۳/۳۴	۲	ارتفاع × مرحله رشد
**	۱۹/۸۸	۲۳/۶۲	۱	ارتفاع
**	۲۴۷/۷۵	۲۹۴/۳۶	۲	مرحله رشد
ns	۱/۳۰	۱/۵۵	۲	ارتفاع × مرحله رشد
*	۵/۳۳	۳/۱۲	۱	ارتفاع
*	۵/۶۷	۳/۳۲	۲	مرحله رشد
*	۶/۳۳	۳/۷۰	۲	ارتفاع × مرحله رشد
**	۱۴/۹۲	۱/۱۱	۱	ارتفاع
**	۱۴۸/۴۵	۱۰/۹۹	۲	مرحله رشد
ns	-/۱۳	-/۰۱	۲	ارتفاع × مرحله رشد
**	۱۴/۹۲	۱/۱۱	۱	ارتفاع
**	۱۴۸/۴۵	۱۰/۹۹	۲	مرحله رشد
ns	-/۱۲	-/۰۱	۲	ارتفاع × مرحله رشد
**	۶۶/۴۰	۴/۷۶	۱	ارتفاع
**	۱۲۱/۱۹	۸/۶۹	۲	مرحله رشد
ns	۰/۹۴	۰/۰۷	۲	ارتفاع × مرحله رشد

NDF: دیواره سلولی، ADF: الیاف نامحلول در شوینده اسیدی، EE: عصاره اتری، Ash: خاکستر، OM: ماده آلی، DM: ماده خشک؛ ns: غیر معنی داری؛ **: احتمال معنی داری در سطح یک درصد؛ *: احتمال معنی داری در سطح ۵ درصد.

جدول ۴- تجزیه پذیری ماده خشک گونه *A. crenatus* مراتع هیر-نئور استان اردبیل در زمان های مختلف انکوباسیون (درصد)

زمان های انکوباسیون	۰	۲	۴	۸	۱۶	۲۴	۴۸	۷۲
سایت یک	۲۷/۲۰ ^b ±۰/۱۳	۴۴/۸۷ ^b ±۰/۱۶	۵۶/۹۲ ^b ±۰/۱۰	۵۹/۵۷ ^b ±۰/۲۷	۶۴/۹۲ ^b ±۰/۱۲	۷۴/۸۹ ^b ±۰/۱۵	۷۸/۸۴ ^b ±۰/۱۵	۸۰/۸۸ ^b ±۰/۱۰
مرحله اول	۲۵/۸۱ ^d ±۰/۲۳	۴۱/۷۱ ^d ±۰/۲۰	۵۴/۱۷ ^d ±۰/۰۹	۵۶/۴۸ ^e ±۰/۱۳	۶۲/۵۶ ^d ±۰/۱۳	۷۰/۵۹ ^d ±۰/۱۲	۷۵/۲۳ ^d ±۰/۱۷	۷۷/۱۹ ^d ±۰/۱۱
مرحله دوم	۱۷/۳۸ ^f ±۰/۳۷	۳۸/۵۳ ^f ±۰/۱۵	۵۰/۳۴ ^f ±۰/۲۲	۵۴/۶۵ ^f ±۰/۳۴	۶۰/۵۰ ^e ±۰/۲۳	۶۵/۱۹ ^e ±۰/۲۷	۷۰/۲۴ ^f ±۰/۲۳	۷۳/۲۳ ^f ±۰/۱۸
مرحله	۳۰/۲۱ ^g ±۰/۰۵	۴۶/۴۵ ^g ±۰/۱۳	۵۸/۳۱ ^g ±۰/۱۹	۶۱/۷۳ ^g ±۰/۱۹	۶۶/۷۶ ^g ±۰/۲۳	۷۶/۵۱ ^g ±۰/۱۷	۸۱/۲۳ ^g ±۰/۱۲	۸۳/۳۳ ^g ±۰/۱۴
سایت دو	۲۶/۶۲ ^c ±۰/۱۹	۴۳/۷۹ ^c ±۰/۱۶	۵۶/۴۹ ^c ±۰/۱۲	۵۹/۰۵ ^c ±۰/۱۳	۶۵/۰۴ ^b ±۰/۰۵	۷۳/۳۵ ^c ±۰/۱۳	۷۸/۲۵ ^c ±۰/۱۴	۸۰/۲۵ ^c ±۰/۱۳
مرحله اول	۱۹/۴۸ ^e ±۰/۲۴	۴۰/۷۳ ^e ±۰/۱۷	۵۳/۶۳ ^e ±۰/۲۳	۵۶/۷۹ ^d ±۰/۱۵	۶۲/۸۶ ^e ±۰/۱۵	۶۸/۷۶ ^e ±۰/۲۱	۷۴/۶۵ ^e ±۰/۱۷	۷۶/۷۳ ^e ±۰/۱۴
مرحله دوم	۰/۰۹	۰/۰۶	۰/۰۷	۰/۰۹	۰/۰۷	۰/۰۷	۰/۰۷	۰/۰۶
خطای استاندارد	۰/۰۹	۰/۰۶	۰/۰۷	۰/۰۹	۰/۰۷	۰/۰۷	۰/۰۷	۰/۰۶
ارتفاع	**	**	**	**	**	**	**	**
معنی داری	**	**	**	**	**	**	**	**
مرحله	**	**	**	**	**	**	**	**
ارتفاع×مرحله	**	**	**	**	**	**	**	**

حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی داری می باشد؛** احتمال معنی داری در سطح یک درصد؛* احتمال معنی داری در سطح ۵ درصد.

جدول ۵- میانگین مربعات تجزیه پذیری ماده خشک گونه *A. crenatus* مراتع هیر-نئور استان اردبیل در زمان های مختلف انکوباسیون

زمان های انکوباسیون	درجه آزادی	میانگین مربعات	مقدار F	سطح معنی داری
۰	ارتفاع	۳۴/۹۷	۶۸۱/۴۸	**
	مرحله رشد	۳۴۴/۹۷	۶۷۲۳/۰۹	**
	ارتفاع × مرحله رشد	۳/۶۸	۷۱/۷۳	**
۲	ارتفاع	۳۴/۳۸	۱۲۸۸/۶۶	**
	مرحله رشد	۱۰۰۹	۴۰۸۵/۹۳	**
	ارتفاع × مرحله رشد	۰/۳۲	۱۲/۰۲	**
۴	ارتفاع	۴۹/۱۸	۱۶۹۶/۶۸	**
	مرحله رشد	۹۶/۱۳	۳۳۱۶/۰۳	**
	ارتفاع × مرحله رشد	۲/۶۹	۹۲/۹۲	**
۸	ارتفاع	۴۷/۱۷	۱۰۱۶/۲۸	**
	مرحله رشد	۷۳/۵۰	۱۵۸۳/۴۵	**
	ارتفاع × مرحله رشد	۰/۱۸	۳/۸۲	**
۱۶	ارتفاع	۴۴/۶۷	۱۵۹۲/۵۳	**
	مرحله رشد	۵۲/۰۱	۱۸۵۴/۲۲	**
	ارتفاع × مرحله رشد	۰/۳۵	۱۲/۳۸	**
۲۴	ارتفاع	۶۳/۴۴	۱۸۸۸/۴۸	**
	مرحله رشد	۲۳/۲۱	۶۸۵۲/۶۰	**
	ارتفاع × مرحله رشد	۲/۸۷	۸۵/۵۱	**
۴۸	ارتفاع	۹۶/۲۷	۳۴۳۸/۳۸	**
	مرحله رشد	۱۷۳/۹۳	۶۲۱۲/۰۳	**
	ارتفاع × مرحله رشد	۳/۲۱	۱۱۴/۵۳	**
۷۲	ارتفاع	۸۰/۹۱	۴۴۲۴/۴۰	**
	مرحله رشد	۱۵۲/۵۷	۸۳۴۳/۰۶	**
	ارتفاع × مرحله رشد	۰/۸۳	۴۵/۶۶	**

** احتمال معنی داری در سطح یک درصد؛* احتمال معنی داری در سطح ۵ درصد.

جدول ۶- فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری ماده خشک گونه *A. crenatus* مراتع هیر-نئور استان اردبیل با استفاده از کیسه‌های نایلونی (درصد)

ED(۰/۰۸)	ED(۰/۰۵)	ED(۰/۰۲)	PD	c	b	a	فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری
۶۰/۵۸ ^b ±۰/۰۸	۶۴/۹۳ ^b ±۰/۰۴	۷۲/۳۳ ^b ±۰/۰۵	۸۰/۷۷ ^b ±۰/۱۵	۰/۰۷ ^b ±۰/۰۰۱	۳۷/۱۴ ^b ±۰/۱۶	۴۳/۶۵ ^b ±۰/۱۵	مرحله ۱ سایت یک (۱۵۰۰)
۵۷/۴۸ ^d ±۰/۰۴	۶۱/۷۰ ^d ±۰/۰۱	۶۸/۷۵ ^d ±۰/۰۸	۷۶/۸۷ ^d ±۰/۱۴	۰/۰۷ ^b ±۰/۰۰۱	۳۶/۱۹ ^c ±۰/۲۱	۴۰/۶۷ ^d ±۰/۱۷	مرحله ۲ متر (۱۷۰۰)
۵۴/۲۲ ^f ±۰/۰۸	۵۸/۲۳ ^f ±۰/۰۸	۶۴/۷۰ ^f ±۰/۱۱	۷۱/۷۳ ^f ±۰/۲۳	۰/۰۸ ^a ±۰/۰۰۴	۳۴/۷۰ ^d ±۰/۲۲	۳۷/۰۴ ^f ±۰/۳۲	مرحله ۳ سایت دو (۱۹۰۰)
۶۲/۳۳ ^a ±۰/۱۰	۶۶/۷۸ ^a ±۰/۱۲	۷۴/۳۳ ^a ±۰/۱۲	۸۳/۲۳ ^a ±۰/۰۸	۰/۰۷ ^c ±۰/۰۰۵	۳۷/۹۵ ^a ±۰/۱۹	۴۵/۲۹ ^a ±۰/۲۵	مرحله ۱ متر (۲۱۰۰)
۵۹/۹۵ ^c ±۰/۰۵	۶۴/۲۷ ^c ±۰/۰۵	۷۱/۵۵ ^c ±۰/۰۵	۷۹/۹۷ ^c ±۰/۰۸	۰/۰۷ ^b ±۰/۰۰۱	۳۷/۱۷ ^b ±۰/۲۵	۴۲/۷۹ ^c ±۰/۲۰	مرحله ۲
۵۶/۹۸ ^e ±۰/۱۲	۶۱/۲۰ ^e ±۰/۰۹	۶۸/۱۵ ^e ±۰/۰۸	۷۵/۹۸ ^e ±۰/۱۷	۰/۰۷ ^b ±۰/۰۰۱	۳۶/۱۱ ^c ±۰/۱۹	۳۹/۸۸ ^e ±۰/۳۰	مرحله ۳
۰/۰۳	۰/۰۳	۰/۰۴	۰/۰۶	۰/۰۰۱	۰/۰۸	۰/۰۹	خطای استاندارد
**	**	**	**	**	**	**	ارتفاع
**	**	**	**	**	**	**	مرحله رشد
**	**	**	**	**	**	**	ارتفاع×مرحله

a: بخش تجزیه‌پذیر سریع (b)، بخش تجزیه‌پذیر کند (c)، بخش تجزیه‌ناپذیر (PD)، پتانسیل تجزیه‌پذیری، ED(۰/۰۲): پتانسیل تجزیه‌پذیری در نرخ عبور ۲ درصد، ED(۰/۰۵): پتانسیل تجزیه‌پذیری در نرخ عبور ۵ درصد، ED(۰/۰۸): پتانسیل تجزیه‌پذیری در نرخ عبور ۸ درصد. حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی‌دار می‌باشد؛*: احتمال معنی‌داری در سطح یک درصد؛*: احتمال معنی‌داری در سطح ۵ درصد.

جدول ۷- میانگین مربعات فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری ماده خشک گونه *A. crenatus* مراتع هیر-نئور استان اردبیل با استفاده از کیسه‌های نایلونی

سطح معنی‌داری	مقدار F	میانگین مربعات	درجه آزادی	فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری
**	۷۴۵/۹۰	۴۳/۵۴	۱	ارتفاع
**	۱۸۶۳/۸۰	۱۰۸/۷۹	۲	مرحله رشد
**	۱۸/۵۳	۱/۰۸	۲	ارتفاع × مرحله رشد
**	۲۴۵/۳۳	۱۰/۱۸	۱	ارتفاع
**	۳۳۳/۸۹	۱۳/۸۵	۲	مرحله رشد
**	۶/۹۸	۰/۲۹	۲	ارتفاع × مرحله رشد
**	۲۲/۸۶	۰/۰۰۰۱	۱	ارتفاع
**	۱۷/۵۰	۰/۰۰۰۱	۲	مرحله رشد
**	۶/۷۹	۰/۰۰۰۱	۲	ارتفاع × مرحله رشد
**	۴۱۵۹/۷۲	۹۶/۳۷	۱	ارتفاع
**	۸۶۲۴/۹۳	۱۹۹/۸۱	۲	مرحله رشد
**	۱۰۵/۸۴	۲/۴۵	۲	ارتفاع × مرحله رشد
**	۹۰۲۸/۸۱	۶۹/۷۲	۱	ارتفاع
**	۱۸۳۱۸/۶	۱۴۱/۴۶	۲	مرحله رشد
**	۱۷۷/۰۹	۱/۳۷	۲	ارتفاع × مرحله رشد
**	۱۰۰۵۸	۵۴/۷۶	۱	ارتفاع
**	۲۰۷۵۷/۶	۱۱۳/۰۱	۲	مرحله رشد
**	۱۷۰/۸۲	۰/۹۳	۲	ارتفاع × مرحله رشد
**	۷۲۵۴/۵۹	۴۸/۷۷	۱	ارتفاع
**	۱۵۳۳۷/۳	۱۰۳/۱۰	۲	مرحله رشد
**	۱۲۱/۷۸	۰/۸۲	۲	ارتفاع × مرحله رشد

a: بخش تجزیه‌پذیر سریع (b)، بخش تجزیه‌پذیر کند (c)، بخش تجزیه‌ناپذیر (PD)، پتانسیل تجزیه‌پذیری، ED(۰/۰۲): پتانسیل تجزیه‌پذیری در نرخ عبور ۲ درصد، ED(۰/۰۵): پتانسیل تجزیه‌پذیری در نرخ عبور ۵ درصد، ED(۰/۰۸): پتانسیل تجزیه‌پذیری در نرخ عبور ۸ درصد. حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی‌دار می‌باشد؛*: احتمال معنی‌داری در سطح یک درصد؛*: احتمال معنی‌داری در سطح ۵ درصد.

هیچ‌کدام از فراسنجه‌ها معنی‌دار نبود. بیشترین تجزیه‌پذیری سریع و کند این گونه در سایت دو، به ترتیب در مراحل رویشی گلدهی بود. پتانسیل تجزیه‌پذیری نیز بین مراحل رشد تفاوت معنی‌دار داشت و بیشترین پتانسیل تجزیه‌پذیری مربوط به مرحله رویشی این گیاه در سایت ارتفاعی دوم بود.

جدول (۸) فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری دیواره سلولی گونه *A. crenatus* را نشان می‌دهد. اثر ارتفاع بر درصد تجزیه‌پذیری در نرخ‌های عبور معنی‌دار بود ($P < 0/01$) ولی بر سایر فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری اثر معنی‌دار مشاهده نشد. مرحله رشد بر تمام فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری بطور معنی‌داری تأثیر گذار بود ($P < 0/01$) و اثر متقابل ارتفاع و مرحله رشد بر

جدول ۸- تأثیر ارتفاع و مرحله رشد فنولوژیکی بر فراسنجه‌های تجزیه پذیری دیواره سلولی گونه *A. crenatus* مراتع هیر-نئور استان اردبیل (درصد)

فراسنجه‌های تجزیه پذیری	a	b	c	PD	ED(۰/۰۲)	ED(۰/۰۵)	ED(۰/۰۸)
سایت یک مرحله ۱	۱۸/۸۷ ^{ab} ±۱/۱۸	۲۲/۲۰ ^{ac} ±۰/۱۶	۰/۰۵۵ ^b ±۰/۰۱	۴۱/۰۵ ^b ±۱/۳۴	۳۴/۷۵ ^b ±۰/۶۴	۳۰ ^b ±۰/۴۲	۲۷/۴۰ ^b ±۰/۴۲
سایت دو مرحله ۲	۱۷/۱۱ ^d ±۱/۱۰	۲۲/۵۳ ^{ab} ±۰/۵۵	۰/۰۳۵ ^{bcd} ±۰/۰۱	۳۹/۶۰ ^d ±۰/۵۷	۳۱/۵۵ ^d ±۰/۰۷	۲۶/۵۵ ^d ±۰/۰۷	۲۴/۱۰ ^c ±۰/۱۴
سایت دو متر مرحله ۳	۱۴/۷۸ ^d ±۱/۷۳	۱۹/۸۳ ^{cc} ±۰/۹۰	۰/۰۴۵ ^{abc} ±۰/۰۱	۳۴/۶۰ ^c ±۰/۸۵	۲۸/۳۰ ^f ±۰/۳۸	۲۳/۸۵ ^e ±۰/۳۵	۲۱/۶۰ ^d ±۰/۵۷
سایت دو متر مرحله ۱	۱۹/۹۳ ^d ±۲/۲۵	۱۹/۸۳ ^{cc} ±۱/۶۵	۰/۰۴۵ ^{abc} ±۰/۰۱	۴۳/۵۵ ^d ±۰/۶۴	۳۶/۳۰ ^g ±۰/۵۷	۳۱/۰۵ ^d ±۰/۷۸	۲۸/۳۵ ^d ±۱/۱۰
سایت دو متر مرحله ۲	۱۸/۵۳ ^{abc} ±۰/۲۵	۲۱/۰۳ ^{bcd} ±۰/۷۷	۰/۰۴۰ ^{abd} ±۰/۰۰۱	۳۹/۵۵ ^b ±۰/۴۹	۳۲/۶۰ ^e ±۰/۱۴	۲۷/۹۰ ^c ±۰/۲۸	۲۵/۵۵ ^b ±۰/۳۵
سایت دو متر مرحله ۳	۱۵/۸۰ ^{bcd} ±۱/۱۲	۱۸/۸۳ ^{dc} ±۱/۲۶	۰/۰۵۵ ^a ±۰/۰۱	۳۴/۶۰ ^c ±۰/۱۴	۲۹/۵۵ ^e ±۰/۲۱	۲۵/۶۰ ^d ±۰/۰۱	۲۳/۴۰ ^c ±۰/۱۴
خطای استاندارد	۰/۹۹	۰/۷۱	۰/۰۰۵	۰/۵۴	۰/۲۷	۰/۲۹	۰/۳۹
ارتفاع	ns	ns	ns	ns	ns	**	**
مرحله رشد	*	**	*	**	**	**	**
معنی داری	ارتفاع×مرحله	ns	ns	ns	ns	ns	ns

a: بخش تجزیه پذیر سریع (%). b: بخش تجزیه پذیر کند (%). c: بخش تجزیه ناپذیر (%). PD: پتانسیل تجزیه پذیری، ED(۰/۰۲): پتانسیل تجزیه پذیری در نرخ عبور ۲ درصد، ED(۰/۰۵): پتانسیل تجزیه پذیری در نرخ عبور ۵ درصد، ED(۰/۰۸): پتانسیل تجزیه پذیری در نرخ عبور ۸ درصد. حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی دار می باشد؛ ns: غیر معنی داری؛ **: احتمال معنی داری در سطح یک درصد؛ *: احتمال معنی داری در سطح ۵ درصد.

جدول ۹- میانگین مربعات تأثیر ارتفاع و مرحله رشد فنولوژیکی بر فراسنجه‌های تجزیه پذیری دیواره سلولی گونه *A. crenatus* مراتع هیر-نئور استان اردبیل

فراسنجه‌های تجزیه پذیری	درجه آزادی	میانگین مربعات	مقدار F	سطح معنی داری
a	ارتفاع	۴/۰۶	۲/۰۳	ns
	مرحله رشد	۱۷/۱۶	۸/۶۰	*
	ارتفاع × مرحله رشد	۰/۰۵	۰/۰۲	ns
b	ارتفاع	۰/۳۹	۰/۳۹	ns
	مرحله رشد	۱۳/۴۴	۱۳/۳۲	**
	ارتفاع × مرحله رشد	۲/۴۵	۲/۴۳	ns
c	ارتفاع	۰/۰۰۰۱	۰/۲۰	ns
	مرحله رشد	۰/۰۰۰۲	۵	*
	ارتفاع × مرحله رشد	۰/۰۰۰۱	۲/۶۰	ns
PD	ارتفاع	۲	۳/۴۲	ns
	مرحله رشد	۶۰/۹۸	۱۰۴/۰۹	**
	ارتفاع × مرحله رشد	۲/۱۳	۳/۶۳	ns
ED(۰/۰۲)	ارتفاع	۴/۹۴	۳۳/۸۸	**
	مرحله رشد	۴۳/۵۷	۲۹۸/۷۹	**
	ارتفاع × مرحله رشد	۰/۰۴	۰/۳۰	ns
ED(۰/۰۵)	ارتفاع	۵/۷۴	۳۴/۶۲	**
	مرحله رشد	۳۳/۸۵	۲۰۴/۱۴	**
	ارتفاع × مرحله رشد	۰/۱۲	۰/۷۴	ns
ED(۰/۰۸)	ارتفاع	۵/۸۸	۱۹/۷۱	**
	مرحله رشد	۲۹/۰۷	۹۷/۴۳	**
	ارتفاع × مرحله رشد	۰/۱۸	۰/۶۱	ns

a: بخش تجزیه پذیر سریع (%). b: بخش تجزیه پذیر کند (%). c: بخش تجزیه ناپذیر (%). PD: پتانسیل تجزیه پذیری، ED(۰/۰۲): پتانسیل تجزیه پذیری در نرخ عبور ۲ درصد، ED(۰/۰۵): پتانسیل تجزیه پذیری در نرخ عبور ۵ درصد، ED(۰/۰۸): پتانسیل تجزیه پذیری در نرخ عبور ۸ درصد. حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی دار می باشد؛ ns: غیر معنی داری؛ **: احتمال معنی داری در سطح یک درصد؛ *: احتمال معنی داری در سطح ۵ درصد.

($p < 0.05$) بر تمامی فراسنجه‌ها در سطح یک درصد معنی دار بود. اثر متقابل ارتفاع و مرحله رویشی به جز درصد تجزیه پذیری در نرخ عبور ۲ درصد ($p < 0.05$) بر سایر فراسنجه‌ها غیر معنی دار بود.

نتایج مربوط به اثر ارتفاع و مرحله رویشی بر تجزیه پذیری دیواره سلولی منهای همی سلولز در جدول (۱۰) نشان داده شده است. اثر ارتفاع بجز بخش‌های b و c بر سایر فراسنجه‌های تجزیه پذیری معنی دار بود. تأثیر مرحله رشد به جز بخش C

جدول ۱۰- تأثیر ارتفاع و مرحله رشد فنولوژیکی بر فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری دیواره سلولی منهای همی سلولز گونه *A. crenatus* مراتع

هیر-نئور استان اردبیل (درصد)

ED(۰/۰۸)	ED(۰/۰۵)	ED(۰/۰۲)	PD	c	b	a	فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری
۲۴/۶۵ ^b ±۰/۰۷	۲۷/۱۰ ^b ±۰/۰۱	۳۲/۴۵ ^b ±۰/۳۵	۴۱/۹۰ ^b ±۰/۸۵	۰/۰۳۰ ^{bc} ±۰/۰۰۱	۲۳/۷۳ ^a ±۱/۴	۱۸/۱۹ ^a ±۰/۵۷	مرحله ۱ سایت یک
۲۱/۶۰ ^d ±۰/۱۴	۲۳/۸۵ ^d ±۰/۰۷	۲۸/۷۰ ^d ±۰/۰۱	۳۶/۹۵ ^b ±۰/۹۲	۰/۰۳۵ ^{bc} ±۰/۰۰۷	۲۱/۶۲ ^{ab} ±۰/۲۲	۱۵/۳۴ ^b ±۱/۱۵	مرحله ۲ (۱۷۰۰-۱۵۰۰)
۱۸/۳۰ ^f ±۰/۱۴	۲۰/۵۰ ^f ±۰/۱۴	۲۴/۸۵ ^f ±۰/۵۰	۳۱/۲۵ ^c ±۲/۰۵	۰/۰۴۵ ^{ab} ±۰/۰۰۷	۱۹/۹۹ ^b ±۰/۹۵	۱۱/۲۵ ^c ±۱/۱۴	مرحله ۳ متر
۲۵/۸۵ ^a ±۰/۲۱	۲۸/۱۵ ^a ±۰/۲۱	۳۳/۴۰ ^a ±۰/۰۱	۴۳/۲۵ ^a ±۰/۹۲	۰/۰۳۰ ^{bc} ±۰/۰۰۱	۲۳/۴۸ ^a ±۱/۰۸	۱۹/۷۷ ^a ±۰/۱۴	مرحله ۱ سایت دو
۲۳/۴۵ ^c ±۰/۵۰	۲۵/۸۰ ^c ±۰/۴۲	۳۱/۲۰ ^c ±۰/۱۴	۴۱/۳۵ ^b ±۰/۷۸	۰/۰۳۰ ^{bc} ±۰/۰۰۱	۲۳/۹۱ ^a ±۱/۳۴	۱۷/۴۴ ^{ab} ±۰/۵۸	مرحله ۲ (۲۱۰۰-۱۹۰۰)
۲۰/۱۵ ^e ±۰/۰۷	۲۴/۴۰ ^e ±۰/۲۸	۲۶/۶۵ ^e ±۰/۳۵	۳۲/۵۵ ^c ±۰/۳۵	۰/۰۵۰ ^b ±۰/۰۱۴	۱۹/۹۳ ^b ±۱/۲۴	۱۲/۶۱ ^c ±۱/۵۶	مرحله ۳ متر
۰/۱۷	۰/۱۷	۰/۲۱	۰/۷۸	۰/۰۰۵	۰/۷۹	۰/۶۹	خطای استاندارد
**	**	**	*	ns	ns	*	ارتفاع
**	**	**	**	*	**	**	مرحله رشد
ns	ns	*	ns	ns	ns	ns	ارتفاع×مرحله

a: بخش تجزیه‌پذیر سریع (b,c), بخش تجزیه پذیر کند (c), بخش تجزیه ناپذیر (/, PD: پتانسیل تجزیه پذیری, ED(۰/۰۲): پتانسیل تجزیه‌پذیری در نرخ عبور ۲ درصد, ED(۰/۰۵): پتانسیل تجزیه‌پذیری در نرخ عبور ۵ درصد, ED(۰/۰۸): پتانسیل تجزیه‌پذیری در نرخ عبور ۸ درصد. حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی‌دار می‌باشد; ns: غیر معنی‌داری; **: احتمال معنی‌داری در سطح یک درصد; *: احتمال معنی‌داری در سطح ۵ درصد.

جدول ۱۱- میانگین مربعات تأثیر ارتفاع و مرحله رشد فنولوژیکی بر فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری دیواره سلولی منهای همی سلولز گونه

***A. crenatus* مراتع هیر-نئور استان اردبیل**

سطح معنی‌داری	مقدار F	میانگین مربعات	درجه آزادی	فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری
*	۸/۹۳	۸/۵۰	۱	ارتفاع
**	۵۳/۴۳	۵۰/۸۷	۲	مرحله رشد
ns	۰/۱۵	۰/۱۴	۲	ارتفاع × مرحله رشد
ns	۱/۰۶	۱/۳۱	۱	ارتفاع
**	۱۱/۷۷	۱۴/۵۷	۲	مرحله رشد
ns	۱/۶۲	۲	۲	ارتفاع × مرحله رشد
ns	۰/۰۱	۰/۰۰۰۱	۱	ارتفاع
*	۷/۱۷	۰/۰۰۰۴	۲	مرحله رشد
ns	۰/۵	۰/۰۰۰۱	۲	ارتفاع × مرحله رشد
*	۱۳/۵۳	۱۶/۵۷	۱	ارتفاع
**	۹۷/۰۷	۱۱۸/۸۳	۲	مرحله رشد
ns	۲/۵۸	۳/۱۵	۲	ارتفاع × مرحله رشد
**	۱۰۷/۰۴	۹/۱۹	۱	ارتفاع
**	۶۰۵/۶۰	۵۱/۹۸	۲	مرحله رشد
*	۷/۰۲	۰/۶۰	۲	ارتفاع × مرحله رشد
**	۱۴۵/۵۲	۸	۱	ارتفاع
**	۶۹۵/۲۹	۳۸/۲۴	۲	مرحله رشد
ns	۴/۶۵	۰/۲۶	۲	ارتفاع × مرحله رشد
**	۱۴۱/۲۴	۸	۱	ارتفاع
**	۶۴۲/۵۴	۳۶/۴۱	۲	مرحله رشد
ns	۲/۴۹	۰/۱۴	۲	ارتفاع × مرحله رشد

a: بخش تجزیه‌پذیر سریع (b,c), بخش تجزیه پذیر کند (c), بخش تجزیه ناپذیر (/, PD: پتانسیل تجزیه پذیری, ED(۰/۰۲): پتانسیل تجزیه‌پذیری در نرخ عبور ۲ درصد, ED(۰/۰۵): پتانسیل تجزیه‌پذیری در نرخ عبور ۵ درصد, ED(۰/۰۸): پتانسیل تجزیه‌پذیری در نرخ عبور ۸ درصد. حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی‌دار می‌باشد; ns: غیر معنی‌داری; **: احتمال معنی‌داری در سطح یک درصد; *: احتمال معنی‌داری در سطح ۵ درصد.

($p < 0/01$)، اثر متقابل ارتفاع و مرحله رشد نیز تنها در ارتباط با درصد تجزیه‌پذیری در نرخ عبور دو درصد معنی‌دار بود ($p < 0/05$).

مطابق جدول (۱۲) ارتفاع مرتع بجز بخش تجزیه‌پذیر سریع و نرخ تجزیه‌پذیری بر سایر فراسنجه‌ها و مرحله فنولوژیکی بر تمام فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری اثر معنی‌دار داشت

جدول ۱۲- فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری ماده آلی گونه *A. crenatus* مراتع هیر-نئور استان اردبیل با استفاده از روش کیسه‌های نایلونی (درصد)

ED(۰/۰۸)	ED(۰/۰۵)	ED(۰/۰۲)	PD	c	b	a	فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری
۴۴/۶۵ ^b ±۰/۲۱	۴۸/۵۵ ^b ±۰/۰۷	۵۷/۹۵ ^b ±۰/۲۱	۷۸/۰۵ ^b ±۰/۲۱	۰/۰۲۰ ^d ±۰/۰۰۱	۴۲/۷۶ ^b ±۰/۶۰	۳۵/۲۵ ^{ab} ±۰/۸۲	مرحله یک سایت یک (۱۷۰۰-۱۵۰۰)
۴۰/۴۵ ^c ±۰/۲۱	۴۴/۷۰ ^c ±۰/۰۱	۵۳/۴۰ ^d ±۰/۰۱	۶۷/۰۵ ^d ±۰/۵۰	۰/۰۴۰ ^b ±۰/۰۰۱	۳۸/۹۹ ^d ±۰/۳۷	۲۸/۰۵ ^c ±۰/۹۰	مرحله ۲ متر
۳۴/۰۵ ^e ±۰/۶۴	۳۸/۷۰ ^c ±۰/۴۲	۴۷/۲۰ ^f ±۰/۴۲	۵۸/۰۵ ^c ±۰/۹۲	۰/۰۵۵ ^a ±۰/۰۰۷	۴۰/۳۳ ^{cd} ±۱/۱۱	۱۷/۷۵ ^d ±۱/۹۹	مرحله ۳ سایت دو
۴۶/۲۰ ^a ±۰/۷۱	۵۰/۱۵ ^d ±۰/۵۰	۵۹/۹۵ ^a ±۰/۳۵	۸۱/۹۵ ^a ±۱/۷۷	۰/۰۲۰ ^d ±۰/۰۰۱	۴۵/۲۳ ^a ±۰/۳۶	۳۶/۷۳ ^a ±۱/۳۵	مرحله ۱ سایت دو (۲۱۰۰-۱۹۰۰)
۴۳/۶۰ ^b ±۰/۸۵	۴۷/۸۰ ^b ±۰/۷۱	۵۶/۹۵ ^c ±۰/۶۴	۷۳/۴۰ ^c ±۱/۸۴	۰/۰۳۰ ^c ±۰/۰۰۱	۴۰/۸۹ ^c ±۰/۱۶	۳۲/۵۱ ^b ±۱/۹۴	مرحله ۲ متر
۳۶/۶۵ ^d ±۰/۰۷	۴۱/۶۵ ^d ±۰/۰۷	۵۱/۱۰ ^e ±۰/۱۴	۶۴/۲۵ ^d ±۰/۷۸	۰/۰۴۵ ^b ±۰/۰۰۷	۴۳/۴۹ ^b ±۰/۱۶	۲۰/۷۸ ^d ±۰/۹۵	مرحله ۳ خطای استاندارد
۰/۳۸	۰/۲۸	۰/۳۵	۰/۸۳	۰/۰۰۳	۰/۴۰	۰/۹۹	ارتفاع
**	**	**	**	*	**	*	معنی‌داری
**	**	**	**	**	**	**	مرحله رشد
ns	ns	*	ns	ns	ns	ns	ارتفاع×مرحله رشد

a: بخش تجزیه‌پذیر سریع (b)، بخش تجزیه پذیر کند (c)، بخش تجزیه ناپذیر (d)، PD: پتانسیل تجزیه پذیری، ED(۰/۰۲): پتانسیل تجزیه‌پذیری در نرخ عبور ۲ درصد، ED(۰/۰۵): ED: پتانسیل تجزیه‌پذیری در نرخ عبور ۵ درصد، ED(۰/۰۸): پتانسیل تجزیه‌پذیری در نرخ عبور ۸ درصد. حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی‌دار می‌باشد؛ ns: غیر معنی‌داری؛ **: احتمال معنی‌داری در سطح یک درصد؛ *: احتمال معنی‌داری در سطح ۵ درصد.

جدول ۱۳- میانگین مربعات فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری ماده آلی گونه *A. crenatus* مراتع هیر-نئور استان اردبیل با استفاده از روش کیسه‌های نایلونی

سطح معنی‌داری	F مقدار	میانگین مربعات	درجه آزادی	فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری
*	۱۳/۴۴	۳۶/۷۶	۱	ارتفاع
**	۱۴۵/۱۶	۲۸۹/۰۱	۲	مرحله رشد
ns	۱/۱۲	۲/۲۲	۲	ارتفاع×مرحله رشد
**	۵۹/۲۴	۱۸/۸۸	۱	ارتفاع
**	۵۱/۵۵	۱۶/۴۳	۲	مرحله رشد
ns	۱/۳۶	۰/۴۰	۲	ارتفاع×مرحله رشد
*	۸	۰/۰۰۰۱	۱	ارتفاع
**	۵۴	۰/۰۰۰۹	۲	مرحله رشد
ns	۲	۰/۰۰۰۱	۲	ارتفاع×مرحله رشد
**	۶۵/۶۴	۹۰/۲۰	۱	ارتفاع
**	۲۵۸/۶۹	۳۵۵/۴۹	۲	مرحله رشد
ns	۱/۳۷	۱/۸۹	۲	ارتفاع×مرحله رشد
**	۲۳۰/۴۶	۲۹/۷۷	۱	ارتفاع
**	۷۵۶/۶۰	۹۷/۷۳	۲	مرحله رشد
*	۷/۹۲	۱/۰۲	۲	ارتفاع×مرحله رشد
**	۱۲۵/۱۸	۱۹/۵۱	۱	ارتفاع
**	۵۵۹/۱۳	۸۷/۱۳	۲	مرحله رشد
ns	۴/۳۸	۰/۶۸	۲	ارتفاع×مرحله رشد
**	۶۱/۹۷	۱۷/۷۶	۱	ارتفاع
**	۳۶۶/۵۶	۱۰۵/۰۸	۲	مرحله رشد
ns	۲/۳۱	۰/۶۶	۲	ارتفاع×مرحله رشد

a: بخش تجزیه‌پذیر سریع (b)، بخش تجزیه پذیر کند (c)، بخش تجزیه ناپذیر (d)، PD: پتانسیل تجزیه پذیری، ED(۰/۰۲): پتانسیل تجزیه‌پذیری در نرخ عبور ۲ درصد، ED(۰/۰۵): ED: پتانسیل تجزیه‌پذیری در نرخ عبور ۵ درصد، ED(۰/۰۸): پتانسیل تجزیه‌پذیری در نرخ عبور ۸ درصد. حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی‌دار می‌باشد؛ ns: غیر معنی‌داری؛ **: احتمال معنی‌داری در سطح یک درصد؛ *: احتمال معنی‌داری در سطح ۵ درصد.

بحث و نتیجه‌گیری

همکاران (۲۰۱۰) بر روی گونه‌ی *Astragalus arpilobus* میزان دیواره سلولی در مرحله رویشی و گلدهی به ترتیب ۳۲/۶۸ و ۳۴/۸۷ درصد بدست آمد که با مقادیر دیواره سلولی *A. crenatus* در تحقیق حاضر در مرحله اول و دوم سایت دو (به ترتیب ۳۲/۴۶ و ۳۴/۶۹ درصد) مطابقت داشت. میزان خاکستر گونه در مرحله رویشی بیشترین مقدار را داشته که به

در مطالعه حاضر، میانگین دیواره سلولی منهای همی سلولز برای سه مرحله رویشی ارتفاع بالاتر در گونه‌ی *A. crenatus* ۳۶/۳۳ درصد اندازه‌گیری شد که با نتایج شریفی و همکاران (۲۰۱۰) در ارتباط با گونه *Astragalus brachyodontus* در منطقه خلخال استان اردبیل در سه مرحله رویشی (۳۶/۵ درصد) مطابقت داشت. در پژوهش جنگجو و

همچنین بیشترین مقدار تجزیه‌پذیری ماده خشک مربوط به مرحله رویشی بوده و با بلوغ گیاه کاهش معنی‌داری را نشان داد، که دلیل آن به‌بالا بودن میزان کربوهیدرات‌های محلول و پروتئین خام مربوط است، زیرا میزان این ترکیبات در مرحله اول رشد بیشتر بوده و سبب بالا بودن تجزیه‌پذیری در این مرحله از رشد می‌گردد (۱). در این مطالعه در سایت ارتفاعی دو احتمالاً به‌دلیل بلوغ دیرس گیاه نسبت به سایت یک، تجزیه‌پذیری بیشتری اندازه‌گیری شده است که با یافته‌های عشقی و همکاران (۲۰۱۳) که تجزیه‌پذیری بیشتر گونه‌های مرتعی رویش یافته در مراتع با ارتفاع بالاتر را گزارش نمودند، مطابقت دارد. در واقع بر اساس گزارش پتیت و ترملادی^۱ (۱۹۹۲) در کلیه گونه‌های گیاهی با افزایش سن گیاه، تجزیه‌پذیری ماده خشک کاهش می‌یابد. ارزانی و همکاران (۲۰۰۷)، در تحقیق بر روی کیفیت علوفه سه استان سمنان، مرکزی، و لرستان تجزیه‌پذیری ماده خشک گونه‌ی گون در استان لرستان را ۵۸/۹۴ درصد اندازه‌گیری کردند که با تجزیه‌پذیری ماده خشک گونه *A. crenatus* در مطالعه حاضر و در مرحله اول سایت دو در زمان ۴ ساعت انکوباسیون (۵۸/۳۱) مشابهت دارد.

بخش تجزیه‌پذیر سریع یا همان ماده خشک محلول در تحقیق حاضر، بین مراحل رشد و سایت‌های ارتفاعی تفاوت معنی‌دار داشته و با بلوغ گیاه کاهش نشان داده که با نتایج مهرداد و همکاران (۲۰۰۴) مطابقت دارد. میزان ماده خشک محلول تحت تأثیر ساختمان فیزیکی گیاه، میزان دیواره سلولی، دیواره سلولی منهای همی سلولز، اجزای فیبری و مواد معدنی است بطوری که هرچه اجزای فیبری بیشتر باشد میزان اجزای محلول کاهش می‌یابد. همچنین، مواد غذایی که دارای مواد معدنی بیشتری هستند به‌دلیل راحت شسته شدن و محلول بودن آن‌ها از ماده خشک محلول بیشتری برخوردار هستند. بیشترین تجزیه‌پذیری سریع ماده خشک مربوط به مرحله اول سایت دو می‌باشد که دلیل این امر می‌تواند به بخش کربوهیدرات‌های محلول و پروتئین خام مرتبط باشد که در مرحله اول رشد گیاهان بیشتر بوده و در نتیجه همانگونه که اشاره شد سایت دو که ارتفاع بیشتری داشته و در نتیجه گیاهان دارای رشد تأخیری بوده و تجزیه‌پذیری بیشتری برای گیاهان اندازه‌گیری شده است.

بخش تجزیه‌پذیر سریع یا همان ماده خشک محلول در گونه مورد مطالعه بین مراحل رشد و سایت‌های ارتفاعی

جذب بیشتر عناصر از خاک مربوط می‌شود و با پیشرفت بلوغ گیاه کاهش می‌یابد، بر همین اساس میزان ماده آلی در مراحل ابتدائی رشد گونه مورد مطالعه پایین بوده و با بلوغ گیاه افزایش نشان داد. در مطالعه جنگجو و همکاران (۲۰۱۰) بر روی گونه *Astragalus arpilobus* میزان خاکستر در سه مرحله فنولوژیکی به‌ترتیب ۹/۸۰، ۸/۶۰ و ۷/۷۵ درصد بدست آمد. خاکستر گونه *A. crenatus* نیز در سه مرحله فنولوژیکی به‌ترتیب ۱۰/۰۹، ۹/۲۹ و ۷/۵۲ درصد برای سایت یک و ۸/۸۳، ۹/۶۵ و ۶/۹۳ درصد برای سایت دو اندازه‌گیری شد که تقریباً مشابه نتایج جنگجو و همکاران (۲۰۱۰) بود. میزان چربی خام در مرحله رویشی در هر دو ارتفاع انتخاب شده بیشترین مقدار را داشت، که با یافته‌های حشمتی و همکاران (۲۰۰۶) که ارزش غذایی ۱۱ گونه مرتعی شامل انواع لگوم و گرامینه‌ها را بررسی کرده بودند، مطابقت داشت. از آنجایی که بیشترین میزان تجمع چربی در برگ‌ها می‌باشد، می‌توان دلیل بالا بودن میزان چربی در مرحله رشد رویشی را به بیشتر بودن نسبت برگ به ساقه در این مرحله از رشد نسبت داد (۳۱). به‌طورکلی، با پیشرفت مراحل رشد میزان بافت‌های نگهدارنده و استحکامی مانند اسکلرانشیم بیشتر می‌شود که این بافت‌ها عمدتاً از سلولز، همی‌سلولز و لیگنین تشکیل یافته‌اند. بنابراین، با کامل شدن رشد گیاه درصد فیبر افزایش و در مقابل پروتئین کاهش می‌یابد (۲۷).

کاهش درصد ماده خشک، خاکستر، چربی خام با پیشرفت مراحل رشد گیاه در مطالعه حاضر با یافته‌های پاشایی و همکاران (۲۰۱۲) و عشقی و همکاران (۲۰۱۳) مطابقت دارد. جهت حداکثر استفاده از مواد مغذی موجود در مواد خوراکی، میزان تجزیه‌پذیری آن‌ها در شکمبه از اهمیت زیادی برخوردار است و در این رابطه، زمان ماندن خوراک در دستگاه گوارش مورد توجه قرار می‌گیرد. در تحقیق حاضر، تجزیه‌پذیری گونه‌ی مورد مطالعه با پیشرفت زمان‌های انکوباسیون شکمبه‌ای روند افزایشی را نشان داد. تقی‌زاده و همکاران (۲۰۰۳) نیز نتایج مشابهی را در روند افزایشی تجزیه‌پذیری گزارش نمودند و دلیل آن را غلظت بالای باکتری‌های شکمبه در فواصل ۸-۱۶ ساعت انکوباسیون و رقیق شدن اولیه محیط شکمبه توسط غذا، آب و بزاق دانسته و کندتر شدن روند تجزیه بعد از ساعت ۱۶ انکوباسیون را به کاهش مواد مغذی و سرعت رشد باکتری‌ها نسبت دادند. روند تجزیه‌پذیری ماده خشک در تحقیق حاضر حاکی از آن است که عمده تجزیه‌پذیری ماده خشک در ۲۴ ساعت اول انکوباسیون اتفاق می‌افتد و پس از این مدت روند تجزیه کند می‌شود که با نتایج بدست آمده توسط پاشایی و همکاران (۲۰۱۲) و عشقی و همکاران (۲۰۱۳) مطابقت دارد.

¹ . Petit & Tremblay

شده و به بخش کربوهیدرات‌های ساختاری اضافه شده است. در نتیجه مدت زمان بیشتری برای تجزیه‌پذیری آن‌ها نیاز بوده، زیرا نفوذ باکتری‌ها برای تجزیه دچار تأخیر شده و در نتیجه گیاهان جوان میزان تجزیه‌پذیری بیشتری داشته و با بلوغ گیاه از میزان تجزیه‌پذیری آن‌ها کاسته شده است. پاشایی و همکاران (۲۰۱۲) و عشقی و همکاران (۲۰۱۳) نیز در بررسی ارزش غذایی گیاهان مرتعی طی سه مرحله فنولوژیکی (رویشی، گلدهی و بذردهی) و از دو سایت ارتفاعی مراتع اطراف اردبیل به چنین نتایجی در سطح منطقه دست پیدا کرده‌اند.

به‌طور کلی نتایج این پژوهش نشان دهنده تفاوت معنی‌دار گونه *A.crenatus* در سایت‌های ارتفاعی و مراحل رویشی از نظر فراسنجه‌های اندازه‌گیری شده است. نمونه‌های جمع‌آوری شده از سایت ارتفاعی دو تجزی‌پذیری شکمبه‌ای و قابلیت هضم بعد از شکمبه‌ای ماده خشک بیشتر و در مقابل دیواره سلولی و دیواره سلولی منهای همی‌سلولز کمتری داشتند. این امر نشان دهنده بهبود کیفیت علوفه با افزایش ارتفاع مرتع می‌باشد. علاوه بر این مرحله رشد رویشی نسبت به مراحل گلدهی و بذردهی به دلیل بالا بودن تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای و قابلیت هضم بعد از شکمبه‌ای ماده خشک و کل دستگاه گوارش از کیفیت و ارزش غذایی بالاتری برخوردار بوده و در نتیجه مناسب‌ترین مرحله‌ی چرا برای دام‌ها می‌تواند باشد.

اختلاف معنی‌دار داشته و با بلوغ گیاه کاهش نشان داده که با نتایج مهرداد و همکاران (۲۰۰۴) و پاشایی و همکاران (۲۰۱۲) همخوانی دارد. میزان ماده خشک محلول تحت تأثیر ساختمان فیزیکی گیاه، میزان دیواره سلولی، دیواره سلولی منهای همی‌سلولز، اجزای فیبری و مواد معدنی است، به‌طوری که هرچه اجزای فیبری بیشتر باشد میزان اجزای محلول کاهش می‌یابد. همچنین مواد غذایی که دارای مواد معدنی بیشتری هستند به دلیل راحت شسته شدن و محلول بودن آن‌ها از ماده خشک محلول بیشتری برخوردارند (۱۱).

سرعت تجزیه‌دیواره سلولی بستگی به زمان لازم برای اتصال باکتری به دیواره و ماهیت دیواره سلولی دارد. گونه گیاه و مرحله رشد از عوامل داخلی مؤثر بر سرعت هضم الیاف است. مقاومت دیواره سلولی در برابر تجزیه شدن به ترکیب شیمیایی آناتومی گیاه، شکل ظاهری، ضخامت دیواره سلولی، مزوفیل کمتر، دستجات آوندی بیشتر و نواحی عرضی بیشتری در بافت دیواره سلولی دارد (۱۷). نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده بیشترین بخش تجزیه‌پذیری سریع دیواره سلولی و دیواره سلولی منهای همی‌سلولز در مرحله اول رشد بوده و همچنین در سایت ارتفاعی دو این تجزیه‌پذیری بیشتر از سایت یک بود. دلیل پایین بودن تجزیه‌پذیری گونه مورد مطالعه در سایت یک نسبت به سایت دو، کمتر بودن کربوهیدرات‌های محلول و زودرس بودن بلوغ گیاه در سایت یک نسبت به سایت دو است که در نتیجه آن تجزیه‌پذیری در سایت دو بیشتر از سایت یک مشاهده شده است. درصد تجزیه‌پذیری در نرخ‌های عبور ۲، ۵ و ۸ درصد در ساعت با پیشرفت بلوغ گیاه کاهش معنی‌داری را نشان داد. دلیل این کاهش افزایش در میزان دیواره سلولی و دیواره سلولی منهای همی‌سلولز گیاهان طی روند بلوغ می‌باشد (۷). مِسْمَن^۱ و همکاران (۱۹۹۱) طی مطالعه‌ای روی تأثیر بلوغ گیاه بر فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری گیاهان گزارش کردند که تجزیه‌پذیری NDF با بلوغ گیاه دچار تغییراتی شده و کاهش معنی‌داری را نشان می‌دهد. در مطالعه حاضر نیز درصد تجزیه‌پذیری ADF در نرخ‌های عبور مختلف در هر دو سایت ارتفاعی با بلوغ گیاه کاهش معنی‌داری نشان داده است.

بر اساس نتایج مطالعه حاضر، اثر مرحله فنولوژی بر فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری ماده آلی روند کاهشی داشته، به‌طوری که بیشترین درصد تجزیه‌پذیری سریع و تجزیه‌پذیری مؤثر در گونه‌ی مورد مطالعه در مرحله رشد رویشی و کمترین میزان در مرحله بذردهی مشاهده گردید. در واقع با پیشرفت بلوغ و مرحله رشد گیاه از بخش کربوهیدرات‌های محلول کاسته

¹. Messman

References

1. Abarsaji, Gh., Gh. Shahi & M. Passandi, 2008. Forage quality of *Hedysarum coronarium* at phenological stages. Journal of Pajouhesh & Sazandegi. 78: 55-51. (In Persian)
2. Agricultural organization of Ardabil province, 2009. Agricultural organization of Ardabil province, Statistic and information office. (In Persian)
3. Arzani, H., A. Nikkhab, Z. Arzani, S.H. Kaboli & L. Fazel Dehkordi, 2007. Study of range forage quality in three Provinces of Semnan, Markazi and Lorestan for calculation of animal unit requirement. Journal of Pajouhesh & Sazandegi, 76: 60-68. (In Persian)
4. Arzani, H., J. Motamedi, M. Mofidi Chalan & J. Sharifi, 2012. Favorability of forage quality of important range species in Arshagh semi steppe rangelands. Animal Sciences journal (Pajouhesh & Sazandegi), 93: 16-25. (In Persian)
5. Association of Official Analytical Chemists, 2000. Official Methods of Analysis. 17th ed. Association of official Analytical Chemists, Gaithersburg, M, D.
6. Azizpour, M., A. Ghorbani, F. Mirzaei Aghjeh Gheshlagh, J. Seyf Davati & J. Sharifi, 2013. Study of chemical composition, gas production and metabolisable energy estimation of *Kochia prostrata* in different phenological stages in Ardebil rangelands. Rangeland Journal, 7(1):52-63. (In Persian)
7. Bruinenberg, M.H., A.H. Van Gelder, P. Gonzalez Perez, V.A. Hindle & J.W. Cone, 2004. Estimating rumen degradability of forages from semi-natural grasslands, using nylon bag and gas production techniques. Netherlands Journal of Agricultural Science, 51: 351-368.
8. Cottrill, B.R. & P.J. Evans, 1984. Estimation of Protein Degradability Interdepartmental Protein Working Party. ARC Technical Review, Farnham Royal, Berks, UK: Agricultural Research Council, Commonwealth Agricultural Bureau. Estimating rumen degradability of forages from semi-natural grasslands, using nylon bag and gas production. Netherlands Journal of Agricultural Science. 51: 351-368.
9. Eshghi, M.J., F. Mirzaei Aghjeh Gheshlagh, J. Seyf Davati & A. Ghorbani, 2013. Determination of nutritional value and degradability of dry matter and cell wall of *Agropyron tauri* at different phenological stages in Neor region (Ardabil province). Journal of Ruminant Researches, 1(1):77-94. (In Persian)
10. Ghanbari, A., & M. Sahraei, 2012. Determination of Nutritional Value in Three Forage Species in Three Phenological Stages in Sabalan Rangelands, Ardebil, Iran. Journal of Rangeland Science, 2(2): 449-457.
11. Griffin, T.S., K.A. Cassida, O.B. Hesterman & S.R. Rust, 1994. Alfalfa maturity and cultivar effects on chemical and in situ estimates of protein degradability. Crop Science, 34: 1654-1661.
12. Heshmati, Gh., M. Baghbani & O. Bazrafshan, 2006. Comparison of nutritional value of 11 rangeland plants of east of Goestan. Journal of Pajouhesh & Sazandegi, 90:73-95. (In Persian)
13. Jangu, M., F.F. Mellati, F. Noedoost & A. Bozorgmehr, 2010. Autecology of *Astragalus arpilobus* Kar. & Kir, a promised species for restoration of the winter rangelands in the northeast of Iran. Agroecology Journal, 2(4): 648-657. (In Persian)
14. Maassoumi, A.A., 2005. The genus *Astragalus* in Iran, vol. 5. Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, (In Persian)
15. Mehdizadeh, S., 2012. Determination of ruminal and post-ruminal *in vitro* digestibility of dominant *fabaceae* species in Neor region of Ardabil province. M.Sc. Thesis, Faculty of Agriculture, University of Mohaghegh Ardebili, 104 p. (In Persian)
16. Mehrdad, N., M. Alikhani & G.R. Ghorbani, 2004. Effect of cutting and growth stages on chemical composition and degradability of Alfalfa (*Medicago sativa*). Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, Water and Soil Sciences, 8(2) :159-168. (In Persian)
17. Mertenz, D.R., 1993. Rate and extent of digestion. In: Quantitative Aspects of Ruminant Digestion and Metabolism. Pp:13. CAB International, Wallingford, UK.
18. Messman, M.A., W.P. Weiss & D.O. Ericson, 1991. Effects of nitrogen fertilization and maturity of brome grass on *in situ* ruminal digestion Kinetics of fiber. Journal of Animal Science, 69: 1151-1161.
19. Mirzaei Aghjeh Gheshlagh, F., J. Seyf Davati, A. Ghorbani, S. Mehdizadeh & F. Mirzaei, 2014. Determination of chemical composition and rumen degradability of dry Matter and cell wall of *vicia canescens* at different phenological Stages in neor rangelands of Ardabil province. International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences, 4(2): 16-22.
20. Moghadam, M.R., 2012. Range Management. 7th ed, Tehran University Press, 482p. (In Persian)
21. Ørskov, E.R. & I. McDonald, 1979. The estimation of protein digestibility in the rumen from incubations measurements weighted according to rate of passage. Journal of Agricultural Science, 92: 499-503.
22. Ørskov, E.R., F.D. Deb Hovell & F. Mould, 1980. The use of the nylon bag technique for the evaluation of feedstuffs. Tropical Animal Health and Production, 5: 195-213.

23. Pashaei Ardi, Zh., F. Mirzaei Aghjeh Gheshlagh, A. Mahdavi, M.D. Shakouri & A. Ghorbani, 2012. Determination of nutritive value of Artemisia using of in vitro, gas production and nylon bag techniques. Journal of Animal Science Researches, 22(3): 37-47. (In Persian)
24. Petit, H.V & G.F. Tremblay, 1992. *In situ* degradability of fresh grass and grass conserved under different harvesting methods. Journal of Dairy Science, 75: 774-781.
25. Podlech, D., 1999. Papilionaceae III: Astragalus, In: Rechinger, K. H. (ed.), Flora Iranica 174: 1-350. Akad. Druck- U. Verlagsanst, Graz.
26. Sharifi, J., A.A. Shahmoradi & A.A. Imani, 2010. An ecological study on some characteristics of *Astragalus brachyodontus* in rangelands of Ardabil province. Iran. Journal of Range and Desert Research, 17 (2):221-232. (In Persian)
27. Stern, M.D., A. Bach & S.Calsamiglia, 2001. Alternative techniques for measuring nutrient digestion in ruminants. Journal of Animal Science, 75: 2256-2276.
28. Taghizadeh, A., M. Danesh Mesgaran, R. Valizadeh & F. Eftekhar Shahroudi, 2003. Study of ruminal digestion model of dry matter and crud protein of ingredients using Nylon bag technic. Agricultural Science Magazine, 13(1): 101-113. (In Persian)
29. Talebian Masoudi, A & H. Mirdavoodi, 2013. Determination of nutritional and preference values of four halophyte range species in Mighan playa of Arak, Iran. Rangeland Journal, 7(3): 230-237.(In Persian)
30. Van Soest, P.J., J. B. Robertson & B.A. Lewis, 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74: 3583-3597.
31. Varmaghani, S., 2007. Determination of chemical composition and gross energy of range plant of Ilam province. Journal of Pajouhesh & Sazandegi, 74:79-85. (In Persian)