



Modelling Above ground net primary production of Sabalan rangelands using vegetation indices and non-linear regression

Samaneh Mohammadi Moghaddam¹, Ardavan Ghorbani*², Hossein Arzani³, Javanshir Azizi Mobaser⁴, Raoof Mostafazadeh⁵

1. PhD. Student in Range Management, Department of Range and Watershed Management, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2. Corresponding author; Prof., Department of Range and Watershed Management, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
E-mail: a_ghorbani@uma.ac.ir
3. Prof., Department of Arid and Mountains Regions Reclamation, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
4. Associate Prof., Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
5. Associate Prof., Department of Range and Watershed Management, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

Article Info

Article type:
Research Full Paper

Article history:

Received: 02.22.2019
Revised: 02.06.2019
Accepted: 26.07.2019

Keywords:

Rangeland foliage,
production,
Remote sensing data,
NDVI,
PVI3,
RVI,
SAVI

Abstract

Background and objectives: Alongside with the progress in satellite sensors, their role on obtaining information and study of the environmental events and phenomena have become increasingly important. One of these precious data which is the basis for many planning and decision making in rangelands, is the above ground net primary production assessments. The traditional method of estimating ANPP is clipping and weighing. The high cost, time consumption and difficulty in clipping are the limitations of the traditional method, which makes it extremely difficult and expensive to estimate the ANPP of large areas. Thus, the aim of this study was to estimate above ground net primary production (ANPP) using vegetation indices.

Methodology: Sampling of vegetation was performed in rangelands of Sabalan elevations in Ardabil province in altitude ranges from 1500 to 3300 meters in 2016. Nine sites were selected in study area and in each site three 100 m transects were placed with 50 m interval. Along each transect 5 plots (1 square meter) with 20 m from each other was placed and in each plot, total production and life forms including shrubs, grasses and forbs ANPP were measured. The initial net production samples were placed in an oven at 70 ° C for 24 hours and then weighed to determine their dry weight. Furthermore, vegetation indices including NDVI, PVI3, RVI and SAVI were calculated using data of Landsat 8 Operational Land Imager (OLI) images for 2015. Due to the fact that the maximum growth of vegetation in the region is in June, the images were also selected at the same time. Then using general additive model in software R, curve of relationship between ANPP and vegetation was analyzed in two way Individual and Combined data. Finally, ANPP was modeled using non-linear regression.

Results: The application of generalized additive models for each of the vegetation indices with total ANPP and life forms separately shows that NDVI, PVI3 and RVI have a nonlinear relationship with total ANPP and life forms. However, the SAVI index has a linear relationship with the ANPP of total and grasses. Also, all vegetation indices have a significant relationship with ANPP. The ranking of vegetation indices affecting the ANPP based on the coefficient of determination shows that the most important and least important plant indices are SAVI and PVI3

for shrubs, and PVI3 and SAVI for grasses, forbs and total ANPP. In the present study, contrary to expectations, NDVI vegetation index, which has many applications in the vegetation studies and its increase indicates the presence of more vegetation in the region, in the generalized additive model and the combined study of vegetation index and ANPP show a nonsignificant relationship. Results showed that nonlinear regression significantly increased the accuracy of ANPP estimation using vegetation indices. The coefficient of determination for total ANPP (0.80) is more than shrubs (0.74), grasses (0.75), and forbs (0.56) and among the life forms, forbs have the lowest coefficient of determination.

Conclusion: Based on the results, suitable vegetation index for estimate the ANPP of life forms are different. Also, ANPP estimation using vegetative indices at the total level is more accurate than life forms. According to the results, the OLI image and the use of nonlinear regression models were able to adequately estimate the ANPP in the study area. Therefore, if similar results are obtained in other areas of Ardabil, it will be possible to generalize the results and estimate this important ecological indicator with less time and cost. This tool can also be used to provide information on the amount of forage production and thus determine the stocking rate, as well as the degree of pasture degradation.

Cite this article: Mohammadi Moghaddam, S., A. Ghorbani, H. Arzani, J. Azizi Mobaser, R. Mostafazadeh, 2022. Modelling Above ground net primary production of Sabalan rangelands using vegetation index and non-linear regression. Journal of Rangeland, 16(1): 33-51.



© The Author(s).

Publisher: Iranian Society for Range Management

DOR: 20.1001.1.20080891.1401.16.1.1.3

مرتع

مدل سازی تولید خالص اولیه سطح زمین مراتع سبلان با استفاده از شاخص‌های گیاهی و رگرسیون غیرخطی

سمانه محمدی مقدم^۱, اردوان قربانی^{۲*}, حسین ارزانی^۳, جوانشیر عزیزی مبصر^۴ و رئوف مصطفی‌زاده^۵

۱. دانشجوی دکتری علوم مرتع، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
۲. نویسنده مسئول، استاد گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. رایان نامه: a_ghorbani@uma.ac.ir
۳. استاد گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
۴. دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
۵. دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

اطلاعات مقاله	چکیده
نوع مقاله: مقاله کامل - پژوهشی	سابقه و هدف: امروزه با پیشرفت سنجنده‌های ماهواره‌ای، نقش آن‌ها در کسب اطلاعات و بررسی عوارض و پدیده‌های زمین اهمیتی روز افزون یافته است. یکی از این اطلاعات ارزشمند که مبنای بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها را در مراتع تشکیل می‌دهد تولید خالص اولیه سطح زمین است. روش سنتی برآورد تولید، استفاده از اندازه‌گیری زمینی است. هزینه بالا، زمان بر و طاقت‌فرسا بودن جمع‌آوری داده‌های زمینی از محدودیت‌های روش سنتی می‌باشد و این روش را برای برآورد تولید مناطق با وسعت بالا فوق‌العاده مشکل و پرهزینه می‌نماید. از این‌رو هدف این تحقیق مدل‌سازی تولید خالص اولیه سطح زمین با استفاده از شاخص‌های گیاهی است.
تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ تاریخ ویرایش: ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۰۵/۰۴	مواد و روش‌ها: نمونه‌برداری از پوشش گیاهی در مراتع ارتفاعات سبلان در استان اردبیل و محدوده ارتفاعی ۱۵۰۰ تا ۳۳۰۰ متر در سال ۱۳۹۵ انجام گرفت. در مجموع ۹ سایت در منطقه انتخاب و در هر سایت ۳ ترانسکت ۱۰۰ متری با فاصله ۵۰ متر از یکدیگر قرار گرفت. در امتداد هر ترانسکت ۵ پلات ۱ متر مربعی با فاصله ۲۰ متر از یکدیگر مستقر و در هر پلات تولید خالص اولیه به تفکیک فرم رویشی شامل بوته‌ها، گندمیان و پهن‌برگان علفی برداشت شد. نمونه‌های تولید خالص اولیه سطح زمین به مدت ۲۴ ساعت در آن و در دمای ۷ درجه سلسیوس قرار داده شد و سپس به‌منظور تعیین وزن خشک آن‌ها، توزین شدند. هم‌چنین شاخص‌های گیاهی شامل NDVI، RVI، PVI3 و SAVI با استفاده از تصاویر ماهواره لندست ۸، سنجنده OLI مربوط به سال ۱۳۹۴ محاسبه شد. با توجه به اینکه حداقل رشد گیاهان در منطقه در ماه خرداد است، تصاویر برای ماه خرداد انتخاب شدند. سپس با استفاده از مدل جمعی تعمیم‌یافته در نرم افزار R، رابطه تولید خالص اولیه کل و فرم‌های رویشی با شاخص‌های گیاهی به صورت انفرادی و ترکیبی به دست آمد. در نهایت تولید خالص اولیه سطح زمین با استفاده از روش رگرسیون غیرخطی مدل‌سازی شد.
واژه‌های کلیدی: تولید مراتع، داده ماهواره‌ای، NDVI RVI PVI3 SAVI	نتایج: به کارگیری مدل‌های جمعی تعمیم‌یافته برای هر یک از شاخص‌های گیاهی و تولید خالص اولیه کل و فرم رویشی به صورت انفرادی نشان می‌دهد که شاخص‌های گیاهی NDVI و PVI3 و RVI دارای رابطه غیرخطی با تولید کل و فرم‌های رویشی هستند. اما شاخص SAVI با تولید خالص اولیه سطح زمین کل و گندمیان دارای

رابطه خطی است. همچنین همه شاخص‌های گیاهی دارای رابطه معنی‌دار با تولید خالص اولیه هستند. رتبه‌بندی شاخص‌های گیاهی اثرگذار بر تولید خالص اولیه براساس ضریب تبیین نشان می‌دهد که با اهمیت‌ترین و کم اهمیت‌ترین شاخص گیاهی به ترتیب برای بوته SAVI و PVI3، گندمیان، پهنه‌برگان علفی و کل PVI3 و SAVI هستند. در تحقیق حاضر برخلاف انتظار شاخص پوشش گیاهی، که در زمینه مطالعات پوشش گیاهی کاربردهای فراوانی دارد و افزایش مقادیر آن بیانگر وجود پوشش گیاهی بیشتر در منطقه است، در مدل جمعی تعمیم‌یافته و بررسی توامان رابطه شاخص‌های گیاهی و ANPP رابطه معنی‌داری را نشان نداد. نتایج مدل‌سازی نشان داد که رگرسیون غیرخطی بهطور قابل توجهی باعث افزایش صحت برآورد ANPP با استفاده از شاخص‌های گیاهی شده است. میزان ضریب تبیین برای تولید کل (۰/۰۸۰) بیشتر از بوته‌ها (۰/۷۴)، گندمیان (۰/۷۵)، پهنه‌برگان علفی (۰/۵۶) است و از میان فرم‌های رویشی پهنه‌برگان علفی کمترین مقدار ضریب تبیین را دارد.

نتیجه‌گیری: براساس نتایج شاخص گیاهی مناسب بهمنظور برآورد تولید فرم‌های رویشی مختلف متفاوت است. همچنین برآورد ANPP با استفاده از شاخص‌های گیاهی در سطح کل دقیق‌تر از فرم‌های رویشی است. با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق، تصویر OLI و استفاده از مدل‌های رگرسیونی غیرخطی توانستند به مقدار مناسبی ANPP را در منطقه پژوهش برآورد کنند. از این‌رو در صورت کسب نتایج مشابه در دیگر مناطق اردبیل، امکان تعمیم نتایج و زمینه برآورد این شاخص اکولوژیکی مهم با صرف زمان و هزینه کمتر فراهم خواهد شد. همچنین از این ابزار می‌توان جهت تأمین اطلاعات از میزان تولید علوفه و در نتیجه تعیین ظرفیت و میزان دام و همچنین میزان تخریب مرتع، استفاده کرد.

استناد: محمدی مقدم، س.، ا. فربانی، ح. ارزانی، ج. عزیزی میصر، ر. مصطفی‌زاده، ۱۴۰۱. مدل‌سازی تولید خالص اولیه سطح زمین مراعع سیلان با استفاده از شاخص‌های گیاهی و رگرسیون غیرخطی، مرتع، ۱۶(۱): ۳۳-۵۱.



DOR: 20.1001.1.20080891.1401.16.1.1.3

© نویسنده‌گان

ناشر: انجمن علمی مرتعداری ایران

مقدمه

بارندگی و مقدار تولید بوده است (۱۴). بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه مدل‌سازی ANPP نشان می‌دهد که مدل‌های برآورده ANPP را می‌توان در پنج گروه شامل مدل‌های زمینی، اقلیمی، سنجش از دوری، انرژی و فرآیندی قرار داد. با توجه به چالش‌های موجود در استفاده از مدل‌های فیزیکی موجود بهمنظور برآورده تولید خالص اولیه در مقیاس اکوسیستم و یا منطقه‌ای، محققان به این نتیجه رسیدند که مدل‌های حاصل از داده‌های سنجش از دور ممکن است برآورده دقیق‌تر و صحیح‌تری از این پارامتر داشته باشند که سال‌ها به عنوان یک رودی مهم در مدل‌سازی ANPP استفاده شده‌اند (۴). اگر چه حاصل از اندازه‌گیری میدانی دقیق‌تر است، اما این روش یک روش عملی برای سطوح گسترشده نیست. داده‌های سنجش از دور در مقیاس‌های مختلف، از محلی تا جهانی و از سیستم عامل‌های مختلف مانند آیکونوس، کوئیکبرد، اسپات، سنتینل، لندست و مودیس که قدرت تفکیک مکانی آن‌ها از کمتر از یک متر تا صدها متر متفاوت است، در دسترس هستند. هم‌چنین انواع مختلفی از داده‌ها مانند نوری، رادار و LiDAR وجود دارد که هر یک از آن‌ها دارای مزایای خاصی نسبت به دیگری است (۲۰). سنجش از دور به دلیل پوشش جهانی، تکرار داشتن و کاهش هزینه‌ها احتمالاً بهترین جایگزین برای برآورده ANPP از طریق نمونه‌برداری میدانی است.

مطالعات متعددی رگرسیون‌های خطی را برای پیش‌بینی ANPP یا پارامترهای بیولوژیکی مشابه استفاده کرده‌اند و در سایر مطالعات برای تعریف رابطه شاخص‌های گیاهی و ANPP از مدل‌های غیرخطی استفاده کرده‌اند که نتایج مشابه و حتی بهتر از روش‌های خطی داشته‌اند. فریمن و همکاران (۲۰۰۷) چندین مدل خطی و غیرخطی بر مبنای ساختار NDVI و ارتفاع گیاه بهمنظور پیش‌بینی بیومس و علوفه ارائه نمودند. زو و همکاران (۲۰۰۸) شش مدل حاصل از توابع خطی، توانی، نمایی، درجه دوم، درجه سوم و لگاریتمی را برای پیش‌بینی تولید گندمیان با استفاده از NDVI برای شش منطقه در چین مورد استفاده قرار دادند. نتایج آن‌ها نشان داد که براساس حداقل خطای باقیمانده،تابع غیرخطی نمایی با صحت بیش‌تری تولید گندمیان را برآورده کرد. رایگانی و همکاران (۲۰۱۵) در تحقیق خود بیان

تولید خالص اولیه سطح زمین (ANPP= Above ground net primary production) مراتع یک مولفه مهم از چرخه کربن جهانی است (۲۲). تولید خالص اولیه، ماده خشک تولید شده توسط قسمت سبز گیاه در واحد سطح و زمان است (۱۸). این متغیر اطلاعاتی درباره دریافت کربن توسط گیاه را ارائه می‌دهد. هم‌چنین متغیری کلیدی برای پایش فعالیت‌های اکولوژیکی و شاخصی حساس به تغییرات محیطی و اقلیمی است (۱۰). پایش ANPP در مناطق خشک و نیمه‌خشک که یک سوم از سطح زمین را می‌پوشاند و به طور ویژه‌ای تحت تأثیر تغییرات محیطی است، بسیار اهمیت دارد (۹). تعیین مقدار و پایش ANPP امکان شناخت فرآیند تخریب مرتع و اتخاذ راهکار برای احیاء آن را فراهم می‌نماید (۱). ANPP از جنبه اقتصادی دارای اهمیت است و در برنامه‌های مدیریتی، افزایش ANPP جزو اهداف اصلی مرتعداران است. به علاوه، این پارامتر به عنوان یک شاخص اکولوژیکی در تعیین غالبية گونه‌ها، میزان انرژی ذخیره شده در گیاه و پتانسیل تولیدی یک رویشگاه کاربرد دارد. هم‌چنین به عنوان شاخص مدیریتی در تعیین ظرفیت مرتع، وضعیت مرتع و تعداد دام و حیات وحش استفاده کننده از مرتع نقش دارد (۵). بنابراین درک الگوهای زمانی و مکانی ANPP و برآورده آن یک پیش شرط برای مدیریت سیستم‌های چرایی است. اما مشکلی که وجود دارد این است که تخمین پارامترهای بیوفیزیکی گیاهان از جمله میزان تولید خالص اولیه به روش‌های سنتی در قالب نمونه‌برداری‌های محدود یا توزین نهایی وزن محصول علاوه بر صرف وقت، نیروی انسانی و هزینه زیاد، بسیار مشکل و طاقت فرساست. از این‌رو در طی چند دهه گذشته، برآورده غیرمستقیم و مدل‌سازی تولید خالص اولیه روی زمین موضوع اصلی بسیاری از مطالعات مرتعی بوده است.


در طول دهه‌های گذشته روش‌های متعددی برای برآورده تولید علوفه، NPP سطح و زیرزمین، تولید ناخالص اولیه سطح و زیرزمین و محصول سرپا توسعه یافته‌اند (۸). اولین مدل‌سازی‌ها در زمینه برآورده ANPP به اواسط قرن ۱۹ برمی‌گردد که شامل رابطه رگرسیونی خطی ساده بین

مواد و روش‌ها

منطقه مورد مطالعه در شهرستان مشگین شهر استان اردبیل و در مرتفع‌ترین مراتع کوهستانی در شمال غرب ایران (ارتفاع قله سبلان ۴۸۱۱ متر از سطح دریا است) (شکل ۱) قرار دارد. تمام ۹ محل نمونه‌برداری در بخش شمالی سبلان در طول جغرافیایی $47^{\circ} 47' 05''$ تا $48^{\circ} 01' 10''$ شمالی و عرض جغرافیایی $38^{\circ} 29' 00''$ شرقی قرار دارد (جدول ۱). این مراتع، به‌طور سنتی و بیش از ظرفیت مراتع توسط دام‌های ایل شاهسون و مردم روستایی (۱۵) مورد استفاده قرار می‌گیرند و به‌دلیل اهمیت جغرافیایی، زیست محیطی و اقتصادی آن به عنوان منطقه مطالعه مورد انتخاب شده است. تابستان‌های معتدل، خشک و سرد و زمستان‌های برفی، ویژگی اصلی اقلیمی این منطقه است. میانگین بارندگی سالانه آن ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلی‌متر است که از مناطق کوهستانی به دشت‌های منطقه کاهش می‌یابد. در این مناطق در هر 350 متر افزایش ارتفاع، دما 1 درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد. هم‌چنین در هر 300 متر افزایش ارتفاع، میانگین بارش سالانه حدود 100 میلی‌متر افزایش می‌یابد. با توجه به قرار گرفتن در معرض جریان‌های سرد و مرتضوب سیبری، اقلیم هیرکانی و مدیترانه‌ای، عناصر پوشش گیاهی این منطقه متعلق به مناطق اروپای-سیبری و ایران-تورانی و از نوع پوشش گیاهی استپی هستند (۲۹).

کردند که رابطه خطی پوشش گیاهی و شاخص گیاهی، در صد پوشش گیاهی تنها با باند مادون قرمز نزدیک آن هم در سطح 5 در صد رابطه معنی‌داری نشان می‌دهد. در حالی که در غیرخطی، تمامی باندها با در صد پوشش گیاهی رابطه معنی‌داری در سطح یک در صد نشان خواهد داد. هم‌چنین مشاهده گردید با تعییر در نوع مدل رگرسیونی چندمتغیره خطی مورد استفاده و تبدیل آن به یک مدل رگرسیونی چندمتغیره غیرخطی، می‌توان ضریب تبیین و ضریب همبستگی میان برآوردهای حاصله و اندازه‌گیری‌های میدانی در صد پوشش گیاهی را به‌طور محسوسی افزایش داد، به گونه‌ای که در تحقیق ایشان در بهترین حالت ضریب همبستگی 0.91 و ضریب تبیین 0.84 میان برآوردهای پوشش گیاهی و مقادیر اندازه‌گیری شده آن بدست آمد.

بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه مدل‌سازی تولید خالص اولیه با استفاده از شاخص‌های گیاهی در ایران نشان می‌دهد که در غالب این مطالعات از رگرسیون خطی استفاده شده است. در حالی که رابطه تولید و شاخص‌های گیاهی ممکن است به صورت غیرخطی باشد. از این‌رو در تحقیق حاضر امکان افزایش دقت و صحت مدل‌سازی ANPP با استفاده از شاخص‌های گیاهی از طریق مدل جمعی تعمیم‌یافته و رگرسیون غیرخطی بررسی شد.



شکل ۱: موقعیت منطقه مورد مطالعه در کشور ایران و استان اردبیل

مدل سازی تولید خالص اولیه سطح زمین مراتع سبلان با استفاده از شاخص‌های گیاهی ... / محمدی و همکاران

جدول ۱: خصوصیات فیزیکی و اطلاعات پوشش گیاهی مرتع در هر مکان نمونهبرداری

شabil	Shirafken	Shirwan دره‌سی	جوچوری	لغ	بورت دیپگلو	مس درمه‌سی	پشتہ	چناق بالغ	مکان	خصوصیات	
										طول و عرض جغرافیایی	
۴۰۵ ^۰ / _{۲۵} ۳۸۰ ^۰ / _{۲۵} ۱۸۰ ^۰ / _{۴۴}	۴۷۰ ^۰ / _{۴۱} ۴۰۰ ^۰ / _{۴۰} ۳۰۰ ^۰ / _{۴۳}	۴۷۰ ^۰ / _{۴۹} ۴۰۰ ^۰ / _{۴۰} ۲۰۰ ^۰ / _{۴۳}	۴۷۰ ^۰ / _{۲۱} ۴۰۰ ^۰ / _{۲۱} ۲۰۰ ^۰ / _{۲۱}	۴۷۰ ^۰ / _{۲۱} ۴۰۰ ^۰ / _{۲۱} ۲۰۰ ^۰ / _{۲۱}	۴۷۰ ^۰ / _{۲۱} ۴۰۰ ^۰ / _{۲۱} ۲۰۰ ^۰ / _{۲۱}	۴۷۰ ^۰ / _{۲۱} ۴۰۰ ^۰ / _{۲۱} ۲۰۰ ^۰ / _{۲۱}	۴۷۰ ^۰ / _{۲۱} ۴۰۰ ^۰ / _{۲۱} ۲۰۰ ^۰ / _{۲۱}	۴۷۰ ^۰ / _{۲۱} ۴۰۰ ^۰ / _{۲۱} ۲۰۰ ^۰ / _{۲۱}	۴۷۰ ^۰ / _{۲۱} ۴۰۰ ^۰ / _{۲۱} ۲۰۰ ^۰ / _{۲۱}	۴۷۰ ^۰ / _{۲۱} ۴۰۰ ^۰ / _{۲۱} ۲۰۰ ^۰ / _{۲۱}	۴۷۰ ^۰ / _{۲۱} ۴۰۰ ^۰ / _{۲۱} ۲۰۰ ^۰ / _{۲۱}
۳۱۵۰	۲۷۵۴	۲۶۸۶	۲۵۸۶	۲۳۱۱	۱۹۹۵	۱۹۹۹	۱۷۰۶	۱۷۸۰	ارتفاع متوسط (m)	جهت غالب (٪)	شیب (٪)
شمالی	شمال شرق	شمال	شمال	شمال غربی	شمال شرق	شمال	شمال	شمال	شمال	شمال	شمال
۱۹	۳۳	۴۰	۳۹	۳۷	۲۰	۳۴	۲۰	۱۴	۱۷۸۰	۱۷۰۶	۱۷۰۵
۴	۵	۵	۶	۷	۸	۸	۹	۹	۱۷۰۵	۱۷۰۴	۱۷۰۴
۴۴۵	۳۹۴	۴۱۲	۳۷۸	۳۶۱	۳۲۸	۳۰۶	۳۱۵	۲۷۶	۲۷۶	۲۷۶	۲۷۶
۱/۵۷	۱/۹۳	۴/۲۵	۱/۷۵	۰/۱۴	۱۳/۷۴	۸/۴۷	۳۰/۷۴	۱۹/۰۵	۱۹/۰۵	۱۹/۰۵	۱۹/۰۵
۲۹/۵۶	۷/۳۰	۴/۶۴	۲۰/۰۳	۲۱/۴۲	۸/۰۱	۵/۰۵	۰	۱۶/۱۴	۱۶/۱۴	۱۶/۱۴	۱۶/۱۴
۶/۱۰	۱۱/۹۳	۱۳/۹۳	۱۳/۰۹	۱۰/۰۹	۶/۰۷	۲۶/۸۹	۰/۷	۴/۹۰	۴/۹۰	۴/۹۰	۴/۹۰
۶۲/۲۴	۷۸/۴۳	۷۶/۴۷	۶۳/۹۹	۶۰/۷۴	۷۱/۳۶	۵۹/۴۶	۶۸/۳۳	۶۰/۴۴	۶۰/۴۴	۶۰/۴۴	۶۰/۴۴
Festuca ovina-Allopecurus vaginans	Lolium rigidum-Festuca ovina-Tri folium medium	Festuca ovina-Tri folium medium	Festuca ovina-Astragalus aureus	Astragalus aureus-Festuca ovina	Bromus tectorum	Astragalus microcephalus-Bromus arvensis-Thymus kotschyani	Taeniatherium caput medusae-Medicago sativa	Astragalus microcephalus-Taeniatherium canut medusae		تیپ غالب	

مجموع ۱۳۵ پلات نمونهبرداری شد) براساس مطالعات گذشته در محدوده منطقه مورد مطالعه با نوع و الگوی پوشش گیاهی مشابه تعیین شد (۱۶). در هر پلات، تولید خالص اولیه سطح زمین به تفکیک فرم رویشی (بوتلهای گندمیان و پهن برگان علفی) و به روش قطع و توزین برداشت شد. در مورد گندمیان و پهن برگان علفی، گیاه از ۲ سانتی‌متر بالای سطح خاک و بوتهای رشد سال جاری قطع شد. نمونه‌های پوشش گیاهی به مدت ۲۴ ساعت در آون و در دمای ۷۰ درجه سلسیوس قرار داده شد و سپس به منظور تعیین وزن خشک آن‌ها، توزین شدند (۱۷).

اندازه‌گیری میدانی

نمونهبرداری در خرداد ۱۳۹۵ در زمان حداقل رشد پوشش گیاهی و در ۹ مکان انجام شد. میانگین بارندگی در این سال براساس ایستگاه‌های سینوپتیک موجود در منطقه مورد مطالعه ۳۵۸/۹ میلی‌متر است. به طور کلی در هر مکان نمونهبرداری سه ترانسکت ۱۰۰ متری به صورت موازی و عمود بر شیب غالب منطقه (تصادفی – سیستماتیک طبقه‌بندی شده) و به فاصله ۵۰ متر از یکدیگر و در امتداد هر ترانسکت با فاصله ۲۰ متر از یکدیگر، ۵ پلات یک مترمربعی قرار گرفت. مکان پلات‌ها و ارتفاع آن‌ها با استفاده از GPS ثبت شدند (جدول ۲). اندازه و تعداد پلات‌ها (در

جدول ۲: اطلاعات مربوط به طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع (متر) پلات‌های نمونه‌برداری

پشتۀ پرتو دی‌پگلو		شیروان دره سی						
ارتفاع	عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	ارتفاع	عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	ارتفاع	عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی
۱۶۹۲	۳۸° ۲۶' ۱۶"	۴۷° ۴۹' ۱۰"	۲۰۰۵	۳۸° ۲۵' ۶/۴"	۴۷° ۴۹' ۹/۳"	۲۶۷۳	۳۸° ۲۰' ۲۱/۶"	۴۷° ۵۰' ۵۱/۶"
۱۶۹۴	۳۸° ۲۶' ۱۵/۹"	۴۷° ۴۹' ۱۰/۹"	۲۰۰۴	۳۸° ۲۵' ۶۳"	۴۷° ۴۹' ۱۰/۱"	۲۶۷۳	۳۸° ۲۰' ۲۱/۷"	۴۷° ۵۰' ۵۰/۹"
۱۶۹۴	۳۸° ۲۶' ۱۵/۹"	۴۷° ۴۹' ۱۱/۷"	۲۰۰۴	۳۸° ۲۵' ۶/۲"	۴۷° ۴۹' ۱۰/۹"	۲۶۷۳	۳۸° ۲۰' ۲۱/۶"	۴۷° ۵۰' ۴۹/۹"
۱۶۹۶	۳۸° ۲۶' ۱۵/۸"	۴۷° ۴۹' ۱۲/۰"	۲۰۰۳	۳۸° ۲۵' ۶"	۴۷° ۴۹' ۱۱/۷"	۲۶۷۰	۳۸° ۲۰' ۲۲/۲"	۴۷° ۵۰' ۴۹/۲"
۱۶۹۹	۳۸° ۲۶' ۱۵/۷"	۴۷° ۴۹' ۱۲۷"	۲۰۰۱	۳۸° ۲۵' ۶"	۴۷° ۴۹' ۱۲/۵"	۲۶۷۰	۳۸° ۲۰' ۲۲۲/۲"	۴۷° ۵۰' ۴۸/۴"
۱۷۰۵	۳۸° ۲۶' ۱۴/۱"	۴۷° ۴۹' ۱۴"	۱۹۹۹	۳۸° ۲۵' ۸"	۴۷° ۴۹' ۹/۳"	۲۶۸۶	۳۸° ۲۰' ۲۰/۸"	۴۷° ۵۰' ۴۷/۴"
۱۷۰۶	۳۸° ۲۶' ۱۴/۱"	۴۷° ۴۹' ۱۳/۰"	۲۰۰۰	۳۸° ۲۵' ۸"	۴۷° ۴۹' ۹/۷"	۲۶۸۶	۳۸° ۲۰' ۲۰/۸"	۴۷° ۵۰' ۴۷/۸"
۱۷۰۶	۳۸° ۲۶' ۱۳/۸"	۴۷° ۴۹' ۱۳/۰"	۱۹۹۷	۳۸° ۲۵' ۸/۱"	۴۷° ۴۹' ۱۰/۵"	۲۶۸۵	۳۸° ۲۰' ۲۰/۷"	۴۷° ۵۰' ۴۸/۶"
۱۷۰۵	۳۸° ۲۶' ۱۴/۲"	۴۷° ۴۹' ۱۲/۰"	۱۹۹۴	۳۸° ۲۵' ۸"	۴۷° ۴۹' ۱۱/۳"	۲۶۸۶	۳۸° ۲۰' ۲۰/۵"	۴۷° ۵۰' ۴۹/۴"
۱۷۰۸	۳۸° ۲۶' ۱۴/۲"	۴۷° ۴۹' ۱۱/۶"	۱۹۹۰	۳۸° ۲۵' ۸/۱"	۴۷° ۴۹' ۱۲/۱"	۲۶۸۶	۳۸° ۲۰' ۲۰/۶"	۴۷° ۵۰' ۴۰/۲"
۱۷۱۲	۳۸° ۲۶' ۱۲/۸"	۴۷° ۴۹' ۹/۷"	۱۹۹۶	۳۸° ۲۵' ۹/۷"	۴۷° ۴۹' ۹/۳"	۲۷۰۴	۳۸° ۲۰' ۱۶"	۴۷° ۵۰' ۵۱/۱"
۱۷۱۵	۳۸° ۲۶' ۱۲/۲"	۴۷° ۴۹' ۱۰/۴"	۱۹۹۴	۳۸° ۲۵' ۹/۹"	۴۷° ۴۹' ۱۰/۲"	۲۷۰۴	۳۸° ۲۰' ۱۹/۲"	۴۷° ۵۰' ۵۰/۳"
۱۷۱۸	۳۸° ۲۶' ۱۲/۲"	۴۷° ۴۹' ۱۱/۳"	۱۹۹۰	۳۸° ۲۵' ۹/۸"	۴۷° ۴۹' ۱۰/۰"	۲۷۰۱	۳۸° ۲۰' ۱۹/۳"	۴۷° ۵۰' ۴۹/۴"
۱۷۲۰	۳۸° ۲۶' ۱۲	۴۷° ۴۹' ۱۱/۹"	۱۹۸۵	۳۸° ۲۵' ۹/۹"	۴۷° ۴۹' ۱۱/۶"	۲۷۰۰	۳۸° ۲۰' ۱۹/۳"	۴۷° ۵۰' ۴۸/۷"
۱۷۲۲	۳۸° ۲۶' ۱۱/۸"	۴۷° ۴۹' ۱۲/۷"	۱۹۷۷	۳۸° ۲۵' ۱۰/۱"	۴۷° ۴۹' ۱۲/۹"	۲۶۹۸	۳۸° ۲۰' ۱۹/۴"	۴۷° ۵۰' ۴۷/۸"
چنگ بلاغ		لغ		شیروان		شیروان		
۱۷۷۹	۰۳۸ ۲۷' ۱۷/۷"	۴۷° ۵۶' ۳۰/۷"	۲۲۹۴	۳۸° ۲۲' ۵۷/۶"	۴۷° ۴۹' ۳۱/۱"	۲۷۷۷	۰۳۸ ۲۲' ۴۳/۸"	۴۷° ۴۹' ۱۶/۸"
۱۷۸۰	۰۳۸ ۲۷' ۱۷/۲"	۴۷° ۵۶' ۳۱/۶"	۲۲۹۴	۳۸° ۲۲' ۵۲/۲"	۴۷° ۴۹' ۳۱"	۲۷۷۶	۳۸° ۲۲' ۴۳/۴"	۴۷° ۴۹' ۱۷/۴"
۱۷۸۰	۳۸° ۲۷' ۱۷/۱"	۴۷° ۵۶' ۳۲/۶"	۲۲۹۴	۳۸° ۲۲' ۵۱/۸"	۴۷° ۴۹' ۳۰/۳"	۲۷۷۵	۳۸° ۲۲' ۴۲/۹"	۴۷° ۴۹' ۱۸"
۱۷۸۰	۳۸° ۲۷' ۱۷/۱"	۴۷° ۵۶' ۳۳/۲"	۲۲۹۴	۳۸° ۲۲' ۵۱/۳"	۴۷° ۴۹' ۲۹/۸"	۲۷۷۵	۳۸° ۲۲' ۴۲/۶"	۴۷° ۴۹' ۱۸/۵"
۱۷۸۲	۳۸° ۲۷' ۱۷/۱"	۴۷° ۵۶' ۳۴"	۲۲۹۳	۳۸° ۲۲' ۵۰/۹"	۴۷° ۴۹' ۲۹/۲"	۲۷۷۳	۳۸° ۲۲' ۴۲"	۴۷° ۴۹' ۱۹/۲"
۱۷۹۰	۳۸° ۲۷' ۱۵/۵"	۴۷° ۵۶' ۳۴/۸"	۲۲۱۲	۳۸° ۲۲' ۴۹/۶"	۴۷° ۴۹' ۲۰/۲"	۲۷۶۷	۳۸° ۲۲' ۴۲"	۴۷° ۴۹' ۲۱/۱"
۱۷۸۹	۳۸° ۲۷' ۱۵/۶"	۴۷° ۵۶' ۳۴/۴"	۲۲۱۲	۳۸° ۲۲' ۴۹/۸"	۴۷° ۴۹' ۲۰/۵"	۲۷۶۸	۳۸° ۲۲' ۴۲/۵"	۴۷° ۴۹' ۲۰/۲"
۱۷۸۹	۳۸° ۲۷' ۱۵/۵"	۴۷° ۵۶' ۳۲/۵"	۲۲۱۱	۳۸° ۲۲' ۵۰/۲"	۴۷° ۴۹' ۳۱"	۲۷۷۰	۳۸° ۲۲' ۴۳"	۴۷° ۴۹' ۲۰/۳"
۱۷۸۷	۳۸° ۲۷' ۱۵/۵"	۴۷° ۵۶' ۳۲/۷"	۲۲۱۰	۳۸° ۲۲' ۵۰/۷"	۴۷° ۴۹' ۳۱/۱"	۲۷۷۱	۳۸° ۲۲' ۴۳/۵"	۴۷° ۴۹' ۱۹/۸"
۱۷۸۷	۳۸° ۲۷' ۱۵/۴"	۴۷° ۵۶' ۳۱/۹"	۲۲۱۱	۳۸° ۲۲' ۵۱/۱"	۴۷° ۴۹' ۲۲/۳"	۲۷۷۰	۳۸° ۲۲' ۴۳/۹"	۴۷° ۴۹' ۱۹/۳"
۱۷۹۳	۳۸° ۲۷' ۱۳/۹"	۴۷° ۵۶' ۳۱/۰"	۲۲۲۲	۳۸° ۲۲' ۵۰/۲"	۴۷° ۴۹' ۲۳/۸"	۲۷۱۵	۳۸° ۲۲' ۴۶/۷"	۴۷° ۴۹' ۱۸/۹"
۱۷۹۳	۳۸° ۲۷' ۱۴"	۴۷° ۵۶' ۳۲/۷"	۲۲۲۹	۳۸° ۲۲' ۵۰"	۴۷° ۴۹' ۳۳"	۲۷۱۶	۳۸° ۲۲' ۴۵/۱"	۴۷° ۴۹' ۱۹/۴"
۱۷۹۳	۳۸° ۲۷' ۱۴/۱"	۴۷° ۵۶' ۳۲/۳"	۲۲۳۰	۳۸° ۲۲' ۴۹/۴"	۴۷° ۴۹' ۲۲/۵"	۲۷۱۶	۳۸° ۲۲' ۴۵/۸"	۴۷° ۴۹' ۱۹/۲"
۱۷۹۴	۳۸° ۲۷' ۱۴/۲"	۴۷° ۵۶' ۳۲/۹"	۲۲۳۳	۳۸° ۲۲' ۴۹"	۴۷° ۴۹' ۲۲/۱"	۲۷۱۸	۳۸° ۲۲' ۴۵/۵"	۴۷° ۴۹' ۲۰/۵"
۱۷۹۵	۳۸° ۲۷' ۱۴/۳"	۴۷° ۵۶' ۳۴/۶"	۲۲۳۲	۳۸° ۲۲' ۴۸/۵"	۴۷° ۴۹' ۳۱/۶"	۲۷۱۹	۳۸° ۲۲' ۴۵/۱"	۴۷° ۴۹' ۲۱/۳"
مس دره سی		جوی چو خوری		شابلل		شابلل		
۱۹۷۹	۴۷° ۵۵' ۵۵/۰"	۳۸° ۲۰' ۴۱/۶"	۲۵۷۴	۳۸° ۲۱' ۴۷/۲"	۴۷° ۴۹' ۱۳/۳"	۳۱۲۶	۳۸° ۱۸' ۴۴/۶"	۴۷° ۵۰' ۲۵/۶"
۱۹۸۰	۴۷° ۵۵' ۵۶/۴"	۳۸° ۲۰' ۴۱/۶"	۲۵۷۲	۳۸° ۲۱' ۴۵/۴"	۴۷° ۴۹' ۱۴"	۳۱۲۰	۳۸° ۱۸' ۴۴/۴"	۴۷° ۵۰' ۲۵"
۱۹۷۹	۴۷° ۵۵' ۵۷/۱"	۳۸° ۲۰' ۴۱/۶"	۲۵۷۱	۳۸° ۲۱' ۴۷/۷"	۴۷° ۴۹' ۱۴/۸"	۳۱۲۱	۳۸° ۱۸' ۴۴/۲"	۴۷° ۵۰' ۲۴/۱"
۱۹۸۲	۴۷° ۵۵' ۵۷/۹"	۳۸° ۲۰' ۴۱/۰"	۲۵۶۹	۳۸° ۲۱' ۴۷/۹"	۴۷° ۴۹' ۱۵/۰"	۳۱۲۱	۳۸° ۱۸' ۴۴"	۴۷° ۵۰' ۲۳/۲"
۱۹۸۲	۴۷° ۵۵' ۵۸/۷"	۳۸° ۲۰' ۴۱/۰"	۲۵۶۷	۳۸° ۲۱' ۴۸/۷"	۴۷° ۴۹' ۱۶/۳"	۳۱۲۳	۳۸° ۱۸' ۴۳/۷"	۴۷° ۵۰' ۲۲/۷"
۲۰۰۰	۴۷° ۵۵' ۵۹/۱"	۳۸° ۲۰' ۴۹/۸"	۲۵۸۳	۳۸° ۲۱' ۴۶/۹"	۴۷° ۴۹' ۱۷/۵"	۳۱۴۰	۳۸° ۱۸' ۴۱/۹"	۴۷° ۵۰' ۲۱"
۱۹۹۸	۴۷° ۵۵' ۵۸/۶"	۳۸° ۲۰' ۴۹/۸"	۲۵۸۵	۳۸° ۲۱' ۴۹/۸"	۴۷° ۴۹' ۱۷/۱"	۳۱۴۴	۳۸° ۱۸' ۴۱/۹"	۴۷° ۵۰' ۲۱/۱"
۱۹۹۷	۴۷° ۵۵' ۵۷/۹"	۳۸° ۲۰' ۴۹/۹"	۲۵۸۵	۳۸° ۲۱' ۴۶/۵"	۴۷° ۴۹' ۱۶/۴"	۳۱۴۶	۳۸° ۱۸' ۴۲"	۴۷° ۵۰' ۲۲/۵"
۱۹۹۶	۴۷° ۵۵' ۵۷/۱"	۳۸° ۲۰' ۴۹/۴"	۲۵۸۷	۳۸° ۲۱' ۴۶/۲"	۴۷° ۴۹' ۱۵/۵"	۳۱۴۷	۳۸° ۱۸' ۴۲"	۴۷° ۵۰' ۲۲/۴"
۱۹۹۶	۴۷° ۵۵' ۵۶/۴"	۳۸° ۲۰' ۴۹/۱"	۲۵۸۸	۳۸° ۲۱' ۴۶/۱"	۴۷° ۴۹' ۱۴/۸"	۳۱۴۶	۳۸° ۱۸' ۴۲"	۴۷° ۵۰' ۲۲/۴"
۲۰۲۰	۴۷° ۵۵' ۵۶/۲"	۳۸° ۲۰' ۴۸/۱"	۲۶۰۵	۳۸° ۲۱' ۴۴/۱"	۴۷° ۴۹' ۱۴/۶"	۳۱۷۲	۳۸° ۱۸' ۴۰/۵"	۴۷° ۵۰' ۲۵/۱"
۲۰۲۲	۴۷° ۵۵' ۵۷/۱"	۳۸° ۲۰' ۴۸/۳"	۲۶۰۷	۳۸° ۲۱' ۴۴/۷"	۴۷° ۴۹' ۱۵/۴"	۳۱۷۲	۳۸° ۱۸' ۴۰/۳"	۴۷° ۵۰' ۲۴/۲"
۲۰۲۰	۴۷° ۵۵' ۵۷/۹"	۳۸° ۲۰' ۴۸/۲"	۲۶۰۳	۳۸° ۲۱' ۴۵"	۴۷° ۴۹' ۱۶/۲"	۳۱۷۵	۳۸° ۱۸' ۴۰/۲"	۴۷° ۵۰' ۲۲/۳"
۲۰۱۹	۴۷° ۵۵' ۵۸/۷"	۳۸° ۲۰' ۴۸/۳"	۲۶۰۰	۳۸° ۲۱' ۴۵/۳"	۴۷° ۴۹' ۱۶/۸"	۳۱۷۵	۳۸° ۱۸' ۴۰/۲"	۴۷° ۵۰' ۲۲/۴"
۲۰۱۸	۴۷° ۵۵' ۵۹/۵"	۳۸° ۲۰' ۴۸/۲"	۲۵۹۹	۳۸° ۲۱' ۴۵/۶"	۴۷° ۴۹' ۱۷/۸"	۳۱۷۷	۳۸° ۱۸' ۴۹/۹"	۴۷° ۵۰' ۲۱/۸"

با توجه به تأثیربازیگری کم شاخص NDVI از خصوصیات منطقه و سهولت در اجرا در مطالعات پوشش گیاهی کاربرد زیادی دارد. این شاخص به عنوان یکی از پرکاربردترین شاخص‌های پوشش گیاهی می‌تواند مناطقی را که دارای پوشش انبوه‌تری هستند، بهتر تفکیک کند. شاخص SAVI اثرهای خاک زمینه و رطوبت خاک موجود در شاخص NDVI را کاهش می‌دهد و مناسب مناطقی است که پوشش تنک و کم است. در شاخص PVI ضرایب خط خاک به کار رفته شده اثرات منفی خاک زمینه را به خوبی حذف کرده، در آن تفکیک پوشش گیاهی با صحت بالایی صورت می‌گیرد.

تجزیه و تحلیل داده‌ها

در ابتدا با استفاده از مدل جمعی تعمیم‌یافته وجود رابطه غیرخطی بین ANPP و برخی شاخص‌های گیاهی بررسی و سپس از توابع غیرخطی موجود بهمنظور مدل‌سازی تولید خالص اولیه استفاده شد.

مدل جمعی تعمیم‌یافته

مدل جمعی تعمیم‌یافته یک مدل ناپارامتری بوده و بسط مدل‌های خطی تعمیم‌یافته می‌باشد، اما برخلاف مدل خطی تعمیم‌یافته که در آن رابطه بین متغیرهای تبیینی و پاسخ بهوسیله رابطه ارائه می‌شود، داده‌ها شکل منحنی پاسخ را تعیین می‌کنند، از این‌رو این مدل‌ها به جای مدل محوری، داده محورند. یعنی نتایج پارامترهای به دست آمده از مدل پیشین استنباط نمی‌شود. در مدل جمعی تعمیم‌یافته فرض بر این است که متغیر پاسخ Y دارای توزیعی از خانواده نمایی می‌باشد که از طریق تابع پیوند (g) به متغیرهای پیشگو (X) متصل می‌شود. مدل‌های جمعی تعمیم‌یافته به صورت زیر بیان می‌شود:

$$g(\mu) = \alpha \sum_{j=1}^p f_j(x_j)$$

که در آن μ ها توابعی نامعلوم و هموار و x متغیرهای پیش‌بینی کننده هستند. به طور خاص μ از روی داده‌ها و با استفاده از روش‌های بهبود برآش و هموارسازی، نمودار پراکنش برآورد می‌شود. وجود هموارسازها در مدل‌های جمعی تعمیم‌یافته سبب توانایی این مدل در تجزیه و تحلیل داده‌های اکولوژیکی و مشخص کردن رابطه غیرخطی بین متغیرهای مختلف دارند (۲). محاسبات مربوط به این بخش

پیش‌پردازش تصاویر

سنجدنده OLI لنdest ۸ با طول موج طیفی باریک باعث بهبود ویژگی‌های کالیبراسیون، هندسه دقیق، افزایش نسبت سیگنال به نویز و بهبود قدرت تفکیک رادیومتریک از ۸ بیت به ۱۲ بیت و در نتیجه توصیف بهتر پوشش زمین شده است (۲۰). با توجه به الگوی فنولوژیکی گیاهان یکساله و چندساله، زمان چرای دام (هم‌زمان با حداکثر رشد گیاهان) و هم‌چنین عدم پوشش نوار و ابر، تصاویر سنجدنده OLI لنdest ۸ با وضوح مکانی ۳۰ متر برای تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ (مسیر ۱۶۷، ردیف ۳۳) برای مطالعه انتخاب شد. میانگین بارندگی در این سال براساس ایستگاه‌های سینوپتیک موجود در منطقه مورد مطالعه $347/3$ میلی‌متر است. تولید خالص اولیه در طی برداشت میدانی در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ اندازه‌گیری شد. تصاویر ماهواره‌ای با استفاده از ۱۶ نقطه کنترل زمینی (GPS) و WGS 84 UTM و RGI و ERDAS ATCOR اتمسفری با استفاده از بسط IMAGINE 2015 انجام شد.

شاخص‌های گیاهی

هدف از ایجاد شاخص‌های پوشش گیاهی آن است که برخی ویژگی‌های پوشش گیاهی نظیر خصوصیات تاج پوشش، بیومس، سطح برگ یا درصد پوشش گیاهی پیش‌بینی و ارزیابی شود. به طور کلی شاخص‌های پوشش گیاهی به دو دسته شاخص‌های نسبتی مانند RVI، NDVI، MSAVI، SAVI، TVI و شاخص‌های فاصله‌ای مانند PVI، WDVI، TSAVI مختلف پوشش گیاهی، خطوط با شیب‌های مختلف را می‌سازند. در یک شاخص نسبی، با افزایش مقدار پوشش گیاهی خطوط به باند مادون قرمز نزدیک، تمایل پیدا می‌کنند. در حالی که در شاخص‌های فاصله‌ای پیکسل‌ها با پوشش گیاهی بیشتر از خط خاک فاصله می‌گیرند. در Normalized (NDVI)، (difference vegetation index) و (soil-vegetation index) (RVI)، (TVI)، (MSAVI)، (SAVI) از شاخص‌های نسبتی و Perpendicular (PVI3) و (additive vegetation index) (WDVI) از شاخص‌های فاصله‌ای انتخاب شدند.

لگاریتمی که خود شامل چندین تابع یک و چند پارامتری می‌شوند استفاده شد. معادلات مربوط به این تابع در جدول (۳) ارائه شده است. محاسبات مربوط به این بخش در نرمافزار SigmaPlot12 انجام شد.

ارزیابی مدل
صحت پیش‌بینی مدل‌ها از طریق معیارهای ارزیابی خطای شامل ریشه میانگین مربعات خطای (RMSE)، میانگین مطلق خطای نسبی (MARE)، میانگین انحراف خطای (MBE)، و ضریب تبیین (R^2) صورت گرفت (۱۲).

با استفاده از نرم‌افزار آماری R3.5.1 و الحاقیه mgcv انجام شد.

رگرسیون غیرخطی

مدل‌های رگرسیونی، یک رابطه خطی یا غیرخطی از یک متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل ایجاد می‌کنند. به وسیله یک رابطه رگرسیونی می‌توان با معلوم بودن مقادیر متغیرهای مستقل، مقدار متغیر وابسته را تخمین زد. در این تحقیق از توابع آستانه (Peak)، گویا (Rational)، چندگانه (Polynomial)، موجی شکل (Waveform)، سیگموئیدی (Sigmoidal) و

جدول ۳: توابع غیرخطی مورد استفاده بهمنظور بررسی رابطه تولید خالص اولیه و شاخص‌های گیاهی

معادله تابع	نوع تابع
$y = y_0 + a \exp(-0.5(\frac{x-x_0}{b})^2)$	آستانه گوسی چهار پارامتری
$y = (a+bx)/(1+cx)$	گویا سه پارامتری نوع دو
$y = y_0 + a \sin(\frac{2\pi x}{b}) + c$	موجی شکل چهار پارامتری
$y = y_0 + ax + bx^2 + cx^3$	چندگانه درجه سوم
$y = a/(1+\exp(-\frac{x-x_0}{b}))$	سیگموئیدی سه پارامتری
$y = y_0 + a \ln(\text{abs}(x))$	لگاریتمی دو پارامتری نوع یک

رابطه خطی است (شکل‌های ۲ و ۳). همچنین همه شاخص‌های گیاهی دارای رابطه معنی‌دار با تولید خالص اولیه هستند (جدول ۵). رتبه‌بندی شاخص‌های گیاهی اثرگذار بر تولید خالص اولیه براساس ضریب تبیین نشان می‌دهد که با اهمیت‌ترین و کم اهمیت‌ترین شاخص گیاهی بهتر ترتیب برای بوته SAVI و PVI3، گندمیان، پهنه‌برگان علفی و کل PVI3 و SAVI هستند.

نتایج
نتایج مرتبط با مقدار تولید هر یک از فرم‌های رویشی در جدول (۴) ارائه شده است. به کارگیری مدل‌های جمعی تعمیم‌یافته برای هر یک از شاخص‌های گیاهی و تولید خالص اولیه کل و فرم رویشی به صورت انفرادی نشان می‌دهد که شاخص‌های گیاهی NDVI و PVI3 دارای رابطه غیرخطی با تولید کل و فرم‌های رویشی هستند.اما شاخص SAVI با تولید خالص اولیه کل و گندمیان دارای


جدول ۴: مقدار تولید فرم‌های رویشی در محل‌های نمونه‌برداری

مکان نمونه‌برداری	پهن‌برگ علفی	گندمیان	بوته‌ها
چنانچه بلاغ	۵۹۹	۵۹۱	۷۷۱
پشتہ	۴۳۴	۱۲۸۳	.
مس دره‌سی	۴۸۶	۴۲۸	۴۸۳
بورت دیگلو	۳۹۸	۸۲۷	۶۴۴
لغ	۳۵۵	۸۱۶	۸۳۵
جوی‌چوخوری	۴۴۴	۱۴۵۵	۴۴۶
شیروان دره‌سی	۴۰۸	۱۰۱۱	۵۳۸
شیراونکن	۶۱۱	۱۹۰۱	۴۱۸
شابل	۲۳۸	۱۰۲۹	۵۶



مدل سازی تولید خالص اولیه سطح زمین مراتع سبلان با استفاده از شاخص‌های گیاهی ... / محمدی و همکاران

جدول ۵: نتایج برآذش مدل جمعی تعمیم‌بافتہ نسبت به هر یک از شاخص‌های گیاهی به صورت انفرادی


فرم رویشی	شاخص گیاهی	درجه آزادی مدل	p-value	درصد انحراف توجیه شده	ضریب تبیین تعديل شده	نده
بوته	NDVI	۵/۳۶	.۰/۰۰	۲۵/۰۰	.۰/۲۲	
	RVI	۶/۱۹	.۰/۰۰	۲۶/۰۳	.۰/۲۳	
	SAVI	۷/۶۹	.۰/۰۰	۲۹/۰۰	.۰/۲۵	
	PVI3	۷/۰۸	.۰/۰۰	۱۵/۹۰	.۰/۱۴	
گندمیان	NDVI	۸/۲۷	.۰/۰۰	۴۰/۰۰	.۰/۳۷	
	RVI	۷/۷۹	.۰/۰۰	۳۹/۰۳	.۰/۳۶	
	SAVI	۷/۴۲	.۰/۰۰	۲۴/۹۰	.۰/۲۱	
	PVI3	۶/۸۳	.۰/۰۰	۴۲/۰۰	.۰/۴۰	
پهنه بزرگان علفی	NDVI	۶/۲۹	.۰/۰۰	۲۴/۰۰	.۰/۲۰	
	RVI	۷/۵۸	.۰/۰۰	۲۶/۴۰	.۰/۲۳	
	SAVI	۶/۸۷	.۰/۰۰	۲۱/۴۰	.۰/۱۷	
	PVI3	۷/۲۴	.۰/۰۰	۲۸/۴۰	.۰/۲۵	
تولید خالص اولیه کل	NDVI	۸/۳۱	.۰/۰۰	۳۶/۵۰	.۰/۳۳	
	RVI	۷/۷۸	.۰/۰۰	۳۶/۴۰	.۰/۳۶	
	SAVI	۷/۱۳	.۰/۰۰	۲۱/۰۰	.۰/۱۶	
	PVI3	۶/۲۷	.۰/۰۰	۴۲/۰۰	.۰/۴۰	



شکل ۲: رابطه تولید خالص اولیه بوته‌ها و گندمیان با شاخص‌های گیاهی مورد بررسی به صورت انفرادی. محور افقی مقادیر شاخص‌های پوشش گیاهی و محور عمودی تأثیر تابع هموارساز بر روی مقادیر میانگین متغیر پاسخ (تولید خالص اولیه سطح زمین) را نشان می‌دهد. نقاط و خط سیاه رنگ به ترتیب نشان دهنده پلات‌های نمونه‌برداری و مقادیر تولید خالص اولیه ثبت شده است. محدوده خاکستری رنگ اطراف خط سیاه نشان دهنده فاصله اطمینان ۹۵ درصد اطراف مقادیر پیش‌بینی شده است.




شکل ۳: رابطه تولید خالص اولیه پهنه برگان علفی و کل با شاخص‌های گیاهی مورد بررسی به صورت انفرادی



ادامه شکل ۳

انفرادی رابطه معنی داری با تولید خالص اولیه دارند در حالی که به صورت توأمان با سایر شاخص های گیاهی تاثیر آن ها معنی دار نیست. براساس جدول (۶) و مقدار ضریب تبیین و معنی داری، برای مدل سازی بوته ها از شاخص SAVI و برای گندمیان، پهن برگان علفی و کل از شاخص PVI3 استفاده شد. نتایج نشان داد که با استفاده از شاخص های گیاهی و رگرسیون خطی امکان برآورد تولید خالص اولیه وجود دارد.

به منظور انتخاب مناسب ترین شاخص گیاهی برای مدل سازی تولید خالص اولیه، رابطه شاخص ها و تولید خالص اولیه به صورت جمعی نیز بررسی شد. نمودارهای حاصل از مدل جمعی تعمیم یافته برای متغیرهای تعیین شده به صورت انفرادی و ترکیبی نشان می دهد که اختلاف قابل توجهی در شکل منحنی پاسخ وجود دارد. همچنان در خصوص معنی داری تعدادی از متغیرهای تعیین شده نیز تفاوت هایی وجود دارد و برخی شاخص های گیاهی به صورت



شکل ۴: منحنی پاسخ تولید خالص اولیه کل و فرم‌های رویشی به شاخص‌های گیاهی مورد بررسی به صورت توامان. محور افقی مقادیر شاخص‌های پوشش گیاهی و محور عمودی تأثیر تابع هموارساز بر روی مقادیر میانگین متغیر پاسخ (تولید خالص اولیه سطح زمین) را نشان می‌دهد. نقاط و خط سیاه رنگ به ترتیب نشان دهنده پلات‌های نمونه‌برداری و مقادیر تولید خالص اولیه ثبت شده است. محدوده خاکستری رنگ اطراف خط سیاه نشان دهنده فاصله اطمینان ۹۵ درصد اطراف مقادیر پیش بینی شده است.

جدول ۶: نتایج برآش مدل جمعی تعیین‌یافته با شاخص‌های گیاهی مورد بررسی به صورت توامان

PVI3	SAVI	RVI	NDVI	فرم رویشی
۱	.۵/۹۴	۱	۱	درجه آزادی مدل p-value
.۷/۱	.۰/۰۵	.۰/۷۲	.۰/۷۸	
.۴/۰۵	۱	۱	.۴/۸۴	درجه آزادی مدل p-value
.۰/۰۰	.۰/۸۹	.۰/۸۱	.۰/۰۹	
.۵/۹۰	.۴/۱۴	۱	۱	درجه آزادی مدل p-value
.۰/۰۳	.۰/۲۱	.۰/۸۲	.۰/۹۰	
.۴/۹۳	۱	.۳/۶۳	۱	درجه آزادی مدل p-value
.۰/۰۰	.۰/۷۵	.۰/۲۶	.۰/۷۱	

مدل‌سازی تولید خالص اولیه سطح زمین مراتع سبلان با استفاده از شاخص‌های گیاهی ... / محمدی و همکاران

(جدول ۷). برای مثال مقدار R^2 برای بوته‌ها از ۰/۲۴ به ۰/۷۴ افزایش یافته است. میزان ضریب تبیین برای تولید کل بیشتر از فرم‌های رویشی است و از میان فرم‌های رویشی پهنه‌برگان علفی کمترین مقدار ضریب تبیین را دارند.

در این تحقیق برای نرمال کردن داده‌های تولید از لگاریتم استفاده شد و رابطه رگرسیونی بین لگاریتم ANPP و شاخص گیاهی برقرار شد. نتایج مدل‌سازی نشان داد که رگرسیون غیرخطی به طور قابل توجهی باعث افزایش صحت برآورد ANPP با استفاده از شاخص‌های گیاهی شده است

جدول ۷: مدل‌های برآورد تولید خالص اولیه کل و فرم‌های رویشی با استفاده از شاخص‌های گیاهی معنی‌دار در آزمون مدل جمعی

تعیین‌یافته

مدل	نوع رابطه	ضریب تبیین	p-value	RMSE	MBE	MARE
$Y_{\text{shrubs}} = -15.2470 + 528.1210 * \text{SAVI} - 1693.6917 * \text{SAVI}^2 + 1763.9068 * \text{SAVI}^3$	غیر خطی	۰/۷۴	۰/۰۵	۲۹۷/۹۷	۲۲/۶۱	۱/۱
$Y_{\text{shrubs}} = 0.381 + 5.042 \text{SAVI}$	خطی	۰/۲۴	۰/۱۷	۳۱۴/۷۵	۱۳۶/۸۹	۱/۵۳
$Y_{\text{grasses}} = 2.5328 + 0.6749 * \sin\left(\frac{6.238 * \text{PVB}}{0.1975}\right) + 2.6326$	غیر خطی	۰/۷۵	۰/۰۵	۳۷۴/۲۸	۷۹/۴۰	۰/۳۹
$Y_{\text{grasses}} = 3.030 + 0.908 \text{PVB}$	خطی	۰/۰۱	۰/۰۶	۶۴۲/۱۶	۲۶۹/۴۳	۱/۳۰
$Y_{\text{forbs}} = \frac{2.7298 + (7.6448 * \text{PVB})}{1 + (2.7603 * \text{PVB})}$	غیر خطی	۰/۵۶	۰/۰۵	۱۳۱/۶۲	۱۹/۴۹	۰/۲۴
$Y_{\text{forbs}} = 2.166 - 1.738 \text{PVB}$	خطی	۰/۲۵	۰/۱۶	۱۸۹/۲۷	۳۹/۷۱	۰/۳۵
$Y_{\text{total}} = 3.3159 - 2.2856 * \exp\left(-5 * \left(\frac{\text{PVB} + .3005}{0.0116}\right)^2\right)$	غیر خطی	۰/۸۰	۰/۰۳	۵۰۴/۳۸	۷۰/۴۰	۰/۲۲
$Y_{\text{total}} = 3.273 + 0.452 \text{PVB}$	خطی	۰/۰۰	۰/۰۸	۸۵۰/۹۸	۲۴۹/۸۱	۰/۶۵

٪: متغیر پاسخ یا همان مقدار تولید خالص اولیه سطح زمین برای فرم‌های رویشی بوته (shrubs)، گندیمان (grasses)، پهنه‌برگان علفی (forbs) و کل (total). PVI3 و SAVI

پوشش گیاهی در مناطقی که دارای پوشش انبوه‌تری (مناطقی که پوشش گیاهی بیش از ۶۰ درصد باشد و تشخیص طیف‌های خاک امکان پذیر نخواهد بود) هستند، پاسخ بهتری ارائه می‌کند (۱۵). بورک و بلنک (۲۰۰۱) در بررسی رابطه شاخص سطح برگ و شاخص‌های گیاهی و پرده و همکاران (۲۰۱۷) در بررسی فیتوسوس گیاهی و شاخص‌های گیاهی نتایجی مشابه با این تحقیق را بدست آورده و دریافتند که توانایی پیش‌بینی سایر شاخص‌های گیاهی بیشتر از NDVI در برآورد ویژگی‌های پوشش گیاهی است.

شاخص‌های خط خاک استفاده شده در این تحقیق NDVI و PVI3 و SAVI در مقایسه با شاخص‌های RVI و همبستگی بیشتری در زمینه تولید خالص اولیه از خود نشان دادند. زیرا شاخص‌های که بر مبنای شیب هستند بهشت تاثیر متفاوت‌های روشنایی در زمینه تاج پوشش گیاهی قرار دارند و شناسایی میان پوشش گیاهی و تغییراتی که به‌سبب خاک بر روی آن‌ها اعمال می‌گردد، توسط این

بحث و نتیجه‌گیری

با توجه به اینکه دسترسی به اکثر مناطق کوهستانی مانند سبلان به دلایل فیزیکی و امنیتی دشوار است، سنجش از راه دور اغلب تنها راه تحقیق بخش‌های بزرگی از سطح زمین است. در روش‌های سنجش از دور مدل‌هایی که برای تخمین میزان بیومس ارائه شده‌اند عموماً بر محاسبه شاخص‌های گیاهی استوارند که با استفاده از این شاخص‌ها و با فرض یک نوعتابع خطی، لگاریتمی یا نمایی پارامترهای تابع محاسبه و میزان بیومس تخمین زده می‌شود. در تحقیق حاضر برخلاف انتظار شاخص پوشش گیاهی، که در زمینه مطالعات پوشش گیاهی کاربردهای فراوانی دارد و افزایش مقادیر آن بیانگر وجود پوشش گیاهی بیشتر در منطقه است (۲۴)، در مدل جمعی تعیین‌یافته و بررسی توامان رابطه شاخص‌های گیاهی و ANPP رابطه معنی‌داری را نشان نداد. این مسئله می‌تواند به دلیل پوشش گیاهی متوسط منطقه باشد. نتایج برخی تحقیقات نشان داده است که این شاخص به عنوان یکی از پرکاربردترین شاخص‌های

خالص اولیه گندمیان دارد که مغایر با نتایج زرینه و همکاران (۲۰۱۳) است. آن‌ها نشان دادند که از بین شاخص‌های گیاهی مورد بررسی شاخص DVI بیشترین و شاخص PVI کمترین ضریب همبستگی معنی‌دار را با تولید گندمیان دارد. تولید پهن‌برگان علفی با شاخص PVI₃ رابطه معنی‌داری دارد اما ضریب تبیین آن پایین‌تر از سایر فرم‌های رویشی است. زرینه و همکاران (۲۰۱۳) نیز در تحقیق خود نشان دادند که تولید گیاهان پهن‌برگ علفی به طور مستقل با هیچ یک از شاخص‌های گیاهی مورد بررسی همبستگی معنی‌دار نداشته است. آن‌ها بیان کردند که احتمالاً تولید این گروه از گیاهان در ابتدای فصل رشد پایین‌بوده و فعالیت فتوسنتزی آن‌ها به اندازه‌ای نبوده است که سنجنده بتواند ثبت کند. در حالی که در مطالعه قربانی و همکاران (۲۰۱۷) میزان ضریب همبستگی بین تولید پهن‌برگان علفی و شاخص‌های گیاهی در مقایسه با شکل‌های رویشی دیگر بیش‌تر بوده است. آن‌ها بیان کردند که پوشش پهن‌برگ علفی در زمان تصویربرداری سبز بوده و از نظر اندازه و زاویه قرار گرفتن برگ‌ها روی ساقه نیز که از ویژگی‌های پهن‌برگان است در مقایسه با گندمیان و بوته‌ها که افقی‌ترند و اندازه آن‌ها نیز بزرگ‌تر به نظر می‌رسد، به‌همین دلیل این شکل رویشی توانسته است بازتاب بیش‌تری در مقایسه با گروه‌های دیگر داشته باشد و روابط معنی‌دارتری با شاخص‌های محاسبه شده از تصاویر ماهواره‌ای نشان دهد.

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که برآورد ANPP با استفاده از شاخص‌های گیاهی در سطح کل بهتر از فرم‌های رویشی است که مغایر با نتایج زرینه و همکاران (۲۰۱۳) است. آن‌ها بیان کردند که با توجه به بالا بودن ضریب تبیین تولید خالص اولیه کل نسبت به فرم‌های رویشی به نظر می‌رسد که عدم قطعیت بیش‌تری برای تخمین تولید کل وجود دارد، که می‌تواند به علت خطای اندازه‌گیری تولید بوته‌ها در شروع فصل رشد باشد، زیرا تولید بوته‌ها در مقایسه با تولید گیاهان دیگر نظیر گندمیان اندک است و همین مقدار مختصر نیز کمتر در معرض سنجنده قرار می‌گیرد. تحقیق سلمان بیاتی و همکاران (۲۰۱۸) نشان داد که بین درصد پوشش گیاهی کل و شاخص‌های گیاهی نسبت به فرم‌های رویشی همبستگی کمتری وجود دارد.

شاخص‌ها مشکل است. از این رو در منطقه مورد مطالعه که همراه با بروen زدگی سنگی زیاد است، بدلیل تاثیر بروen زدگی‌های سنگی بر بازتاب نور، شاخص‌های شیب قادر به شناسایی پوشش گیاهی نبوده‌اند. در حالی که شاخص‌هایی مانند PVI و شاخص تعديل شده خاک (SAVI) که در ناحیه مادون قرمز مرئی و قرمز وجود دارند، تحت تاثیر خصوصیات خاک قرار نمی‌گیرند (۲۸). این نتیجه مغایر با نتایج میری و همکاران (۲۰۱۶) است که شاخص‌های خط خاک را در مقایسه با شاخص‌های SR و NDVI در برآورد شاخص سطح برگ مفید ارزیابی کردند. آن‌ها بیان کردند که دلیل این مسئله را می‌توان در تراکم متوسط تودهای درختی به همراه پوشش علفی خشک شده کف جنگل و اثرگذار نبودن بازتاب سطح خاک، جستجو کرد.

بر اساس نتایج، فرم‌های رویشی مختلف هم از جهت میزان همبستگی با شاخص‌های گیاهی و هم شاخص گیاهی مناسب به منظور برآورد تولید آن‌ها با یکدیگر متفاوت هستند. این مسئله احتمالاً به دلیل تفاوت بین فرم‌های رویشی مختلف از جهت مقدار آب، ساختمان سلول، مقدار کلروفیل، ساختمان گیاه و ویژگی‌های مورفولوژیک مانند نوع ناج پوشش گیاهی، شکل برگ و نیز تنوع در فعالیت‌های زیستی است که در نهایت منجر به تفاوت در مقدار بازتاب از پوشش گیاهی می‌شود (۱۹). نتایج ما نشان داد که تولید SAVI خالص اولیه بوته‌ها همبستگی معنی‌داری با شاخص دارد. معنی‌دار شدن شاخص SAVI با ضریب تبیین بالا حکایت از آن دارد که خاک زمینه سهم بالایی در بازتاب ثبت شده دارد. از آنجایی که دو باند ۳ و ۴ در این شاخص حضور دارد، بنابراین هریک از این باندها (به‌دلیل انعکاس پوشش گیاهی در محدوده مادون قرمز نزدیک و جذب رنگدانه‌های گیاهی خصوصاً کلروفیل در محدوده طیفی قرمز) قابلیت تخمین پوشش گیاهی را دارند. این مسئله را می‌توان این گونه توجیه کرد که زمان تصویربرداری مطابق با خرداد ماه بوده و با توجه به کوهستانی بودن منطقه مورد مطالعه، بوته‌ها به‌طور کامل رشد نکرده و خاک دارای پوشش کاملی نمی‌باشد. از این رو شاخص‌های گروه خط خاک بازتاب خاک زمینه را کاهش داده و توانایی خوبی در برآورد مقادیر کم پوشش گیاهی بوته‌ای داشته‌اند (۲۸). همچنین نتایج نشان داد که شاخص PVI₃ رابطه معنی‌داری با تولید

آن‌ها می‌توانند مقدار بیوماس را با استفاده از شاخص‌های گیاهی با صحت قابل قبولی پیش‌بینی کنند. هم‌چنین می‌توان نتیجه‌گیری نمود در نظر گرفتن توأمان متغیرهای تبیینی که در این مطالعه شاخص‌های گیاهی هستند، توصیف صحیح‌تری از ارتباط شاخص‌ها و ANPP ارائه می‌دهد. به طوری که در مدل تعیین‌یافته تجمعی به صورت انفرادی، همه شاخص‌های گیاهی مورد بررسی دارای رابطه معنی‌داری با ANPP بودند در حالی که در حالت توأمان برخی شاخص‌ها رابطه معنی‌داری را نشان ندادند.

به طور کلی پژوهش حاضر، قابلیت تصویر سنجند OLI به منظور برآورد تولید خالص اولیه را تایید می‌کند. با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق، تصویر OLI و استفاده از مدل‌های رگرسیونی غیرخطی توائستند به مقدار مناسبی ANPP را در منطقه پژوهش برآورد کنند. از این‌رو در صورت کسب نتایج مشابه در دیگر مناطق اردبیل، امکان تعیین نتایج و زمینه برآورد این شاخص اکولوژیکی مهم با صرف زمان و هزینه کمتر فراهم خواهد شد. هم‌چنین از این ابزار می‌توان جهت تأمین اطلاعات از میزان تولید علوفه و در نتیجه تعیین ظرفیت و میزان دام در این تاریخ و هم‌چنین میزان تخریب مرتع، استفاده کرد.

تقدیر و تشکر

این تحقیق با حمایت مالی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی انجام شده است. بدین‌وسیله نویسنده‌گان از حمایت این معاونت سپاسگزاری می‌کنند.

براساس نظر آن‌ها زمانی که تیپ‌های گیاهی مختلف به صورت یکجا بررسی می‌شوند به دلیل تنوع فرم رویشی و نوع گونه‌های گیاهی که باعث اختلاف طیفی می‌گردد، همبستگی شاخص‌ها و درصد پوشش کل کاهش می‌یابد. در تحقیق حاضر شاخص مناسب برآورد تولید خالص اولیه پهنه‌برگان علفی و گندمیان مشابه کل بوده است و در کار قربانی و همکاران (۲۰۱۷) نیز شاخص‌های مناسب برآورد کل مشابه پهنه‌برگان علفی بوده است. علت این امر می‌تواند پوشش مراتع منطقه مورد مطالعه باشد که عمدتاً پوشیده از گونه‌های گندمیان و پهنه‌برگان علفی است به گونه‌ای که گندمیان، پهنه‌برگان علفی و بوته‌ها به ترتیب ۳۸/۳۹، ۴۴/۵۰ و ۱۷/۰۹ درصد از پوشش گیاهی را شامل می‌شوند.

مقایسه نتایج تحقیق حاضر با قربانی و همکاران (۲۰۱۷) که در همین منطقه انجام و برآوردها با استفاده از رگرسیون خطی صورت گرفته است نشان می‌دهد که رگرسیون غیرخطی به افزایش صحت برآوردها در منطقه مورد مطالعه کمک کرده است. ضریب تبیین بین تولید خالص اولیه بوته‌ها، گندمیان، پهنه‌برگان علفی و کل در تحقیق حاضر به ترتیب ۰/۷۴، ۰/۷۵، ۰/۵۶ و ۰/۸۰ و ۰/۲۹ و ۰/۱۴ است. لیو و همکاران (۲۰۰۶) به منظور برآورد بیومس DVI، SAVI، RVI و NDVI از مدل‌های رگرسیونی خطی و غیرخطی استفاده کردند. نتایج آن‌ها نشان داد که به طور کلی، مدل‌های غیرخطی بهتر از مدل‌های خطی عمل می‌کنند، اگر چه همه

References

- Abdolalizadeh, Z., A. Ghorbani, R. Mostafazadeh & M. Moameri, 2020. Rangeland canopy cover estimation using Landsat OLI data and vegetation indices in Sabalan rangelands, Iran. Arabian Journal of Geosciences, 13: 245.
- Alavi, S.J., Z. Nouri & Gh. Zahedi Amiri, 2017. The response curve of beech tree (*Fagus orientalis* Lipsky.) in relation to environmental variables using generalized additive model. Wood and Forest Science and Technology, 24 (1): 29-42. (In Persian)
- Aliabadi, K. & A. Entezari., 2013. Estimation of physical parameter (biomass) of vegetation using remote sensing data. Iranian Journal of Arid Regions Geographic Studies, 15(4): 23-33. (In Persian)
- An, N., K.P. Price & J.M. Blair, 2013. Estimating above-ground net primary productivity of the tallgrass prairie ecosystem of the Central Great Plains using AVHRR NDVI. International Journal of Remote Sensing, 34(11): 3717-3735.
- Arzani, H. & M. Abedi., 2015. Rangeland evaluation: Vegetation Measurement, Tehran University Press, 305 p. (In Persian)
- Borge, N.H. & E. Leblanc., 2001. Comparing prediction power and stability of broadband and hyper spectral vegetation indices for estimation of green leaf area index and canopy chlorophyll density. Journal Remote Sensing of Environment, 76: 156-172.

7. Dadjou, F., A Ghorbani, M. Moameri & M. Bidarlord, 2018. Effects of temperature and rainfall on the aboveground net primary production of Hir and Neur rangelands in Ardabil province. *Iranian journal of Range and Desert Research*, 25(3): 577-593.
8. Deka, J., J.Y. Yumnam, P. Mahanta & O.P. Tripathi, 2015. Improvement in estimation of above ground biomass of Albizia lebbeck using fraction reflectance of landsat TM data. *Journal Plant and Environment*, 1(1): 99-105.
9. Eisfelder, C., C. Kuenzer & S. Dech, 2012. Derivation of biomass information for semi-arid areas using remote sensing data. *International Journal of Remote Sensing*, 33(9): 2937–2984.
10. Eisfelder, C., C. Kuenzer, S. Dech & M.F. Buchroithner, 2013. Comparison of two remote sensing-based models for regional net primary productivity estimation-A case study in semi-arid central Kazakhstan. *J. IEEE Journal on Selected Topics in Earth Observation and Remote Sensing*, 6(4): 1843-1856.
11. Eisfelder, C., I. Klein, M. Niklaus & C. Kuenzer, 2014. Net primary productivity in Kazakhstan, its spatio-temporal patterns and relation to meteorological variables. *Journal of Arid Environment*, 103: 17-30.
12. Elshorbagy A., G. Corzo, S. Srinivasulu & D. Solomatine, 2009. Experimental investigation of the predictive capabilities of soft computing techniques in hydrology. Centre for Advanced Numerical Simulation (CANSIM). Department of Civil & Geological Engineering, University of Saskatchewan, Saskatoon, SK, CANADA.
13. Freeman, K., K. Girma, D. Arnall, R. Mullen, K. Martin, R. Teal & W. Raun, 2007. Byplant prediction of corn forage biomass and nitrogen uptake at various growth stages using remote sensing and plant height. *Agronomy Journal*, 99: 530–536.
14. George, M.R., W.A. Williams, N.K. McDougald, W.J. Clawson & A.H. Murphy RPHY, 1989. Predicting peak standing crop on annual range using weather variables. *Journal of Range Management*, 42(6): 508-513.
15. Ghaemi, M., H. Sanaei Nejad, A. Astaraie & P. Mirhoseini, 2010. Investigation and comparison of different vegetation indices using satellite imagery ETM for vegetation studies in Neyshabur Plain, Razavi Khorasan. *Iranian Journal of Field Crops Research*, 8(1): 127-137. (In Persian)
16. Ghorbani, A., A. Pournemati & M. Panahandeh, 2017. Estimating and mapping Sabalan rangelands aboveground phytomass using Landsat-8 images. *Iranian Journal of Range and Desert Research*, 24(1): 165-180. (In Persian)
17. Ghorbani, A., F. Dadjoo, M. Moameri, M. Bidar Lord & K. Hashemi Majd, 2018. Investigating the relationships between net primary production with physiographic factors in Hir and Neur rangelands in Ardabil province. *Journal of Rangeland*, 12(1): 73-88. (In Persian)
18. Ghorbani, A., F. Dadjou, M. Moameri & A. Biswas, 2020. Estimating Aboveground Net Primary Production (ANPP) Using Landsat 8-Based Indices: A Case Study from Hir-Neur Rangelands, Iran. *Rangeland Ecology & Management*, 73: 649-57.
19. Hadian, F., R. Jaffari, H. Bashari & S. Soltani, 2012. Evaluation of different groups of vegetation indices in the study of rangelands aggregation. *Journal of Rangeland*, 5: 420-425. (In Persian)
20. Kumar, L., P. Sinha, S. Taylor & A.F. Alquarashi, 2015. Review of the use of remote sensing for biomass estimation to support renewable energy generation. *Journal of Applied Remote Sensing*, 9(1): 097696.
21. Liu, W., W. Gao, Z. Gao & X. Wang, 2006. Correlation analysis between the biomass of oasis ecosystem and the vegetation index at Fukang. In *Remote Sensing and Modeling of Ecosystems for Sustainability III*, 6298: 62982.
22. Ma, W.H., J.Y. Fang, Y.H. Yang & A. Mohammadi, 2010. Biomass carbon stocks and their changes in northern China's grasslands during 1982-2006. *Journal of Science China Life Sciences*, 53(7): 841-850.
23. Masemola, C., M. Cho & A. Ramoelo, 2016. Comparison of Landsat 8 OLI and Landsat 7 ETM + for estimating Grassland LAI using model inversion and spectral indices: case study of Mpumalanga, South Africa. *International Journal of Remote Sensing*, 37(18): 4401-4419.
24. Miri, N.A., A. Darvishsefat, N. Zargham & Z. Shakeri, 2016. Estimation of leaf area index in Zagros forests using Landsat 8 data. *Iranian Journal of Forest*, 9(1): 29-42. (In Persian)
25. Pordel, F., A. Ebrahimi & Z. Azizi, 2017. Evaluating spatio-temporal phytomass changes using vegetation index derived from Landsat 8 (Case study: Mrajan rangeland, Boroujen). *Journal of Rangeland*, 11(2), 166-178.
26. Rayegani, B., Gh. Zehtabian, H. Azarnivand, S.K. alavipanah & S.J. Khajeddin, 2015. LADA method Performance evaluation on soil degradation assessment in the East of Esfahan. *Journal of Range and Watershed Management*, 68(1): 109-129. (In Persian)
27. Salman bayati, T., Z. Hoseini Rashtian & A. Alirezaee, 2018. Comparison of accuracy of different sampling methods for vegetation cover percentage in remote sensing studies (case study: Abas Abad rangelands of Hamadan). *Journal of Rangeland*, 12(2): 169-179. (In Persian)

28. Sanaei Nejad, H., A. Astaraie, P. Mirhoseini & A. Keshavarzi, 2009. Using Satellite Images for Vegetation Studies (Comparison of Different Vegetation Indices -Case Study of Neishabour Area). Fifth National Congress on Agricultural Machinery engineering and Mechanization, Mashhad. (In Persian)
29. Sharifi, J., A. Ghorbani, M. Fayaz & P. Ashory. 2016. Vegetation types and plant life forms in alpine rangelands Sabalan in Ardabil. Iranian Journal Natural Ecosystems of Iran, 7(2): 65-75. (In Persian)
30. Solaimani, K., F. Shokrian, R. Tamartash & M. Banihashemi, 2015. Determination of vegetative forms using LISSIII data in Nojmeh rangeland. Journal of Range and Desert Research, 22(3): 455-465. (In Persian)
31. Xu, B., X. Yang, W. Tao, Z. Qin, H. Liu, J. Miao & Y. Bi, 2008. MODIS-based remote sensing monitoring of grass production in China. International Journal of Remote Senseing, 29(17): 5313–5327.
32. Xue, J. & B. Su., 2017. Significant Remote Sensing Vegetation Indices: A Review of Developments and Applications. Sensors, 10: 1-17.
33. Zarineh, E., M. Naderi Khorasgani & E. Asadi Borujeni, 2013. Estimating the rangeland vegetation cover of Tange Sayyad Region (Chaharmahal-oBakhtiary Province) using IRS LISS-III data. Journal of Environmental Studies, 38(1): 117-130. (In Persian)