

بررسی رفتار چرایی بز نژاد ممسنی در مراعت بیلاقی شهرستان بوانات

محرم اشرفزاده^۱، سید حمزه حسینی کهنوج^{*} و حسین آذرنیوند^۲

تاریخ دریافت: ۹۲/۰۳/۲۰ - تاریخ پذیرش: ۹۲/۰۹/۱۵

چکیده

تحقیق حاضر با هدف مطالعه ارزش رجحانی برخی گونه‌های گیاهی برای بز نژاد ممسنی در مراعت شهرستان بوانات در شمال استان فارس انجام شد. ارزش رجحانی گونه‌های گیاهی منطقه برای سه کلاس سنی دام (یکساله، سه‌ساله و پنج‌ساله ماده) بوسیله روش زمان‌سنگی اندازه‌گیری شد. برای بررسی اثر سن دام، گونه گیاهی و اثر متقابل آنها بر روی ارزش رجحانی گونه‌ها، از آزمون تجزیه واریانس دوطرفه استفاده شد، به طوری که سن دام و گونه گیاهی به عنوان عامل مستقل و ارزش رجحانی به عنوان عامل وابسته به مدل وارد شدند. نتایج نشان داد که سن دام، گونه گیاهی و اثر متقابل آنها تأثیر معنی‌داری بر ارزش رجحانی گونه‌های گیاهی داشتند. گونه‌های Poa pratensis و Prangos ferulaceae دارای بیشترین ارزش رجحانی و خوشخوارکی (کلاس I) برای دام‌های جوان بودند. برای دام‌های بزرگ‌سال گونه‌های Poa pratensis Acer cinerascens Gundelia tournefortii و Prangos ferulaceae Acer cinerascens Prangos ferulaceae بالاترین کلاس خوشخوارکی (I و II) را داشتند. ضمن اینکه گونه‌های Poa pratensis Artemisia aucheri و Prangos ferulaceae ارزش رجحانی مناسبی برای هر سه گروه دام داشتند. به طور کلی نتایج بیانگر وضعیت نامناسب ترکیب پوشش گیاهی مراعت این منطقه در فصل پاییز است و گونه‌هایی از قبیل کیکم (Ac-cinerascens)، درمنه کوهی (Ar- aucheri) و باقیمانده‌های گیاه جاشیر (Pr- ferulaceae) به صورت لاشبرگ می‌توانند نقش کلیدی در تأمین نیازهای غذایی دام این منطقه داشته باشد.

واژه‌های کلیدی: ارزش رجحانی، بز نژاد ممسنی، فصل پاییز، کلاس سنی.

۱- کارشناس ارشد مرتع‌داری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

۲- دانشجوی دکتری علوم مرتع دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

*: نویسنده مسئول: s.hamzeh.hossaini@gmail.com

۳- استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

مختلف برای افراد یک گونه چراکننده متفاوت است. نتایج پاپاچریستون^۳ و همکاران (۲۰۰۵) نشان دام که وجود علوفه مناسب و قابلیت دسترس در ترجیح غذایی دامها مؤثر می‌باشد. سندگل (۲۰۰۵) نتیجه گرفت که ارزش رجحانی گونه‌های گیاهی در طول فصل چرا و نیز در گونه‌های مختلف بسیار متغیر است. اشرفزاده و همکاران (۲۰۱۲) به مطالعه تأثیر کلاس سنی شتر بر روی ارزش رجحانی گونه‌های گیاهی مراعع جنوب استان فارس پرداختند و نتایج آنها بیانگر تفاوت معنی دار ارزش رجحانی گونه‌های گیاهی تحت تأثیر سن دام بود. حسینی‌کهنهوج و همکاران (۲۰۱۳) نیز تأثیر کلاس سنی بز نژاد رایینی را در جنوب استان کرمان بر روی ارزش رجحانی گونه‌های گیاهی مطالعه کردند و بیان کردند که سن دام تأثیر معنی داری بر روی رجحان گونه‌های گیاهی داشت. به هر حال مطالعات مختلفی بر روی ارزش رجحانی گونه‌های گیاهی برای دامهای مختلف صورت گرفته است، اما تحقیق در این زمینه به میزان بیشتری و به صورت هدف‌دار برای نقاط مختلف کشور بخصوص در اقلیم‌های مختلف نیاز است تا بتوان به شناخت بیشتری در زمینه رژیم غذایی دامها دست یافت و برای مدیریت بهتر و کارآمد مراعع کشور از آنها استفاده کرد. در همین راستا این مطالعه با هدف بررسی ارزش رجحانی گونه‌های گیاهی مراعع تحت تأثیر کلاس‌های سنی بز نژاد ممسمی در مراعع شمال استان فارس (مراعع شهریاری از مراعع بخش مزایجان از توابع شهرستان بوتان) انجام شد.

مواد و روش‌ها

معرفی منطقه مورد مطالعه: منطقه مورد مطالعه واقع در مراعع شمال شرقی استان فارس (مراعع منطقه شهریاری از مراعع شهر مزایجان از توابع شهرستان بوتان) در ۲۴۰ کیلومتری شمال شهر شیراز با مساحتی حدود ۷۰۰ هکتاری باشد. متوسط بارندگی سالانه منطقه ۲۷۰ میلی‌متر و اغلب بارش در پاییز و زمستان و به صورت باران و برف است. موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه شامل، طول

مقدمه

ارزش رجحانی، ترجیح دام در خوردن یک گیاه نسبت به گیاه دیگر است، با این وصف که دام به صورت آزاد قادر به انتخاب گیاهان برای چرا باشد. ارزش رجحانی تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل سن دام، ترکیب گیاهی و مرحله فنولوژیکی قرار می‌گیرد (۳). توجه به تغذیه علفخواران یکی از موارد مهم در مدیریت اصولی مراعع است و اگر بتوان رفتارهای چرایی و دلیل ترجیح گونه‌ها را تشخیص داد و کنترل نمود، حداکثر جذب مواد در حیوانات چراکننده را می‌توان به راحتی برآورد کرد (۱۱). برای مدیریت بهتر مراعع درک بهتری از عوامل مؤثر بر انتخاب و ترجیح علوفه توسط دام ضروری است (۱۳). ضمن اینکه برنامه‌ریزی مناسب در مرتع ایجاب می‌کند که مرتعداران علاوه بر تغییرات کیفیت و کمیت علوفه در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، از ارزش رجحانی و تغییرات آن در طول زمان چرا نیز آگاهی داشته باشند (۳) و درک بهتر از آن می‌تواند به توسعه و گسترش پوشش گیاهی مراعع با ارائه و بهبود راهبردهای مدیریتی کمک کند (۱۹).

علاوه بر این حواس پنجه‌گانه (بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه) در تعیین ارزش رجحانی گیاهان علوفه ای نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند (۱۰). به هر حال فقط عوامل مربوط به گیاهان مرتع نیستند که بر انتخاب جیره غذایی دامهای چرا کننده مؤثرند، بلکه عوامل مربوط به خود چراکننگان نیز بر این رفتار مؤثر است. به طور کلی عادات غذایی و اولویت‌های آن برای چرا دام می‌تواند متأثر از مجموعه‌ای از عوامل محیطی و حیوانی باشد (۲). به طوری که ملادو^۱ و همکاران (۲۰۰۰) عوامل حیوانی و حسینی کهنهوج و همکاران (۲۰۱۳) عوامل محیطی را عاملی مؤثر بر ارزش رجحانی گونه‌های گیاهی عنوان کردند. تاکنون مطالعات زیادی بر رفتار چرایی دامهای مختلف بهویژه بز و مقایسه ارزش رجحانی گونه‌های مختلف گیاهی توسط این نوع دام در سراسر دنیا انجام شده است، به طوری که مطالعه ولنتاین^۲ (۲۰۰۱) بر روی بز نشان داد که ارزش رجحانی گیاهان

به پلات گذاری اقدام شد. بدین صورت که در هر منطقه معرف ۲۰ پلات به صورت تصادفی مستقر گردید.

اندازه‌گیری ارزش رجحانی گونه‌های گیاهی: ارزش رجحانی گونه‌های گیاهی منطقه مورد مطالعه با استفاده از روش چرای آزاد دام، در اواسط فصل پاییز (آبان ماه) پس از مرحله بذردهی گونه‌های درختی، درختچه‌ای و بوته‌ای برای کلاسه‌های سنی مختلف دام با استفاده از روش زمان‌سنگی^۱ در کل منطقه (هر سه تیپ) انجام شد. با توجه به ترکیب غالب گله، سه کلاسه سنی از بزرگ‌ترین خشک نژاد مسمنی (یکساله ماده، سه‌ساله ماده، پنج‌ساله ماده) انتخاب شد. به‌طوری‌که برای هر کلاس سنی ۴ رأس دام انتخاب و هر روز زمان چرای یک رأس دام به مدت ۲ ساعت اندازه‌گیری شد. اندازه‌گیری زمان چرای دام هر روز از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح به مدت ۴ روز انجام شد. سپس زمان نسبی چرای دام مورد هدف از هر گونه گیاهی محاسبه شد. به‌منظور حذف تاثیر درصد پوشش گونه‌های مختلف بر ارزش رجحانی از رابطه پیشنهادی نگوا^۲ و همکاران (۲۰۰۰) استفاده شد که در آن:

پوشش یا تراکم نسبی گونه A (%) / زمان نسبی چرای دام از گونه A (%) = شاخص رجحان گونه A
در نهایت با توجه به ارزش رجحانی هر یک از گونه‌های گیاهی برای دام، گونه‌های گیاهی به چهار کلاس خوشخوارکی تقسیم شدند.

تجزیه و تحلیل داده‌ها: ابتدا بر روی داده‌ها آزمون نرمال بودن داده‌ها انجام شد برای تجزیه آماری از آزمون تجزیه واریانس دوطرفه و آزمون دانکن استفاده شد. به‌طوری‌که ارزش رجحانی به عنوان عامل وابسته و سن و گونه گیاهی به عنوان عوامل مستقل ثابت به مدل وارد شدند. از آزمون تجزیه واریانس یکطرفه جهت مقایسه اثر متقابل آنها (گونه گیاهی و کلاسه سنی دام) بر روی ارزش رجحانی گونه‌های گیاهی استفاده شد. آزمون‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای Excel و SPSS انجام شد.

۵۳ درجه و ۴۴ دقیقه و ۴۹ ثانیه شرقی و عرض ۳۰ درجه و ۱۲ دقیقه و ۳۴ ثانیه شمالی تا طول ۵۳ درجه و ۴۶ دقیقه و ۱۶ ثانیه شرقی و عرض ۳۰ درجه و ۱۱ دقیقه و ۵۸ ثانیه شمالی است. اقلیم منطقه دارای زمستان‌های سرد و خشک و فصل تابستان کوتاه و معتدل بوده و حداقل دمای هوا -۲۰ درجه و حداکثر ۳۴ درجه سانتی‌گراد است. حداکثر ارتفاع از سطح دریا ۳۳۶۲ متر به‌نام قله کوه خاتون می‌باشد. اغلب پوشش گیاهی در طول سال مربوط به گونه‌های بوته‌ای، درختچه‌ای و درختی می‌باشد. در بهار، گونه‌های علفی از جمله جاشیر حضور قابل توجهی را در ترکیب پوشش گیاهی منطقه دارند.

روش تحقیق

اندازه‌گیری پوشش گیاهی: نمونه‌برداری از پوشش گیاهی در آبان ماه سال ۱۳۹۲، همزمان با خزان شدن درختان و درختچه‌ای‌ها انجام شد (مرحله پس از بذردهی). پس از بازدید از منطقه مورد مطالعه، با توجه به توپوگرافی منطقه و فیزیونومی پوشش گیاهی، سه منطقه معرف انتخاب شد. پس از اندازه‌گیری درصد پوشش گیاهی، گونه‌های غالب مشخص در نهایت تیپ‌های گیاهی نامگذاری شد. با توجه به اینکه اغلب پوشش گیاهی منطقه مربوط به گونه‌های بوته‌ای و درختچه‌ای بود، اما گونه‌های علفی نیز به صورت پوشش خشک سرپا و لاشبرگ در منطقه وجود داشتند، بنابراین باقی اندازه پلات طوری انتخاب می‌شد که موجب رعایت دقت لازم برای اندازه‌گیری درصد پوشش گونه‌های بوته‌ای، درختچه‌ای و همچنین گونه‌های علفی نیز می‌شد. بنابراین پلات‌های 3×3 متری مورد استفاده قرار گرفتند (طبق بازدیدهای میدانی اندازه کوچکتر پلات‌ها برای ثبت پوشش درختچه‌ای مناسب نبود). ضمن اینکه برای دقت در اندازه‌گیری درصد پوشش گونه‌های علفی پلات‌ها به صورت چشمی به چند قسمت تقسیم شد و درصد پوشش در هر پلات اندازه‌گیری و گونه‌های گیاهی موجود در پلات‌ها شناسایی و ثبت شد. برای استقرار واحدهای نمونه‌برداری در نقاط مختلف هر منطقه معرف در جهات مختلف جغرافیایی

که به طور کلی در همه کلاس‌های سنی گونه‌های *Pr-* *Ac-cinerascens ferulaceae* و *Po-pratensis* بیشترین ارزش رجحانی و گونه‌های *As-parrawinus* و *Ph-fruticosa* کمترین ارزش رجحانی را به خود اختصاص دادند. همچنین برخی از گونه‌های گیاهی از قبیل *Po-ferulaceae* و *Pratensis* برای دام‌های جوانتر دارای بیشترین ارزش رجحانی بودند و گونه‌هایی از جمله *Ac-cinerascens* برای دام‌های مسن دارای ارزش رجحانی بیشتری بودند (جدول ۳).

پس از تعیین ارزش رجحانی گونه‌های گیاهی برای هر کلاسه سنی دام، خوشخوارکی برای هر گروه سنی دام نیز تعیین شد، به طوری که اغلب گونه‌های گیاهی جزو از لحاظ خوشخوارکی برای دام جزو گونه‌های کلاس III و غیر خوشخوارک بودند (جدول ۴).

نتایج

نتایج بازدیدهای میدانی نشان داد که سه تیپ گیاهی در منطقه مورد مطالعه وجود دارد (جدول ۱). بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون تجزیه واریانس دوطرفه، سن دام، گونه گیاهی و اثر متقابل آنها به طور معنی‌داری بر روی ارزش رجحانی گونه‌های گیاهی تأثیر دارند (جدول ۲). نتایج نشان داد که دام‌های پنج‌ساله زمان بیشتر (۳۹/۹۸) درصد کل زمان چرای هر سه کلاس سنی را صرف چرا از گونه‌های گیاهی کردند، به طوری که هم از گونه‌های بونتای و درختچه‌ای و هم از گونه‌های علفی چرای بیشتری را داشتند (از جمله: *Pr-ferulaceae* و *Ac-cinerascens*) و دام‌های یکساله و سه‌ساله به ترتیب ۳۰/۰۸ و ۲۹/۹۳ درصد از کل زمان چرا از پوشش گیاهی را به خود اختصاص دادند. در نهایت نتایج آزمون تجزیه واریانس یکطرفه و دانکن نشان داد

جدول ۱- تیپ‌های گیاهی موجود در منطقه مورد مطالعه و گونه‌های گیاهی موجود در هر تیپ گیاهی

درصد پوشش	خانواده	نام گونه	
۳۳	<i>Apiaceae</i>	<i>Ferula foetida</i> L.	
۱۷	<i>Asteraceae</i>	<i>Artemisia aucheri</i> Boiss & Lam.	تیپ یک
۱۳	<i>Apiaceae</i>	<i>Prangos ferulaceae</i> L.	
۸	<i>Aceraceae</i>	<i>Acer cinerascens</i> Boiss.	
۳	<i>Rosaceae</i>	<i>Amygdalus reuteri</i> Binomial name.	
۴۰	<i>Asteraceae</i>	<i>Artemisia aucheri</i> Boiss & Lam	
۱۰	<i>Apiaceae</i>	<i>Prangos ferulaceae</i> L.	
۱۵	<i>Poaceae</i>	<i>Avena fatua</i> L.	
۱۰	<i>Poaceae</i>	<i>Poa pratensis</i> L.	تیپ دو
۳	<i>Berberidaceae</i>	<i>Berberis vulgaris</i> L.	
۲	<i>Lamiaceae</i>	<i>Phlomis fruticosa</i> Berb.	
۲۵	<i>Aceraceae</i>	<i>Acer cinerascens</i> Boiss.	
۱۸	<i>Rosaceae</i>	<i>Amygdalus reuteri</i> Binomial name	
۱۰	<i>Apiaceae</i>	<i>Ferula foetida</i> L.	
۸	<i>Apiaceae</i>	<i>Prangos ferulaceae</i> L.	تیپ سه
۳	<i>Asteraceae</i>	<i>Artemisia aucheri</i> Boiss & Lam	
۱	<i>Asteraceae</i>	<i>Gundelia tournefortii</i> L.	
۱	<i>Asteraceae</i>	<i>Achillea millefolium</i> L.	

جدول ۲- تأثیر سن دام، گونه گیاهی و اثر متقابل آنها بر روی ارزش رجحانی گونه‌های گیاهی

Sig.	F	Df	منابع تغییر
.۰/۰۴۰	۲/۲۴۶	۲	سن دام
.۰/۰۰۰	۹/۳۲۱	۱۴	گونه
.۰/۰۰۰	۲/۹۲۲	۲۸	سن دام×گونه

جدول ۳- مقایسه اثر متقابل سن دام × گونه گیاهی بر ارزش رجحانی گونه‌های گیاهی. حروف بزرگ بیانگر مقایسه ارزش رجحانی گونه‌های گیاهی مختلف در کلاس‌های سنی مختلف، حروف کوچک بیانگر مقایسه شاخص رجحانی هر گونه برای سه کلاس سنی دام است.

کلاس سنی								
پنج ساله	سه ساله	یک ساله	خانواده	گونه گیاهی				
میانگین شاخص رجحان	اشتباه معیار	میانگین شاخص رجحان	اشتباه معیار	میانگین شاخص رجحان	اشتباه معیار	اشتباه معیار	اشتباه معیار	اشتباه معیار
.۰/۵۸۳Ca	.۰/۰۵۲	.۰/۵۲۳CDb	.۰/۰۲۴	.۰/۴۶۰DEFc	.۰/۰۳۱	Asteraceae	<i>Artemisia aucheri</i>	
.۰/۹۶۲ABa	.۰/۰۴۳	.۰/۷۲۱BCb	.۰/۰۲۴	.۰/۱۹۴EFGc	.۰/۰۴۲	Aceraceae	<i>Acer cinerascens</i>	
.۰/۲۱۴EFGa	.۰/۰۳۵	.۰/۱۷۹EFGa	.۰/۰۲۲	.۰/۰۶۴EFGa	.۰/۰۱۳	Poaceae	<i>Avena fatua</i>	
.۰/۱۵۸EFGa	.۰/۰۶۵	.۰/۲۰۹EFGa	.۰/۰۷۳	.۰/۰۲۰EFGa	.۰/۰۵۱	Rosaceae	<i>Amygdalus reuteri</i>	
.۰/۳۸۸EFGa	.۰/۰۹۳	.۰/۲۷۷EFGa	.۰/۰۴۶	.۰/۰۳۰EFGa	.۰/۱۰۹	Asteraceae	<i>Astragalus adscendens</i>	
.۰/۰۰۰Gb	.۰/۰۰۰	.۰/۰۰۰Gb	.۰/۰۰۰	.۰/۰۲۹EFGa	.۰/۰۷۷	Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i>	
.۰/۲۶۸EFGa	.۰/۰۸۵	.۰/۰۰۰Gb	.۰/۰۰۰	.۰/۰۰۰Gb	.۰/۰۰۰	Asteraceae	<i>Astragalus parrawinicus</i>	
.۰/۲۹۱EFGa	.۰/۰۷۱	.۰/۱۶۰EFGa	.۰/۰۰۸	.۰/۰۰۰Gb	.۰/۰۰۰	Berberidaceae	<i>Berberis vulgaris</i>	
.۰/۰۰۰Gb	.۰/۰۰۰	.۰/۰۵۷FGa	.۰/۰۰۴	.۰/۰۰۰Gb	.۰/۰۰۰	Apiaceae	<i>Ferula foetida</i>	
.۰/۹۶۹ABa	.۰/۲۵۶	.۰/۵۰۷CDEb	.۰/۱۱۲	.۰/۰۰۰Gc	.۰/۰۰۰	Asteraceae	<i>Gundelia tournefortii</i>	
.۰/۰۰۰Ga	.۰/۰۰۰	.۰/۰۰۰Ga	.۰/۰۰۰	.۰/۰۰۰Ga	.۰/۰۰۰	Malvaceae	<i>Malva neglecta</i>	
.۰/۰۰۰Ga	.۰/۰۰۰	.۰/۰۰۰Ga	.۰/۰۰۰	.۰/۰۰۰Ga	.۰/۰۰۰	Lamiaceae	<i>Phlomis fruticosa</i>	
.۰/۶۳۳BCDb	.۰/۲۰۰	.۰/۴۹۲DEFc	.۰/۲۶۵	.۰/۸۶۴ABCa	.۰/۲۱۳	Poaceae	<i>Poa pratensis</i>	
.۰/۶۱۶BCDb	.۰/۰۲۶	.۰/۶۷۹BCDb	.۰/۰۱۵	.۱/۲۶۹Aa	.۰/۰۵۴	Apiaceae	<i>Prangos ferulaceae</i>	
.۰/۰۰۰Gb	.۰/۰۰۰	.۰/۰۰۰Gb	.۰/۰۰۰	.۰/۱۷۷EFGa	.۰/۰۴۳	Asteraceae	<i>Scorzonera tortuosissima</i>	

جدول ۴- تعیین کلاس خوشخوارکی گونه‌های گیاهی منطقه مورد مطالعه در فصل پاییز

پنج ساله	سه ساله	یک ساله	خانواده	گونه گیاهی
II	II	II	Asteraceae	<i>Artemisia aucheri</i>
I	I	III	Aceraceae	<i>Acer cinerascens</i>
III	III	III	Poaceae	<i>Avena fatua</i>
III	III	III	Rosaceae	<i>Amygdalus reuteri</i>
N	N	III	Asteraceae	<i>Astragalus adscendens</i>
III	N	N	Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i>
III	N	N	Asteraceae	<i>Astragalus parrawinicus</i>
III	III	N	Berberidaceae	<i>Berberis vulgaris</i>
N	III	N	Apiaceae	<i>Ferula foetida</i>
III	N	N	Asteraceae	<i>Gundelia tournefortii</i>
I	II	N	Malvaceae	<i>Malva neglecta</i>
N	N	N	Lamiaceae	<i>Phlomis fruticosa</i>
N	N	N	Poaceae	<i>Poa pratensis</i>
I	II	I	Apiaceae	<i>Prangos ferulaceae</i>
I	I	I	Asteraceae	<i>Scorzonera tortuosissima</i>
N	N	III	Asteraceae	

حرف I بیانگر کلاس یک خوشخوارکی (گونه‌های با خوشخوارکی خوب)، II: کلاس دو خوشخوارکی (گونه‌های با خوشخوارکی متوسط)، III: کلاس سه خوشخوارکی (گونه‌های با خوشخوارکی کم) و N: نشان‌دهنده گونه‌های غیر خوشخوارک است.

درختچه‌ای می‌باشد دام‌های جوان علاقه چندانی به چرا از آنها ندارند. از طرفی به رغم اینکه بر اساس بازدیدهای میدانی، این دو گونه گیاهی به ترتیب به صورت لاشبرگ و پوشش خشک سرپا در ترکیب پوشش گیاهی وجود داشتند، اما همچنان عمدۀ توجه دام‌های یکساله بر روی این گونه‌ها بود. بنابراین از این نتایج چنین استنباط می‌شود که در چنین شرایطی مدیریت چرایی مرتع باستی به نحوی اعمال شود که گونه‌های علفی حتی به صورت لاشبرگ در ترکیب پوشش گیاهی وجود داشته باشد، زیرا بخش عمدۀ رژیم غذایی دام‌های جوان را تشکیل می‌دهند. اشرفزاده و همکاران (۲۰۱۲) نیز عنوان کردند که دام‌های جوانتر زمان بیشتری را به چرا از گونه‌های علفی نسبت به دام‌های مسن-تر صرف می‌کنند. همچنین بر اساس نتایج استخراج شده از تحقیق حاضر، دام‌های مسن‌تر در رژیم غذایی خود دامنه انتخاب بیشتری داشتند. به طوری که گونه‌های درختی از *Pr*-*cinerascens* و گونه‌های علفی از قبیل: *Ac-cinerascens* و *Po-pratensis* در اولویت *Gu-tournefortii ferulaceae* رژیم غذایی (کلاس خوشخوارکی I) این گروه سنی دام قرار داشتند. این بخش از نتایج نشان می‌دهد که دام‌های مسن‌تر (سه ساله و پنج ساله) در انتخاب چیره غذایی خود توانایی بیشتری دارند و ضمن استفاده از گونه‌های علفی، جهت تأمین بخش عمدۀ ای از نیاز غذایی خود، گونه‌های بوته‌ای، درختچه‌ای و درختی را نیز بخوبی مورد استفاده قرار می‌دهند. محققان دیگری از جمله اشرفزاده و همکاران (۲۰۱۲) و حسینی کهنوج و همکاران (۲۰۱۱) نیز عنوان کردند که دام‌های مسن‌تر نیز در صورت وجود گونه‌های علفی در ترکیب پوشش گیاهی، آنها را در اولویت رژیم غذایی خود قرار می‌دهند، اما در صورت کاهش این دام‌ها توانایی مناسبی در استفاده از سایر گونه‌های گیاهی از جمله گونه‌های بوته‌ای و درختچه‌ای را دارند. باستانی میدی و همکاران (۲۰۰۴) نیز عنوان کردند که به طور کلی بزها در صورت عدم وجود گونه‌های علفی توانایی زیادی در سرشاخه‌خواری دارند. یاينشتا^۱ و همکاران (۲۰۰۸) نیز در این زمینه به نتایجی

بحث و نتیجه‌گیری

نتایج این تحقیق نشان داد که اغلب چیره غذایی دام مربوط به چند گونه محدود بود، به طوری که از ۱۵ گونه‌ای که در ترکیب پوشش گیاهی وجود داشتند، میزان استفاده دام از ۶ گونه گیاهی از جمله *As- Ac-millefolium* و *Sc-tortuosissima Ma-neglecta Fe-foetida parrawinus Phl-fruticosa* صفر یا نزدیک به صفر بود. بنابراین این نتایج بیانگر لزوم توجه بیشتر به چگونگی تغذیه دام در فصولی می‌باشد که برخی از گونه‌های گیاهی از جمله گونه‌های یکساله و علفی که از ترکیب پوشش گیاهی حذف شده یا درصد پوشش آنها کاهش می‌یابد (از جمله فصل پاییز). البته شرایط دیگری از جمله ساختار فیزیکی علوفه و همچنین وضعیت فیزیکی دام نیز می‌تواند از عوامل تأثیرگذار بر رفتار تغذیه‌ای دام باشد (۸).

از طرفی با وجود اینکه ترکیب پوشش گیاهی دارای وضعیت نامناسبی بود، کلاسه‌های مختلف سنی دام زمان متفاوتی را بر روی چرا از گونه‌های گیاهی صرف کردند. بدین صورت که دام‌های مسن‌تر بطور معنی‌داری زمان بیشتری را به چرا از پوشش گیاهی منطقه صرف کردند. دلیل این تفاوت را می‌توان به توانایی فیزیکی و تجریه بیشتر دام‌های مسن و همچنین نیاز بیشتر آنها به مواد غذایی مرتبط دانست. حسینی کهنوج و همکاران (۲۰۱۳) در تحقیقی که در مراعع جنوب استان کرمان بر روی سه کلاسه سنی بز نژاد رایینی (یکساله، سه ساله و پنج ساله ماده) انجام دادند نیز عنوان کردند که دام‌های مسن‌تر در چرا از مراعع، بخصوص در شرایط فقر ترکیب پوشش گیاهی به صورت قوی‌تر عمل کرده و نیازهای خود را بهتر می‌توانند تأمین کنند.

بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق، گونه‌های *Pr*-*cinerascens* و *Po-pratensis* و *ferulaceae* بیشترین چرایی دام یکساله را به خود اختصاص دادند و برای این کلاس سنی به عنوان گونه‌های با کلاس خوشخوارکی I محسوب شدند. بنابراین حتی در شرایطی که ترکیب پوشش گیاهی وضعیت مناسبی ندارد و غالب پوشش گیاهی مربوط به گونه‌های بوته‌ای و

ضد کیفیت و از عوامل مؤثر دفع دام برای چرا از گیاه می‌باشد (۱۸). همچنین برخی از محققین از جمله میرداودی و سندگل (۲۰۰۹) به نتایجی مشابه با این تحقیق دست یافته‌اند، بنابراین حفاظت از گونه‌های درختچه‌ای مثل کیکم می‌تواند در جهت تأمین نیازهای غذایی دام این منطقه مناسب باشد. علاوه بر این گونه‌ای مثل جاشیر که در دوره رشد فعال خود به دلیل وجود مواد ثانویه و همچنین معطر بودن، مورد چرای دام قرار نمی‌گیرد، پس از خشک شدن اغلب به صورت لاشبرگ بخشی از جیره غذایی دام را در فصل پاییز تشکیل می‌دهد. محققین دیگری از جمله آبراموو^۱ و همکاران (۲۰۰۱) و زینستگر^۲ و همکاران (۲۰۰۳) در مطالعات خود بر تأثیر منفی مواد ثانویه بر روی ارزش رجحانی تأکید کردند. تجربه‌های میدانی محققین این مطالعه نشان می‌دهد با توجه زیاد بودن درصد پوشش گونه جاشیر در فصل بهار، می‌توان بخشی از آنرا از سطح مراعت این منطقه جمع‌آوری و ذخیره کرده و در فصولی مانند پاییز و زمستان بصورت علوفه دستی به دام‌هایی از قبیل دام‌های یکساله اختصاص داد. زیرا این گونه گیاهی بعد از خشک شدن به راحتی از سطح خاک جدا شده و توسط باد جابجا شده و بخش عمده آن بدون اینکه استفاده‌ای برای خوارک دام داشته باشد به راحتی از بین می‌رود. آذرنیوند و زارع چاهوکی (۲۰۱۰) نیز بیان داشتند که عدمه استفاده این گونه گیاهی جاشیر مربوط به بعد از دوره زندگی این گونه گیاهی می‌باشد. همچنین این محققین نیز جمع‌آوری و عرضه آن را به صورت دستی برای دام توصیه کرده‌اند. ضمن اینکه گونه درمنه کوهی (*Ar-au*) برای هر سه گروه سنی دام دارای ارزش رجحانی متوسطی بود و این گونه گیاهی بخش مهمی از جیره غذایی را در فصل پاییز برای دام این منطقه (بز نژاد ممسنی) تأمین می‌کند. به نظر می‌رسد با پیشرفت زمان و نزدیک شدن به فصل زمستان، با توجه به حذف برخی از گونه‌ها از جمله باقیمانده‌های جاشیر و چمن مرتقی، نقش درمنه کوهی در جهت نیازهای غذایی دام منطقه مهمتر شود، بنابراین این گونه گیاهی از لحاظ

مشابه با تحقیق حاضر دست یافتند. بنابراین می‌توان گفت که در فصل پاییز در مراعت این منطقه برنامه‌های مدیریتی ویژه‌ای اعمال گردد. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به تغذیه کمکی دام‌های یکساله یا جدا کردن آنها از بقیه دامها و تغذیه دستی این گروه سنی اشاره کرد. به هر حال چرای دام‌های مسن‌تر از گونه‌های کیکم (*Ac-cinerascens*) و کنگر (*Gu-tournefortii*) را می‌توان به دلیل شرایط خاص این گونه‌ها دانست. برای مثال کیکم گونه درختی بوده و دسترسی آن برای دام‌های یکساله تا حد زیادی محدود نیست. روگوسیکا^۳ و همکاران (۲۰۰۶) نیز قابلیت دسترسی گونه‌های گیاهی را عامل مؤثری در جهت زمان چرای دام از آنها تلقی کردند. سانون^۴ و همکاران (۲۰۰۷) نیز وضعیت فیزیکی مناسبتر دام‌های مسن‌تر از جمله قد بلند آنها را عامل استفاده بهتر آنها از گونه‌های مرفوع تر عنوان کردند. البته با توجه به خزان بخشی از برگ‌های گونه کیکم در زمان نمونه‌برداری همه کلاس‌های سنی مختلف دام از برگ‌های ریخته شده در زیراشکوب آن استفاده کردند. گونه کنگر (*Gu-tournefortii*) نیز دارای بافت خاردار و زختی است. همین موضوع می‌تواند در کاهش چرای دام‌های یکساله از آن مؤثر باشد، اما دام‌های مسن‌تر برای چرا از این گونه گیاهی مشکل چندانی نداشتند، زیرا توانایی بیشتری در استفاده از اندام‌های خاردار گیاهان دارند. به طور کلی بزها پس از ترجیح گیاهان آبدار و با پروتئین بالا، بر روی گیاهان خاردار متتمرکز می‌شوند (۱۱).

در نهایت اینکه گونه‌های *Ac-Pr-ferulaceae* و *Po-pratensis* *cinerascens* (کلاس یک از لحاظ خوشخوارکی) و گونه‌های *Phl-fruticosa* کمترین ارزش رجحانی را *As-parrawinus* و *Ma-neglecta*، به خود اختصاص دادند. به طوری که جزو گونه‌های غیر خوشخوارک در فصل پاییز برای بز نژاد ممسنی محسوب شدند. دلیل عدم چرای دام از گونه‌هایی از قبیل گون (*As-parrawinus*) مربوط به وجود خارهای فراوان آن می‌باشد. خصوصیات فیزیکی از قبیل وجود خار، از مهمترین عوامل

مرتع و راههای تأمین نیاز غذایی دام شود. به عبارت دیگر بهتر است در تعیین ظرفیت چرایی کوتاه‌مدت (ظرفیت چرایی یکساله مرتع) به وضعیت پوشش گیاهی و نیازهای غذایی دام در فصول مختلف توجه بیشتری شود. همچنین پیشنهاد می‌شود چنین مطالعاتی در شرایط اقلیمی مختلف و برای دامهای مختلف انجام شود تا مدیریت چرایی دامهای کشور به طور اصولی تر صورت پذیرد.

خوشخوارکی جزو گونه‌های کلاس دو (II) در فصل پاییز برای بز نژاد ممسمی بود.

بهطور کلی می‌توان گفت که دام مورد مطالعه (bz نژاد ممسمی) تا حد زیادی توان تأمین علوفه مورد نیاز خود از علوفه مراتع می‌باشد. اما در فصولی (از جمله فصل پاییز) که برخی از گونه‌های گیاهی از بیوژه گونه‌های علفی کاهش قابل توجهی می‌یابند، بهتر است توجه خاصی به ظرفیت

References

1. Abramov, A.Y., M.V. Zamaraeva, A.I. Hagelgans, R.R. Azimov & O.V. Krasilnikov, 2001. Influence of plant terpenoids on the permeability of mitochondria a lipid bilayers. *Journal of Biochimicaet Biophysica Acta (BBA)/Biomembranes*, 1512(1): 98-110.
2. Ahmadi, A., A. Sanadgol, M. Mohseniye Saravi, H. Arzani & G. Zahedi Amiri, 2009. Study on grazing behaviour and diet selection for Zandi race sheep, *Journal of Rangeland*, 3: 232-245. (In Persian).
3. Arzani, H., 2009. Forage quality and daily requirement of grazing animal. University of Tehran press, 354p. (In persian)
4. Ashrafzadeh, M., R. Erfanzadeh & S.H. Hosseini Kahnuj, 2012. Effect of plant phenological stages on preference value of Baluchi camel in Zarrin Dasht rangeland. *Journal of Rangeland*, 6(1): 18-25.
5. Azarnivand, H. & M.A. Zare Chahouki, 2010. Range Improvement. University Tehran Publications, 354 p, (In Persian)
6. Baghestani Meybodi, N., H. Arzani, M. Shokat Fadayi & Nikkhah, E, 2004. Study of the effects of grazing on grassland steppe vegetation (pasture Nir case study of Yazd Province). (In Persian)
7. Hosseini Kahnuj, S. H., R. Erfanzadeh & P. Kamali, 2011. Evaluation of preference value and forage protein variations of plant species in Kahnuj rangelands of Kerman province. *Iranian Journal of Pajohesh and Sazandagi*, 91: 58-67. (In Persian)
8. Hosseini Kahnuj, S.H., R. Erfanzadeh & P. Kamali, 2013. The investigation of relationship between goat age and preference value of plant species in dry rangelands in Kahnuj, Kerman province. (In Persian)
9. Mellado, M., A. Rodriguez, J. A. Villarreal & A. Olvera, 2005. The Effect of Pregnancy and Lactation on Diet Composition and Dietary Preference of Goats in a Desert Rangeland. *Journal of Small Ruminant Research*, 58: 79-85.
10. Mesdaghi, M., 2007. Range management in Iran. Astane Ghods Publications, 259 p. (In Persian)
11. Mirdavoodi, H.R & A.A. Sanadgol, 2009. Study of preference value of range plants in key ranges of Anjedan's rangelands of Markazi province, *Journal of Rang and Desert Research*, 16(2): 190-199. (In Persian)
12. Mohtasham Nia, S., 2001. The Study of palatability, Effective factors and Measurement Techniques, M. Seminar of Range Management Faculty of Natural Resources and Marin Science, Tarbiat Modares University, 85 p. (In Persian)
13. Ngwa, A.T., D.K. Pone & J.M. Mafeni, 2000. Feed selection and dietary preferences of forage by small ruminants grazing natural pastures in the Sahelian zone of Cameroon. *Journal of Animal feed science and technology*, 8: 3-4.
14. Papachriston, T.G., L.E. Dziba & F.D. Provenza, 2005. Botanical composition determination of range herbivore diets: a review. *Small Ruminant Research*, 59: 141-156.
15. Rashtian, A., M. Mesdaghi, F.A. Boldaji & H. Barani, 2009. Preference value of seven species in the steppe regions of Yazd province, *Journal of Agriculture Science and Natural Resources*, 16(3): 24-32.
16. Rogosica, J., J.A. Pfisterb, F.D. Provenzac & D. Grbesad, 2005. Sheep and goat preference for and nutritional value of Mediterranean maquis shrubs. *Journal of Small Ruminate Research*, 64:169-179.
17. Sanad Gol, A., 2005. Vegetative and productive characteristics of plants and livestock grazingin the pastures Saveh Rode Shor. Proceedings of Conference on Rangeland management in arid areas of forests and rangelands, : 48-34.

18. Sanon, H.O., C. Kabore-Zoungrana & I. Ledin, 2007. Behaviors of goats, sheep and cattle and their selection of browse species on natural pasture in a Sahelian area, Journal of Small Ruminant Research, 67: 64-74.
19. Valentine, J.F., 2001. Grazing Management, Academic Press, U.S.A., 659 p.
20. Yaji, T.M & E. Fukuda, 2001. Forage quality. Proceedings of the XIX International Grassland Congress, Brazil.
21. Yaynesheta, T., L.O. Eika & S.R. Moec, 2008. Influences of fallow age and season on the foraging behavior and diet selection pattern of goats (*Capra hircus* L.). Small Ruminant Research, 77(1): 25-37.
22. Zeinsteiger, P., A. Romero, P. Teibler, M. Montenegro, E. Rios, E.M, Ciotti, Acosta, O. De Perez & N. Jorge, 2003. Toxicity of volatile compounds of *Senecio grisebachii* baker (margarita) flowers in mice. Journal of RIA, 32(2): 125-136.