

## مقاله پژوهشی

## 20.1001.1.20080891.1400.15.3.5.4 : (DOR) شناسه دیجیتال

طراحی شاخص‌های ارزیابی پایداری مرتع عشايري استان فارس (مناطق مورد مطالعه: مرتع خم نمدان

اقلید، رباط سروستان و دوگوش نادری خنج)

مسعود یوسفی<sup>۱</sup>، یحیی اسماعیل‌پور<sup>۲\*</sup>، حامد جنیدی جعفری<sup>۳</sup>، حنانه محمدی کنگرانی<sup>۴</sup> و سعید صالحی<sup>۵</sup>

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ - تاریخ تصویب: ۱۳۹۹/۰۴/۰۹

## چکیده

یکی از دیدگاه‌های راجح و رو به گسترش در زمینه دستیابی به پایداری، تدوین شاخص‌های آن بر اساس داده‌های محلی و رویکرد هدایت شده و تجربی است. به این منظور طراحی و اولویت‌بندی شاخص‌های پایداری مرتع از دیدگاه کارشناسان در مرتع عشايري خم نمدان اقلید، رباط سروستان و دوگوش نادری خنج انجام شد. این سه منطقه به ترتیب به عنوان معرف مرتع فعلی عشايري (سردسیر، معتل و گرسیر) در استان فارس در نظر گرفته شد. در این پژوهش روش‌های تصمیم‌گیری چندمتغیره، دلفی فازی، تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روش تاپسیس (TOPSIS) مورد استفاده قرار گرفتند. گزینه‌های پرورش نامه در قالب چهار شاخص: اقلیم و هواشناسی، تولید گیاهی، خاک و انسانی تقسیم‌بندی شد. تجزیه و تحلیل نتایج در سطح شاخص‌ها نشان داد شاخص‌های انسان و خاک به ترتیب با وزن ۰/۸۰ و ۰/۳۰ از بیشترین وزن نسبی برخوردار بوده و شاخص‌های تولید گیاهی و اقلیم و هیدرولوژی با وزن‌های نسبی ۰/۱۳۴ و ۰/۰۵۶ در رتبه‌ی بعدی قرار گرفتند. در سطح گزینه‌ها یا معیارها همه گزینه‌های تایید نشده مربوط به شاخص انسان بودند در حالی که در شاخص‌های اقلیم و هیدرولوژی، تولید گیاهی و خاک همه گزینه‌ها مورد تایید خبرگان قرار گرفت. مقایسه زوجی گزینه‌ها نیز نشان می‌دهد که گزینه‌های درآمد و سرمایه، مالکیت و انواع فرسایش خاک قابل مشاهده به ترتیب با وزن‌های نسبی ۰/۱۶، ۰/۱۳ و ۰/۱۱ دارای بالاترین اولویت و گزینه‌های شاخص خشکی، میانگین دمای سالانه و دسترسی به علوفه جایگزین با وزن نسبی کمتر از ۰/۰۰۵ دارای اولویت هستند. نتایج روش تاپسیس نشان داد گزینه‌های مالی (درآمد، پسانداز، وام و بیمه)، مالکیت (زمین، دام، مسکن و خودرو) و انواع فرسایش بر دیگر گزینه‌ها برتری دارند.

**واژه‌های کلیدی:** اقلیم، تولید گیاهی، تحلیل سلسله مراتبی، تصمیم‌گیری چندمعیاره، خاک.

<sup>۱</sup>- دانشجوی دکتری بیابان‌زادی، گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

<sup>۲</sup>- استادیار گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

\*: نویسنده مسئول: y.esmaeilpour@hormozgan.ac.ir

<sup>۳</sup>- دانشیار گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران.

<sup>۴</sup>- دانشیار گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

<sup>۵</sup>- دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، اداره کل امور عشاير استان فارس، شیراز، ایران.

آینده‌ای پایدار تلاش کند (۱۶ و ۱۸). از دیگرسو پایداری عرصه‌های طبیعی ارتباط مستقیمی با پایداری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع بهره‌بردار دارد (۳۱) که باعث رواج روش‌های مبتنی بر داده‌های محلی و رویکرد هدایت‌شده و تجربی برای تدوین شاخص‌های دستیابی به پایداری شده است. در این پژوهش تلاش شد با همکاری و مشورت متخصصان دانشگاهی، پژوهشگران و کارشناسان اجرایی مرتع و محیط زیست و افراد خبره محلی به عنوان نمایندگان گروه‌های اصلی دارای آگاهی نسبت به SRM در منطقه مورد مطالعه، چارچوبی برای ارزیابی پایداری مراتع عشايری در استان فارس تدوین و پیشنهاد شود.

در ارتباط با موضوع این تحقیق تاکنون پژوهش‌های مختلفی انجام شده است. ویلهلمی و ویلههیت (۲۰۰۲) به ارزیابی آسیب‌پذیری ایالت نبراسکای آمریکا نسبت به وقوع خشکسالی زارعی پرداختند، در این مطالعه فاکتورهای بیوفیزیکی و اجتماعی شامل اقلیم، خاک، کاربری اراضی و دستیابی به آب آبیاری به عنوان عوامل بیوفیزیکی و اجتماعی ایجاد کننده آسیب‌پذیری معرفی شدند. نتایج نشان داد که مناطق فاقد آب آبیاری و دارای بافت خاک رسی که دارای نقصان رطوبت فصلی برای محصولات زارعی هستند، بیشترین آسیب‌پذیری را نسبت به وقوع خشکسالی دارند (۳۹). یان و همکاران (۲۰۰۳) با تهیه پرسش‌نامه‌ای که شامل ۱۷ شاخص بود، وضعیت پایداری یکی از مناطق شانگهای در چین را مورد ارزیابی قرار دادند. در نهایت شاخص‌ها در قالب سه گروه اقتصادی (برون‌ده اقتصادی، درآمد خانواده و اشتغال)، اجتماعی (جمعیت، تامین اجتماعی و میزان جنایت) و محیطی (کیفیت محیط‌زیست مدیریت ضایعات و پسماندها و حفاظت بوم‌شناختی) طبقه‌بندی شدند. نتایج این تحقیق نشان داد شاخص‌ها توسط گروه‌های اجتماعی گوناگون، درجه اهمیت متفاوت داشته و اولویت‌بندی سنجه‌ها نیز توسط هر گروه متفاوت بوده است (۴۱). نیکلسون و همکاران (۲۰۰۵) در ارایه شاخص تعیین پایداری تاکستان‌ها دو گروه سنجه مبتنی بر کیفیت خاک و سلامت محصول را به کار گرفتند. سنجه‌های کیفیت خاک شامل: ساختمان، فشردگی، عمق، تجزیه بقایای گیاهی، رنگ و مقدار ماده آلی، مقدار آب، پوشش،

## مقدمه

امروزه استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی، جوامع را با دو وضعیت ظاهرًا متناقض روپرور می‌کند؛ از یکسو، نیازهای انسان به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر محدودیت‌هایی در استفاده از منابع طبیعی برای برآوردن نیازهای انسان وجود دارد (۳۷ و ۴۰). این مساله از دهه ۹۰ میلادی، با تبیین اهداف توسعه‌ی هزاره سوم در سال ۲۰۰۰ میلادی و همچنین تدوین چارچوب ارزیابی زیست‌بوم هزاره در سال ۲۰۰۵ میلادی در سازمان ملل مورد توجه قرار گرفت که در پی آن با افزایش آگاهی نسبت به اثرات انسان بر محیط طبیعی به شکل‌گیری مفهوم توسعه پایدار انجامید (۱۳ و ۲۳). دستیابی به توسعه پایدار و رشد اقتصادی از اهداف مهم بسیاری از کشورهast و یکی از راههای عمدۀ نیل به آن پژوهش‌های علمی است.

بر اساس تحقیقات مختلف اعتقاد گسترده‌ای بوجود آمده است که از زمان محدود شدن شدید مدیریت عرفی مراتع دامداری سیار و عشايری بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار گرفته است (۶، ۹، ۳۵ و ۳۶). با آنکه دامداری عشايری برای سده‌های طولانی یکی از پویاترین و رایج‌ترین اشکال تولید و استفاده از مراتع و برای قرن‌ها مقاوم و پایدار بوده است امروزه بدلاًیلی از جمله به هم خوردن تعادل انسان، دام و مراتع که خود پیامدی از رشد جمعیت و عوامل بازدارنده اقلیمی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی-اجتماعی بوده است، با چالش و ناپایداری مواجه شده است (۶). علیرغم اینکه در برخی موارد دامداری عشايری و مبتنی بر کوچ به شکل سنتی نامتناسب با مدیریت پایدار مراتع (SRM<sup>۱</sup>) قلمداد شده است، حداقل در برخی مناطق می‌توان با تکیه بر مجموعه‌ای از اقدامات و گزینه‌ها معیارهای پایداری را ارتقا داده و به SRM دست یافت (۷). مدیریت پایدار منابع طبیعی بهمنابه استفاده از منابع طبیعی در راستای حفظ فرایندهای اکولوژیک و کیفیت زندگی در حال و آینده است (۱۸) و در صورتی ممکن است که مدیریت پایدار اکوسیستم‌های مرتعدی با در نظر داشتن تمام ابعاد ارزش‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی مراتع در جهت حفظ و بهره‌برداری آن‌ها و رسیدن به

متناقض و پیچیده‌ای تاکنون برای توسعه شاخص‌ها پیشنهاد شده است که از نظر روش‌شناسی بهویژه در چگونگی جمع‌آوری اطلاعات ناهمگون بوده و بر پیچیدگی کار افزوده‌اند. هدف این پژوهش طراحی و اولویت‌بندی مجموعه شاخص‌ها و گزینه‌های معرف پایداری مراعت در استان فارس با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره است.

### مواد و روش‌ها

#### منطقه مورد مطالعه

استان فارس با سطحی معادل ۱۲۲۶۰ کیلومترمربع، از نظر شرایط اقلیمی، طبیعت زیبا و جاذبه‌های طبیعی گردشگری، آثار باستانی و تنوع شرایط جغرافیایی، یکی از مهم‌ترین مناطق کشور به شمار می‌آید (شکل ۱). تنوع شرایط موجود موجب سازگاری و شکل‌گیری بزرگ‌ترین جامعه عشايری کشور در این استان شده است. این استان با ۱۴۷۷۹۰ نفر عشاير در قالب ۲۷۷۷۹ خانوار از سه ایل بزرگ قشقایی، خمسه و لر و طایفه مستقل، ۱۲,۵ درصد از عشاير کشور را در خود جای داده و به عنوان بزرگ‌ترین قطب عشايری کشور مطرح است. این جمعیت، در ۶۷ درصد ۵,۷ میلیون هکتار از عرصه‌های مرتعی استان با حدود ۳ میلیون رأس دام کوچک و تولید سالانه حدود ۲۰ هزار تن گوشت قرمز به دامداری مشغول هستند (۵). سامان‌های عرفی مورد مطالعه در این تحقیق متشکل از مراعت در سه منطقه قشلاقی، بیلاقی و میان‌بند استان هستند که مشخصات آن‌ها در (جدول ۱) ارایه شده است.


فرسايش، تراكم بي‌مهرگان و فعالیت زیستی خاک و سنجه‌های سلامت محصولات زراعی شامل: وضعیت ظاهری، رشد محصول، شیوع بیماری‌ها، شیوع حشرات، فراوانی دشمنان طبیعی، رقابت علف‌های هرز، عملکرد بالقوه و حقیقی، تنوع زراعی و زیستی (۲۰). ایریبارنگاری و همکاران (۲۰۱۲) شاخص‌های پایداری آب و فاضلاب را در کشور آرژانتین طراحی کردند. چارچوب نظری پایداری مورد استفاده در طراحی این شاخص‌ها، مدل پایداری سقزو<sup>۱</sup> بود. در نهایت پیش‌بین‌ها، نشانگرها و متغیرها (زیرشاخص‌ها) سه‌گانه شامل مکان، تداوم و فرد به ترتیب با ۹ پیش‌بین، ۱۵ نشانگر و ۱۵ متغیر را به طور کمی معرفی کردند (۱۱). مفیدی چلان و همکاران (۲۰۱۸) در تحقیقی به تدوین و اعتبارسنجی شاخص‌های ارزیابی پایداری اقتصادی در سامان‌های عرفی مرتع بی‌لاقی سهند پرداختند. در این پژوهش ۱۶ شاخص در قالب شش مؤلفه محلی معرفی شد. (۱۷). سواری و همکاران (۲۰۱۹) به تدوین راهبردهای بهره‌برداری پایدار از مراعت در میان جوامع محلی شهرستان کرمان پرداختند (۳۳) نتایج حاصل از مطالعات میدانی این دو تحقیق نشان داد شاخص‌ها و مؤلفه‌های مورد استفاده می‌تواند سطح پایداری را در سامان‌های عرفی مورد مطالعه تبیین و اولویت‌بندی کند. نارویی و همکاران (۲۰۲۰) به شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بهره‌برداری پایدار از مراعت تفتان پرداختند. بر اساس نتایج این تحقیق، خشکسالی و تغییرات اقلیمی مهم‌ترین تهدیدها در جهت بهره‌برداری پایدار از مراعت این منطقه هستند (۱۹).

بررسی پیشینه‌ی تحقیق نشان می‌دهد که با وجود مطالعات فراوانی که در ارتباط با سنجش پایداری زیستمحیطی انجام شده است، چارچوب‌های گوناگون و گاه

جدول ۱: مشخصات سامانه‌های عرفی مورد مطالعه در تحقیق

نام مرتع	نوع	موقعیت	مساحت کل	مساحت مرتع مورد بهره‌برداری*	منبع
دو گوش نادری	گرم‌سیر (قشلاقی)	۶۰ کیلومتری شمال شهر خنج	۳۹۹۳/۸ هکتار	۳۸۶۸ هکتار	(۲۹)
رباط سروستان	معتدل (میان‌بند)	۷۰ کیلومتری شرق شهر شیزار	۱۰۵۶/۴ هکتار	۹۴۰ هکتار	(۳۷)
خم نمدان بنکوی بزرگ‌لو	سرد‌سیر (بی‌لاقی)	۴۵ کیلومتری جنوب شهر اقلید	۲۳۴ هکتار	۲۳۱/۹ هکتار	(۳۸)

\*: مساحت مرتع پس از کسر مستثنیات قانونی، اراضی و اگذاری، جاده‌های ارتباطی، مراعع شاهد و فرق



شکل ۱: موقعیت چهارگانی سامانه‌های عرفی در منطقه مورد مطالعه

اشراف و دانش لازم در حوزه مورد پژوهش برخوردار بودند، ارسال شد. پرسشنامه پس از طراحی اولیه از نظر روایی بررسی شد. بدین شکل که پس از طراحی اولیه در اختیار خبرگان قرار داده شد تا به ارزیابی اولیه پرسشنامه پرداخته شود. از این‌رو ارسال پرسشنامه طی دو مرحله برای خبرگان تا زمان رسیدن به مرحله اشباع نظری<sup>۳</sup> ادامه یافت (۲۴). نتایج بدست آمده نشان داد، مخاطبان درک مشترکی از موضوع و سوالات پرسشنامه دارند. برای بررسی پایایی پرسشنامه مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه به میزان ۰/۸۸ محاسبه و به معنی تایید پایایی پرسشنامه بود (۸ و ۳۲). از آنجا که شاخص‌ها و گزینه‌های طرح شده در این پرسشنامه جامع بودند و در این موارد استفاده از متغیرهایی با ارزش‌های قطعی، کارا نیست؛ برای انجام تحلیل دلفی خبرگان رسید و سپس جهت تحلیل با تعريف دامنه متغیرهای کیفی (جدول ۲) به صورت اعداد فازی درآمدند (۱۲). برای محاسبه ارزش فازی هر یک از شاخص‌ها و گزینه‌ها و سپس دیگری کردن این مقادیر، ابتدا با فرض ارزش فازی هر یک از گزینه‌ها به صورت حاصل ضرب حدود پایین، وسط و بالای اعداد فازی رابطه‌های ۱، ۲ و ۳ و مفهوم متغیرها و پارامترهای آن‌ها به صورت زیر تعریف شد:

رابطه ۱:  $L_j = \text{Min}(x_{ij}) \quad i = 1, 2, \dots, n \quad j = 1, 2, \dots, m$

<sup>۳</sup>- Theoretical saturation

### روش تحقیق

برای طراحی شاخص‌های معرف پایداری مراتع از تکنیک‌های دلفی فازی، برای مقایسه زوجی و اولویت‌بندی شاخص‌ها و گزینه‌ها از تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد. در گام نخست با تشکیل گروه مرجعی مشتمل از متخصصان، پژوهشگران، کارشناسان امور اجرایی و خبرگان محلی، مصاحبه‌های اکتشافی در ارتباط با پایداری و شاخص‌های ارزیابی آن در مراتع عشایری صورت گرفت. مراتع منتخب دوگوش نادری، رباط سروستان و خنمدان به ترتیب به عنوان نمونه‌ای از مراتع گرسیز (قشلاق)، معتدل (میان‌بند) و سردسیر (بیلاق) استان فارس بودند. با توجه به نتایج حاصل از مصاحبه‌های اکتشافی و مرور ادبیات تحقیق درباره ابعاد و اهداف توسعه پایدار و شاخص‌های آن، مجموعه‌ای از شاخص‌های مرتبط با پایداری که کاربرد بیشتری دارند و از حداکثر سنتیت و کاربرد در منطقه برخوردارند مشخص شدند. در شاخص‌های مستخرج از ادبیات تحقیق موارد تکراری، پرهزینه، بدون کاربرد در ایران و یا شاخص‌هایی که داده‌های آن‌ها قابل دسترسی نبود حذف یا جایگزین شدند. شاخص‌های مناسب برای ارزیابی پایداری در قالب یک پرسشنامه الکترونیک<sup>۱</sup> تدوین شد. پرسشنامه با روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی<sup>۲</sup> (۱۴) برای ۱۸ نفر از خبرگان که از تخصص،

<sup>۱</sup>- <https://forms.gle/Uad6XdTrK1e1cmGp9><sup>۲</sup>- Snowball sampling

کارشناسان در بخش‌های اجرایی، تحقیقاتی و آموزشی استان فارس انجام گرفت. همچنین به منظور ترکیب نظرات مختلف از میانگین هندسی استفاده شد و داده‌های خام ورودی مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) حاصل شد. مقایسه زوجی عناصر نیز از طریق جدول (۳) صورت گرفت و قضاوت‌های شفاهی به صورت کمی بین یک تا نه تبدیل شد (۱). از مقایسه و ارزیابی گزینه‌های موجود به صورت زوجی، وزن نسبی<sup>۲</sup>(محلى) هر شاخص و گزینه بدست آمد. جهت دستیابی به اهداف پژوهش مدلی با سه سطح هدف، شاخص‌ها و گزینه‌ها در نظر گرفته شد.

جدول ۲: معادلهای فازی متغیرهای کیفی طیف لیکرت با مقیاس ۵ درجه‌ای (۲۲)

معادل فاری	معادل قطعی	معادل زبانی	متغیرهای زبانی
۰...۰/۲۵	۱	خیلی کم	
۰...۰/۲۵...۰/۰۵	۲	کم	
۰/۲۵...۰/۰...۰/۷۵	۳	متوسط	
۰/۵...۰/۷۵...۱	۴	زیاد	
۰/۷۵...۱...۱	۵	خیلی زیاد	

جدول ۳: مقادیر عددی قضاوت‌های شفاهی به منظور انجام مقایسات زوجی (۲۶)

مقدار عددی	ترجیحات (قضاوت شفاهی)
۹	کاملاً مرجع یا کاملاً مهمتر یا کاملاً مطلوب‌تر
۷	ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی
۵	ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوی
۳	کمی مرجع یا کمی مهمتر یا کمی مطلوب‌تر
۱	ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت بکسان
۲ و ۴ و ۶ و ۸	ترجیحات بین فواصل فوق

رابطه ۲:  $M_j = (\prod_{i=1}^{n,m} x_{ij})^{\frac{1}{n}} i = 1, 2, \dots, n j = 1, 2, \dots, m$   
 رابطه ۳:  $U_j = \text{Max}(x_{ij}) i = 1, 2, \dots, n j = 1, 2, \dots, m$   
 $L_j, M_j$  و  $U_j$  به ترتیب حدود پایین، وسط و بالای ارزش فازی نامیده می‌شوند و برابرند با کوچکترین مقداری میانگین هندسی کلیه نظرات خبرگان و بزرگترین مقداری که توسط خبرگان به گزینه‌ی زام تخصیص داده شده‌اند.  
 $X_i$  نمایانگر ارزش داده شده از سوی مخاطب  $i$  به شاخص  $j$  و  $\tilde{A}$ : ارزش فازی مثلثی سوال یا شاخص ز است (۴). پس از محاسبه‌ی ارزش فازی هر یک از گزینه‌ها برای قضاوت ابتدا ارزش فازی بدست آمده برای هر گزینه را با بهره‌گیری از رابطه ۴ دی فازی شد.


رابطه ۴:  $S_j = \frac{L_j + 2 \times M_j + U_j}{4}$   
 سپس به ارزیابی تایید یا رد گزینه‌ها توسط خبرگان با استفاده از حد آستانه‌ای (۵) پرداخته شد. مقدار حد آستانه میانگین مقادیر طیف پرسش‌نامه و برابر با عدد سه در نظر گرفته شد. بر این اساس حالت‌های دوگانه ممکن، شامل  $S_j < r$  و  $S_j \geq r$  به ترتیب به مفهوم تایید و رد اهمیت گزینه‌ی  $j$  از نظر مخاطبان است (۳). پس از انجام این مراحل برای به دست آوردن وزن نسبی شاخص‌ها و گزینه‌ها و استخراج ماتریس تصمیم‌گیری پرسش‌نامه دوم بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی طراحی و به منظور انجام تحلیل Expert choice 11 آماری از بسته نرم‌افزاری استفاده گردید. وزن معیارهای اصلی، وزن نسبی و نرخ ناسازگاری<sup>۱</sup> هر گزینه نسبت به هر شاخص بر مبنای داده‌های حاصل از پرسش‌نامه‌ها از طریق نرم‌افزار استخراج و محاسبه شد. در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ابتدا عناصر به صورت زوجی مقایسه و ماتریس مقایسه زوجی تشکیل گردید. در این مرحله بدست آوردن نظر خبرگان آشنا با اقلیم و شرایط حوزه و دارای تجربه کافی در زمینه‌ی علوم محیطی اهمیت دارد. از این رو در مطالعه حاضر، بر اساس ارزیابی گروه تحقیق درخصوص انتخاب افراد آشنا با شرایط حوزه، تکمیل پرسش‌نامه‌های طراحی شده توسط ۱۲ نفر از

<sup>2</sup>- Local Weight

<sup>۱</sup>- Inconsistency

گوناگون فکری، مدیریتی و تکنولوژیک بدون لزوم رعایت اصل هماهنگی و تطبیق با طبیعت می‌تواند خواسته‌های خود را برآورده سازد. تنها محدودیتی که در این جهان بینی پذیرفته است، حفظ امکان استفاده از منابع حیاتی توسط نسل‌های آینده است. رویکرد دوم معتقد است با وجود گذشت چند دهه از طرح مفهوم توسعه پایدار، گسترش تخریب و نایابداری نه تنها متوقف نشده که شتاب یافته است. این رویکرد با تکیه بر این روند که شواهد زیادی برای آن قابل ذکر است می‌گوید: با وجود به کارگیری ابزارهای گوناگون فکری، مدیریتی و تکنولوژیک برآوردن تقاضای مصرف جوامع انسانی پایدار نخواهد بود و لازم است به جای تغییر طبیعت خود را با آن تطبیق دهیم. با توجه به شیوه‌ی زندگی عشاير که بیشتر به تطبیق با طبیعت متنکی هستند تا تغییر آن، نوع رویکرد پاسخ‌دهندگان در نحوه تفسیر نتایج حاصل از پرسشنامه‌ی این تحقیق حایز اهمیت بود. بدین منظور در این تحقیق در ابتدای پرسشنامه از خواسته شد که میزان موافقت خود را با هر کدام از این دو رویکرد اعلام کنند (جدول ۴). آنچه از تجمعی نظر پاسخ‌دهندگان بر می‌آید، دیگاه اول از اقبال بیشتری برخوردار است. پس از تجمعی نظرات خبرگان در مورد پرسشنامه اول، مقدار دی‌فازی شده هر سوال برای هر یک از سوالات پرسشنامه به دست آمد.

تحلیل پرسشنامه‌ی اصلی تحقیق نشان داد نرخ ناسازگاری کمتر از ۰/۱ و معادل ۰/۰۷ است که نشان‌دهنده سازگار بودن نظرسنجی‌ها و تصمیم‌ها است. دلیل پایین بودن مقادیر ناسازگاری در این پرسشنامه را می‌توان ادغام نظرات کارشناسان از طریق میانگین هندسی دانست که باعث به اجماع رسیدن نظرات و سازگار شدن قضاوت‌ها شد. با توجه به مقدار آستانه تعریف شده در این تحقیق که مقدار عددی ۳ بود، تنها سوالات ۳۲، ۳۵، ۳۴، ۳۸ و ۳۹ مورد تایید قرار نگرفت. همه گزینه‌های تایید نشده مربوط به شاخص انسان بودند، در شاخص‌های اقلیم و هیدرولوژی، تولید گیاهی و خاک همه گزینه‌ها مورد تایید خبرگان قرار گرفت. با توجه به نتایج تحلیل دلفی فازی شاخص‌های: اقلیم و هیدرولوژی، تولید گیاهی، خاک و انسان به عنوان



شکل ۲: روندnamای اجرای روش دلفای فازی

بعد از محاسبه وزن‌های نسبی ماتریس‌های تصمیم‌گیری کامل شد و ورودی‌های مدل تاپسیس آماده شد. اولویت‌بندی نهایی و مطلق گزینه‌ها به وسیله مدل تاپسیس (TOPSIS<sup>۱</sup>) که از مفیدترین روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در بررسی مسائل جهان واقعی است و ابتدا توسط هوآنگ و یون مطرح شد صورت گرفت (۱۰). منطق زیربنایی این روش آرایش گزینه‌ها بر پایه نزدیکی و همسانی به راه حل بهینه (۳۸) به گونه‌ای است که گزینه کوتاه‌ترین فاصله را تا پاسخ بهینه داشته باشد. پاسخ مثبت و منفی، راه حل‌های فرضی هستند که همه ارزش‌های شاخص، به ترتیب مشابه ارزش‌های شاخص بیشینه و کمینه در پایگاه داده باشد (۲۵).

## نتایج

امروزه در میان گرایش‌های گوناگون دو رویکرد کلی انسان محور و طبیعت محور در مورد رابطه جامعه انسانی و طبیعت می‌توان تشخیص داد. رویکرد نخست رایج تر و بر این مبنای استوار است که انسان با استفاده از ابزارهای

<sup>۱</sup>- Technique for Order-Preference by Similarity to Ideal Solution

رتبه‌های بعدی قرار دارند. بنابراین شاخص‌های تولید گیاهی و اقلیم و هیدرولوژی از اولویت کمتری برخوردارند. مقایسه زوجی گزینه‌ها نیز نشان می‌دهد که گزینه‌های درآمد و سرمایه، مالکیت و انواع فرسایش قابل مشاهده به ترتیب با وزن‌های نسبی ۰/۱۶، ۰/۱۳ و ۰/۱۱ دارای بالاترین اولویت و گزینه‌های شاخص خشکی، میانگین دمای سالانه و دسترسی به علوفه جایگزین به ترتیب با وزن‌های نسبی ۰/۰۰۱ و ۰/۰۰۲ دارای کمترین اولویت هستند.

شکل ۳ و شکل ۴ نمایش گرافیکی وزن‌دهی و اولویت‌بندی شاخص‌ها و گزینه‌های مورد بحث را در مدل Expert choice را نشان می‌دهند.


شاخص‌های پایداری در مراتع مورد بررسی احصاء شدند که هر یک به ترتیب شامل شش، هفت، پنج و نه گزینه هستند. جدول (۶) نتایج وزن‌های نسبی و رتبه‌بندی حاصل از مقایسه زوجی شاخص‌ها و گزینه‌های تایید شده در روش دلفی فازی را بر اساس تحلیل سلسله مراتبی نشان می‌دهد. بدینهی است که داده‌های این جدول از میانگین هندسی تمامی پرسشنامه‌ها حاصل شده است. بر اساس (جدول ۶) در مورد شاخص‌های پایداری مراتع در استان فارس، شاخص‌های انسان و خاک به ترتیب با وزن ۰/۴۸۰ و ۰/۳۳۰ از بیشترین وزن نسبی برخوردار است. شاخص تولید گیاهی و اقلیم و هیدرولوژی با وزن‌های نسبی ۰/۱۳۴ و ۰/۰۵۶ در

جدول ۴: جدول تجمعی نظرات خبرگان در مورد مفهوم پایداری

	درصد موافقت	مفهوم پایداری			
خیلی کم	کم	متوسط	زیاد	خیلی زیاد	
۵/۶	۵۵/۶	۲۲/۲	۱۱/۱	۵/۶	بر اساس حدکنسرسازی منافع جامعه انسانی با در نظر گرفتن حفظ امکان استفاده از منابع حیاتی در آینده تعریف شود.
۲۳/۵	۳۵/۳	۱۱/۸	۲۳/۵	۵/۹	اکوسیستم و پرهیز از تغییر توسعه انسان در اولویت است و به جای تمرکز مدیریت و تکنولوژی بر پاسخ‌گویی به نیازهای انسان باید به دنبال کاهش مصرف و تطبیق با طبیعت بود.



شکل ۳: نمودار وزن‌دهی و اولویت‌بندی شاخص‌ها با استفاده از مدل Expert choice



شکل ۴: نمودار وزن‌دهی و اولویت‌بندی گزینه‌ها با استفاده از مدل Expert choice

جدول ۵: شاخص‌ها و گزینه‌های پرسشنامه دلفی فازی و مقادیر دی فازی شده آن‌ها

شناخته سوال	شاخص	گزینه	دی فازی شده
q1		ضریب رواناب حوزه	۳/۵۸
q2		میانگین بارش	۳/۱۰
q3	اقلیم و	وجود بارش برف	۳/۹۷
q4	هیدرولوژی	وجود منابع آب سطحی (چشمه، رودخانه و...)	۳/۸۱
q5	(H)	وجود منابع آب زیرزمینی (قنات، جاه و...)	۳/۱۰
q6		میانگین دمای سالانه	۳/۸۱
q7		شاخص خشکی (دومارتن، آمیرزه و...)	۳/۳۱
q8		ترکیب گونه‌ای	۳/۳۱
q9		تولید کل در واحد سطح	۳/۵۱
q10		علوفه در دسترس در واحد سطح	۴/۰۱
q11	تولید گیاهی	رخداد چراز زودرس	۳/۸۹
q12	(P)	فصل وقوع حداکثر تولید گیاهی (فصل مناسب چرای دام)	۳/۸۷
q13		زادآوری و تولید مثل گیاهان	۳/۶۹
q14		طول دوره مناسب رویش گیاهان	۳/۵۰
q15		دسترسی به علوفه جایگزین (بسیار مزاع، طرح کشت علوفه و...)	۳/۷۴
q16		انواع فرسایش قابل مشاهده	۳/۳۷
q17		شدت رخداد هر نوع فرسایش	۳/۳۸
q18		حساسیت خاک و اراضی به فرسایش	۳/۶۷
q19	خاک	مشاهده میکروتراس و دیگر شواهد لگدکوبی خاک در اثر چرای دام	۳/۶۱
q20	(S)	میانگین درصد خاک لخت (بدون پوشش گیاهی، لاشبرگ و سنگ و سنگریزه)	۳/۶۵
q21		درصد سطح اراضی تحت عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک	۳/۵۳
q22		وقوع سیل و آتش‌سوزی	۳/۵۴
q23		ارزیابی کلی پرسشنامه شونده نسبت به امکانات و خدمات	۳/۳۸
q24		ارزیابی کلی پرسشنامه شونده نسبت به وضعیت آب آشامیدنی و انواع آلاینده‌های محیطی	۳/۴۰
q25		ارزیابی کلی پرسشنامه شونده از وضعیت تأمین سوت، مالکیت و سیله تغذیه و شیوه سکونت و کوچ	۳/۲۶
q26		وضعیت مساحت و نوع مالکیت مرتع، زمین و باع پرسشنامه شونده	۳/۴۰
q27		وجود جوامع و گروه‌های بهره‌داران غیر عشايري (روستاییان، کشاورزان و...) در منطقه	۳/۴۰
q28		سوابق و درصد تغییر کاربری اراضی متعلق در منطقه و نظر عشاير در مورد آن	۳/۲۶
q29		تنوع فعالیت اقتصادی داماری، زنبورداری، گیاهان دارویی، باغداری و ...	۳/۴۰
q30		وجود فعالیت گردشگری یا وجود پتانسیل آن در منطقه و نگرش عشاير به این فعالیت	۳/۶۷
q31	انسان	برآورد فرد از سهم هر نوع فعالیت در کل درآمد و درجه رضابت از درآمد خویش	۳/۶۸
q32	(A)	کدام نوع فعالیت را پایدارتر می‌داند (رسیک کمتری دارد)	۲/۹۸
q33		نوع نگرش پرسشنامه شونده به سیاست‌های موجود و تغییرات آن	۳/۰۲
q34		نوع نگرش پرسشنامه شونده به نهادها و دستگاه‌های مدیریتی و اجرایی	۲/۹۵
q35		نوع نگرش پرسشنامه شونده درباره سوابق و میزان تأثیر طرح‌های مرتع‌داری، آبخیزداری و ...	۲/۹۴
q36		وضعیت وجود حیات وحش گیاه‌خوار / گوشتخوار و نوع نگرش پرسشنامه شونده به آن (به تفکیک)	۳/۰۶
q37		سابقه عضویت، ارتباط، فعالیت یا هرگونه آشنایی با سازمان‌های مردم‌نهاد و نگرش پرسشنامه شونده به آن	۳/۳۰
q38		ارزیابی کلی پرسشنامه شونده نسبت به دانسته‌های خود درباره مسائل فنی و مدیریت مرتع	۲/۹۷
q39		ارزیابی کلی پرسشنامه شونده نسبت به وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه خود	۲/۸۶
q40		مقدار نیاز و تمایل پرسشنامه شونده به دریافت آموزش و منابع اطلاعاتی و شیوه‌ی دریافت اطلاعات	۳/۰۱

جدول ۶: شاخص‌ها و گزینه‌های نهایی و نتایج وزن دهی و اولویت‌بندی آن‌ها بر اساس مدل Expert choice

شناسه	شخصها	وزن نهایی	اولویت	عنوان گزینه‌ها	اولویت	وزن نهایی	اولویت	وزن نهایی	عنوان گزینه‌ها
h1				ضریب روابط حوزه					اولویت
h2				میانگین بارش					وزن نهایی
h3				وجود بارش برف					اقلیم و
h4			۴	وجود متابع آب سطحی (چشممه، رودخانه و...)		۰/۰۵۶			هیدرولوژی
h5	(H)			وجود متابع آب زیرزمینی (قات، چاه و...)					
h6				میانگین دمای سالانه					
h7				شاخص خشکی (دومارتن، آمبرزه و...)					
p1				ترکیب گونه‌ای					
p2				تولید کل در واحد سطح					
p3				علوفه در واحد سطح					
p4			۳	رخداد چرای زوردرس		۰/۱۳۴			تولید
p5	(P)			فصل وقوع حداقل تولید گیاهی (فصل مناسب چرای دام)					گیاهی
p6				زادآوری و تولید مثل گیاهان					
p7				طول دوره مناسب رویش گیاهان					
p8				دسترسی به علوفه جایگزین (پس چر مزارع، طرح کشت علوفه و...)					
s1				انواع فراسایش قابل مساهده					
s2				شدت رخداد هر نوع فراسایش					
s3				حسابیت خاک و اراضی به فراسایش					
s4	(S)		۲	مشاهده میکروتراس و دیگر شواهد لندکوبی خاک در انواع چرای دام		۰/۳۳۰			خاک
s5				میانگین درصد خاک لخت (بدون پوشش گیاهی، لاشیگ و سنگ و سنگریزه)					
s6				درصد سطح اراضی تحت عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک					
s7				وقوع سیل و آتش‌سوزی					
a1				درآمد و سرمایه					
a2				مالکیت					
a3				اشتغال					
a4				تولید					
a5				امکانات					
a6	(A)		۱	بهداشت و سلامت		۰/۴۸۰			انسان
a7				آموزش و دانش یوهمی					
a8				امنیت					
a9				مشارکت و نگرش					

نمایه دهد. نتایج نشان می‌دهد گزینه‌های "درآمد، پس‌انداز، وام و پشتیبانی بانکی، بیمه" و "زمین، دام، مسکن، خودرو" و "انواع فرسایش قابل مشاهده" به ترتیب با مقادیر نزدیکی نسبتی ۱ و ۰/۸۶ و ۰/۸۱ حاiz بالاترین اولویت در پایداری مراتع در منطقه‌ی مرود مطالعه هستند.

ماتریس تضمیم‌گیری و وزن شاخص‌ها ورودی اصلی مدل تاپسیس است. با انجام مراحل قبل اطلاعات ورودی مدل تاپسیس آماده می‌شود. تمامی این اطلاعات وارد نرم‌افزار شد و با اجرای این مدل نتایج نهایی به دست آمد. همچنانی جدول ۷ میزان نزدیکی نسبی و اولویت هر یک از راهکارهای پیشنهادی در در منطقه مربوطه را نشان

جدول ۷: اولویت نهایی شاخص‌های پایداری متع

در کنار این موارد، شاخص‌های انسانی، نیز سهم خاص خود را دارند و پایداری معیشت مرتع داران زمانی حاصل می‌شود که برنامه‌ها بر اساس سناریوهای دینامیک و فرآگیر بنا شوند و علاوه بر ایجاد استراتژی‌های محوری در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، علم و فناوری، محیط زیست و سیاست و قانون گذاری، راهبردهای اجرائی مدنظر قرار گرفته و با تأمین نیازهای مبنایی، زمینه پویایی و پایداری ایجاد گردد. همچنین با توجه به تأکید نتایج تحقیق حاضر بر شاخص‌های انسانی و گزینه‌های اقتصادی، نتایج ناروئی و همکاران (۲۰۲۰) و مفیدی چلان و همکاران (۲۰۱۷) را تایید می‌کند و با تحقیقات صورت گرفته توسط مکشین (۲۰۰۸) با توجه به رویکردی که بر عوامل غیر انسان محور دارد، همسو نیست.

صحت‌سنجی شاخص‌ها و گزینه‌های تدوین شده و مطالعه‌ی میدانی در سه مرتع عشایری قشلاقی، میان بند و بیلاقی استان فارس نیز نشان داد که شاخص‌ها و گزینه‌های تدوین شده با درصد قابل قبول مورد موافقت عوامل اجرایی و متخصصان آشنا به مسائل منابع طبیعی منطقه قرار گرفته است. در نهایت پیشنهاد می‌شود مطالعات جامع‌تری با تأکید بر نقش انسان در پایداری مرتع انجام پذیرد. همچنین استفاده از سایر روش‌های تصمیم‌گیری مبتنی بر شاخص‌های چندگانه برای ارزیابی و اولویت‌بندی شاخص‌ها و گزینه‌ها، کاربرد تئوری فازی در تعیین اوزان و تحلیل حساسیت نتایج مساله تصمیم با متغیر فرض نمودن مقادیر اوزان شاخص‌ها و مقایسه نتایج نیز می‌تواند در تحقیقات آتی مورد بررسی قرار گیرد.

در جمع‌بندی نتایج بهویه به منظور کاربرد عملی، بر اساس نتایج این تحقیق می‌توان گفت حداقل پیچیدگی در زمینه طراحی شاخص و ارزیابی پایداری مراتع در شاخص‌های واسته به انسان وجود دارد امری که در تحقیقات سالا و همکاران (۲۰۱۵) نیز بیان شده است. در تحقیق حاضر تعدد معیارهای انسانی، عدم توافق پیرامون برخی از آنها و هم‌زمان تخصیص بالاترین وزن نسبی به شاخص انسانی نشانه‌ای از این پیچیدگی است و لازم است حساسیت و توجه ویژه‌ای در تعیین معیارهای این شاخص در نظر گرفته شود. این نتیجه به معنی عدم توجه به شاخص‌ها و معیارهای اکولوژیک نیست بلکه بدان معنی

## بحث و نتیجه‌گیری

پایداری به عنوان نقطه عطف پارادایم توسعه، پس از پنج دهه چالش‌های نظری و عملی در زمینه توسعه، پا به عرصه اندیشه و عمل در جوامع انسانی گذاشت تا با پیوند نظامهای اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیک، توسعه را مفهومی انسانی، متعالی، چندبعدی، همه‌جانبه، متوازن و پایدار بخشد. مفهوم پایداری در فرایند توسعه و به‌طور ویژه در مدیریت منابع طبیعی و مرتع داری، متناظر است بر پایداری اکولوژیک، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تحقق آن مستلزم سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اقدام سنجیده است. در این راستا طراحی و اولویت‌بندی شاخص‌ها و گزینه‌های معرف پایداری مراتع از اهمیت خاصی برخودار است. همچنین پایش و ارزشیابی به عنوان ابزاری سودمند و سازگار برای تعیین وضعیت نسبی پایداری مراتع در طول یک دوره زمانی مشخص می‌تواند کارساز بوده و قادر به پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌ها به منظور اعمال مدیریتی سازگار با پایداری منابع طبیعی باشد. از این رو در این تحقیق رویکردهای مربوط به شاخص‌های مهم پایداری مراتع مورد مذاقه و پرسش قرار گرفته است. با توجه به نتایج مستخرج رویکرد، انسان‌محور مورد تأکید مصاحبه شوندگان قرار گرفته است که با نظرات بوتل (۱۹۸۷)، نورتون (۱۹۹۵) و سقزو (۲۰۰۹) تطبیق می‌کند و نتایج نهایی مستخرج از پرسش‌نامه‌ها نیز با این رویکرد همسو است. با توجه به مقدار آستانه مورد اتفاق در این تحقیق تعدادی از گزینه‌ها مورد تایید قرار نگرفت و از گردونه پژوهش حذف شدند. نتایج پرسش‌نامه مربوط به تحلیل سلسله مراتی نیز که از دل پرسش‌نامه دلفی فازی برآمده و طراحی شده است، نشان می‌دهد که به ترتیب شاخص‌های انسان و خاک و گزینه‌های "درآمد، پسانداز، وام و پشتیبانی بانکی، بیمه" و "زمین، دام، مسکن، خودرو" از بیشترین وزن نسبی برخوردارند. به منظور اولویت‌بندی گزینه‌های پایداری نیز از روش تاپسیس بهره گرفته شد. نتایج در روش تاپسیس بدین صورت بود که گزینه‌های "درآمد، پسانداز، وام و پشتیبانی بانکی، بیمه"، "زمین، دام، مسکن، خودرو" و "انواع فرسایش قابل مشاهده" به عنوان گزینه برتر شناسایی شدند. چنانکه نتایج این پژوهش نشان می‌دهد در برنامه‌ریزی در جهت پایداری مراتع مهم‌ترین شاخص‌ها، شاخص‌های اقتصادی می‌باشد.

در میان شاخص‌های اکولوژیک خاک بهترین ابزار جهت ارزیابی پایداری مراتع عشاپری را در اختیار می‌گذارد.

است که اتفاق نظر و شناخت بهتری نسبت به معیارهای ارزیابی پایداری در سطح شاخص‌های اکولوژیک وجود دارد.

### References

- Asghari Saraskanrud, S., H. Jalalian, F. Azizpour & S. Asghari Saraskanrud, 2016. Choosing the optimized strategy of sustainable livelihood faced with drought by using integrated model SWOT and TOPSIS case study: rural areas of central district of Hashtrood. *Geographic Space*, 16(55): 313–339. (In Persian)
- Buttel, F. H. 1987. New directions in environmental sociology. *Annual review of sociology*, 13(1): 465-488.
- Chang, P.L., C.W. Hsu & P.C. Chang, 2011. Fuzzy Delphi method for evaluating hydrogen production technologies. *International Journal of Hydrogen Energy*, 36(21): 14172-14179.
- Chen, C. S. & Y.C. Liu, 2007. A methodology for evaluation and classification of rock mass quality on tunnel engineering. *Tunnelling and Underground Space Technology*, 22(4): 377-387.
- Department of Nomadic Affairs of Fars province, 2010. Strategic plan for organizing the nomads in Fars province. (In Persian)
- Dong, S., L. Wen, S. Liu, X. Zhang, J.P. Lassoie, S. Yi, X. Li, J. Li & Y. Li, 2011. Vulnerability of worldwide pastoralism to global changes and interdisciplinary strategies for sustainable pastoralism. *Ecology and society*, 16(2):10.
- Gharibvand, H.K., H. Azadi & F. Witlox, 2015. Exploring appropriate livelihood alternatives for sustainable rangeland management. *The Rangeland Journal*, 37(4): 345-356.
- Habibi, A., F.F. Jahantigh & A. Sarafrazi, 2015. Fuzzy Delphi technique for forecasting and screening items. *Asian Journal of Research in Business Economics and Management*, 5(2): 130-143.
- Hosseiniinia, G.H., H. Azadi, K. Zarafshani, D. Samari & F. Witlox, 2013. Sustainable rangeland management: Pastoralists' attitudes toward integrated programs in Iran. *Journal of Arid Environments*, 92: 26-33.
- Hwang, C.L. & K. Yoon, 1981. Methods for multiple attribute decision making. In *Multiple attribute decision making*, Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 58-191.
- Iribarnegaray, M.A., F.R. Copa, M.L. Gatto D'Andrea, M.F. Arredondo, J.D. Cabral, J.J. Correa, V.I. Liberal & L. Seghezzo, 2012. A comprehensive index to assess the sustainability of water and sanitation management systems. *Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development*, 2(3): 205–222.
- Jafari, N. & G. Montazer, 2008. Application of Fuzzy Delphi method in designing tax policy in Iran. *Journal of Sustainable Growth and Development (The Economic Research)*, 8(1): 91-114. (In Persian)
- Kurz, T., 2002. The psychology of environmentally sustainable behavior: Fitting together pieces of the puzzle. *Analyses of Social Issues and Public Policy*, 2(1): 257-278.
- Marshall, M.N., 1996. Sampling for qualitative research. *Family practice*, 13(6): 522-526.
- McShane, K. 2008. Convergence, non-instrumental value and the semantics of 'love': Reply to Norton. *Environmental Values*, 17(1): 15-22.
- Mitchell, J.E., 2010. Criteria and indicators for sustainable rangeland management. Cooperative Extension Service Publication SM-56. Laramie, WY: University of Wyoming. 227 p.
- Mofidi Chelan, M., H. Barani, A. Abedi Carvestani, J. Motamed, & A. Darban Astane, 2018. Developing and validating social sustainability indices in pastoral units (Case study: Sahand summer rangelands). *Rangeland*, 11(4): 422–435. (In Persian)
- Mofidi chelan, M., H. Barani, A. Abedi sarvestani, J. Moetamedi & A. Darban Astane, 2017. Provision of Environmental-Ecological assessment Indices in Rangeland pastoral units with a Focus on Sahand Summer Rangelands. *Iranian Journal of Range and Desert Research*, 24(2): 309-324. (In Persian)
- Naroei, A., H. Piri & M. Rigi, 2020. Assessment of sustainable use of rangelands through multi criteria evaluation method and SWOT analysis (Case study: Taftan rangelands, Khash city). *Rangeland*, 14(1): 132–146. (In Persian)
- Nicholson, F.A., S.J. Groves & B.J. Chambers, 2005. Pathogen survival during livestock manure storage and following land application. *Bioresource technology*, 96(2): 135-143.
- Norton, B. G., 1999. Pragmatism, adaptive management, and sustainability. *Environmental Values*, 8(4): 451-466.
- Qiu, H.J., W.B. Zhu, H.B. Wang & X. Cheng, 2007. Analysis and design of agricultural sustainability indicators system. *Agricultural Sciences in China*, 6(4): 475-486.
- Quental, N., J.M. Lourenço & F.N. Da Silva, 2011. Sustainability: characteristics and scientific roots. *Environment, Development and Sustainability*, 13(2): 257-276.

24. Ranjbar, H., A. Haghdoost, M. Salsali, A. Khoshdel, M. Soleimani & N. Bahrami, 2012. Sampling in qualitative research: a guide for beginning. *Annals of Military and Health Sciences Research*, 10(3): 238-250. (In Persian)
25. Rao, R. V. & J.P. Davim, 2008. A decision-making framework model for material selection using a combined multiple attribute decision-making method. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 35(7): 751-760.
26. Saaty, T.L., 2008. Decision making with the analytic hierarchy process. *International journal of services sciences*, 1(1): 83-98.
27. Sabz Poushan engineering advisory company, 2004. Range management plan for Robat, Sarvestan pastures. (In Persian)
28. Sabz Poushan engineering advisory company, 2008. Range management plan for Khom Namdaan, Eqlid pastures. (In Persian)
29. Sabz Poushan engineering advisory company, 2008. Range management plan for Dogush Naderi, Khonj pastures. (In Persian)
30. Sala, S., B. Ciuffo & P. Nijkamp, 2015. A systemic framework for sustainability assessment. *Ecological Economics*, 119: 314-325.
31. Salam, M.A., T. Noguchi, & M. Koike, 2005. Factors influencing the sustained participation of farmers in participatory forestry: case study in central Sal forests in Bangladesh. *Journal of Environmental Management*, 74(1): 43-51.
32. Salehi, S., M. Chizari, H. Sedighi & M. Bijani, 2018. Vulnerability assessment of groundwater study areas: development a statistical model (the case of Fars province). *Water Engineering*, 11(37): 23-39. (In Persian)
33. Savari, M., H. Eskandari & L. Avazpoor, 2019. Strategies for sustainable use of rangelands applicable for local Communities Case of: Kerman County. *Rangeland*, 13(2): 319-336. (In Persian)
34. Seghezzo, L., 2009. The five dimensions of sustainability. *Environmental politics*, 18(4), 539-556.
35. Tache, B., 2008. Pastoralism under stress: resources, institutions and poverty among the Borana Oromo in southern Ethiopia. Norwegian University of Life Sciences, Department of International Environment and Development Studies.
36. Tahmasebi, A., 2012. Pastoralism under Pressure: Vulnerability of Pastoral Nomads to Multiple Socio-political and Climate Stresses: The Shahsevan of Northwest Iran. Dissertation, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5n-29119>.
37. Tanimoto, J., 2005. Environmental dilemma game to establish a sustainable society dealing with an emergent value system. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 200(1-2): 1-24.
38. Wang, Y.J., 2008. Applying FMCMD to evaluate financial performance of domestic airlines in Taiwan. *Expert Systems with Applications*, 34(3): 1837-1845.
39. Wilhelmi, O.V. & D.A. Wilhite, 2002. Assessing vulnerability to agricultural drought: a Nebraska case study. *Natural Hazards*, 25(1): 37-58.
40. Wiseman, M. & F.X. Bogner, 2003. A higher-order model of ecological values and its relationship to personality. *Personality and Individual differences*, 34(5): 783-794.
41. Yuan, W., P. James, K. Hodgson, S.M. Hutchinson & C. Shi, 2003. Development of sustainability indicators by communities in China: a case study of Chongming County, Shanghai. *Journal of environmental management*, 68(3): 253-261.